



B. L. 1 pl. + (28), 411 pagg. + 2 pl.

1396
250

N. 173.

John F. Wettergren



Elias Aspelin (1883)
3/67

1st sitting.

Axel N. Tornander.







CAROLI LINNÆI

MEDIC. & BOTAN. PROF. UPSAL; HORTI ACADEMICI PRÆFECT; ACAD. IMPERIAL;
MONSPELIENS: STOCKHOLM: UPSAL: SOC; HUJUSQUE SECRETAR.

FAUNA SVECICA

SISTENS

Animalia *SVECIÆ* Regni:
QUADRUPEDIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES,


DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES.

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS HABITATIONUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.



STOCKHOLMIAE

Sumtu & literis LAURENTII SALVII

1746.

*Quæ Præsenti Opusculo desunt suppletat Ætas;
Non enim differendum est tyrocinium in Senectutem.*

Nam quotidie crescit metus,

Majusque fit semper quod ausuri sumus;

Et dum deliberamus, quando incipiendum,

Incipere jam serum fit,

Quare Fructum studiorum viridem

Et adhuc dulcem promi decet,

Dum et Venia,

Et spes est,

Et paratus favor,

Et audere non dederet.

Quintilianus.

¹⁶
ONHRB
NOBILISSIMO & GENEROSISSIMO

DOMINO

CAROLO HÅRLEMAN

SUPREMO ÆDIFICIORUM & HORTORUM
REGG. PRÆFECTO.

NOBILISSIMO ATQUE GENEROSISSIMO

DOMINO

NICOLAO PALMSTIERNA

CHILIARCHÆ.

ILLUSTRISSIMO COMITI

DOMINO

CLAUDIO EKEBLAD,

CONSILIARIO CANCELLARIÆ S. R. MAJ:TIS
REGNIQUE SUECIÆ.

GENEROSISSIMO DOMINO,

LIB. BARONI

ANDREÆ von HØPKEN,

CUBICULARIO & SECRETARIO
REGIO.

Quidquid in Suecia vivit &
movetur exultat vobis sibi,
Viri

PRAEESTATO. DEDICATIO

Viri Illustres, qui felicitatem patriæ, literas, ingenuasque promovetis artes.

Jam per tria lustra incubui labori huic, fessum & oneri fere succumbentem sublevavit vestra gratia, sensi novas vires novumque ardorem, cum me æternitati pingere intellexi ex numismate, quo immerentem donare voluistis.

Ad finem perductum opus gratissimique erga vos animi testim esse optavi

ILLUSTRISS. NOMINUM VESTRORUM

Cultor devotissimus

CAROLUS LINNÆUS.

PRÆFATIO.

Intra omnia, numquam satis prædicanda, Orbis Terrauei Miracula, ipso HOMINE, nihil omnino illustrius, potius nihil est.

Universum REGNUM LAPIDEUM constituent corpora, quorum particulæ fortuitu vel concretae vel segregatæ sunt, & quorum rudem massam artificiosius non instruxit natura.

Minutissimum PLANTÆ semen, massæ cùdam Lapidei Regni immistum, rudiora corpora illâ fibi assimilata sic instruit, ut nobiliora evadant; itaque Plantæ plus artificii arguunt quam Lapi des.

Ovum ANIMALCULI cujusdam, forte inter plantas exclusum, easdem corruptit, assimilat & majori adhuc artificio instruit; Ut adeo crudæ particulae terrestres Regni Lapidei in Regno Vegetabili prius instruendæ sint, quam in Regno Animali nobiliaris artificii capaces evadant; itaque Animalia plantis sunt excellentiora.

Sed autem Animalia invicem contuleris, diversos perfectionis gradus in illis itidem deprehendes; in censum hec veniunt Vermes, Insecta, Pisces, Amphibia, Aves, Quadrupedia; ut rem paucis expediam. Aranea est octipes, totidemque instructa oculis, cum non nisi binos & pedes & oculos habeat Gallina, verumtamen haec illâ nobiliar est. Etenim perfectius judicandum quod paucioribus instrumentis multa efficere possit, quam quod majori apparatu vix tantumdem peragere valeat. Sic adstrui nullo negotio poterit Hirudini vermi Papilionem Insectum, Papilioni Salmonem Piscem, Salmoni Aquilam Avem, Aquilæ demum Bovem aut Leonem antecellere; ita

P R A E F A T I O.

quidem ut Quadrupedia cunctis animalibus reliquis multo exsistant perfectiora; sed vero non est quod in demonstranda re, per se clara, multi simus.

Quod inter Animalia Quadrupedia Hominem referre ausim, jure mihi nemo succensabit; nimirum Homo neque Lapis, neque Planta est, sed Animal; namque eum in modum vivit & movetur; jam vero non est *Vermis*, sic enim Pede unico contentus foret. Nec *Insectum*, sic enim Antennas habiturus esset. Nec *Piscis* est, quod careat Pinnis. Nec vero *Avis*, quod Pennis careat. Immo Quadrupes est, gaudet ore, similiter constituto ut in reliquis quadrupedibus, denique quatuor pedibus, quamvis duobus ingrediatur, duobus obvia prehendat; & certe si vera fatebor, qua *Historicus Naturalis* ex scientiae principiis, nullum characterem hactenus eruere potui, unde Homo a Simia internoscatur; dantur enim alicubi terrarum Simiae minus, quam Homo pilosæ, erecto corpore, binis æque ac ille pedibus incedentes, & pedum & manuum ministerio humanam referentes speciem, prorsus ut easdem pro Hominum quopiam genere venditarint peregrinatorum rudiores. Loquela quidem Hominem a reliquis animalibus distinguere videtur; verum enim vero hæc quædam est potentia vel certe effectus, non autem nota characteristica a numero figura proportione aut situ defumta; ut res adeo sit perquam arduæ indaginis, propriam tradere hominis differentiam specificam. Ast in nobis quidquam inest, quod visum non subit, unde nostri ipsorum cognitio pendet, utpote nobilissima *Ratio*, qua Homo cunctis animalibus immane quantum præcellit.

Quamobrem nemo facile iturus est inficias, Homi-

P R A E F A T I O.

minem esse Animal & illud quidem primæ Classis atque ordinis, quippe quod ceteris omnibus longe perfectius est; etiam si enim haut munitus sit homo vel rabidis dentibus, vel horrendis Cornibus, vel aduncis Unguis, vel venenosis Aculeis &c. Ipse tamen delere atque prosternere valet sævissimos Leones, pestilentissimos Angues, voracissimos Crocodilos, robustissimos Elephantes, vastissimos Cetos, pernicissimos Sciuros; immo vero, quidquid *Avium* supremum peragrat aërem, quidquid *Piscium* maris abyssum tenet: ut nihil adeo eorum, quæ corpore gaudent animato, fatis ipsi resistere queat. In orbem terraqueum prodiiit Homo nudus omnino atque inermis, cum reliqua Animalia vel Pellibus, vel Plumis, vel squamis, vel loricis, vel testis, vel spinis Creator providus donaverit; aliis cesserunt *Alæ* queis in sublime se attollant; aliis *Pinnæ* quibus in profundo natent; aliis plurimi *Pedes* quorum ope alacrius cursitent; Hominem vero nudum, cunctis hisce præfidiis destitutum, nec nisi duobus insistentem pedibus, quibus reliqua *Quadrupedia* vix ac ne vix incedere possunt, præ ceteris unica proprietate ornavit Deus, puta Ratione; qua dexterime usum hoc Animal, tot tantaque conficiat opera, quot alia Animalia nulla, immo de sui ipsius Auctore & Creatore judicare non diffidat; proprietas isthæc, in oculorum adspectum non cadens, ut originis, ita indolis est divinæ. Itaque omnium, quos produxit Deus, universi orbis incolarum, hoc est, omnium omnino animalium præstantissimus est Homo, cui proinde, singulari vereque paterno moderamine, præesse, & quam optime prospicere voluit Benèficienissimus ille Naturæ Auctor.

Animali huic formosissimo, ut omnium sapien-

P R A E F A T I O.

tissimo, ita constituto orbis terrarum Regi & Domino, splendidissimam sedem suapte manu paratam, Deus attribuit. Paradisum loquor sive Hortum Eden, maxima omnium eorum, queis opus erat, affluentia spectabilem. Heic omnia Animalia, Plantæ omnes fuere; adeoque maxima varietas, maxima voluptas. Ecce primum vereque primaritatem *Hortum Botanicum*, primi Hominis jam integri sumineque beati Hospitium; Ecce primas Hominis curas, delicias primas, *Animalia* & *Plantas*.

Primæ Hominis actiones, quas in Paradiſo exercuit, duas summarias scientiæ partes complexæ sunt; hæ erant: Inspectio Creaturarum, & Impositionis nominum: ut nomina, (*Verut. aug. Scient. 25.*) animalibus a se imposta, retineret ipse, oportuit habere distinctos characteres s. notas quibus species distinguerentur, quos ut obtineret, accuratori singularum examine, adeoque Zoologiæ cultura fuit opus; nimirum teste S:a S:a & communi experientia, concessum est homini in animalia cetera imperium, cum Hominis causa videatur cuncta alia genuisse natura (*Plin. VII:1.*). Hæc animalia in plerumque usum suum converteret; usum non innatae ideae, sed experientia sola suggessit. Experimenta vix cum aliis communicari possent, nisi per nomina; nec nomina absque charactere, immo Magister ipse, qui nomina imposuerat, quamvis propria & a se ipso confecta, retinere ipse nequiverat absque charactere & differentia specifica. Primus enim gradus sapientiæ est & erat res ipsas nosse; nomina si perierant, perierat & rerum cognitio; itaque primi hominis cura in statu felicissimo, cum impositione nominum, erat Zoologiæ studium, adeoque hoc studium maxime naturale.

Post-

P R A E F A T I O.

Posteaquam Animalia & Plantæ per terrarum orbem longe lateque disseminari coepertint, nec intra arctum Hortum omnia obtinebant Protoplasti, humanum genus adflixit semper penuria quorundam, quæ dominio suo primitus subiecta fuerunt, hic dies aliam vitam, alios mores postulabat. Jam tum desierat mira opportunitas Naturalem excoldi scientiam, ac species generum, in animali regno occurrentium, invicem comparandi. Ut vitae sustentandæ necessaria parentur, omnis lapis, omnis gleba movenda, oportebat modica dein Scientia contentos esse mortales. Sic miserum in modum novata rerum facie, hautquam mirum est, omnia non tam pedetentim inclinasse, quam confessim ruisse in deterius.

Longa denique experientia edocti mortales, plus cœperunt sapere. His, qui tenuiori sorte pressi, colendo quotannis agello suo omne studium addixere, vix aliud quidquam curare integrum fuit, quam sui suorumque sustentationem. Qui vero pauci vitam his curis vacuam agere potuerunt, in id maximo incubuere nisu, ut illustriori studio illi, quod una cum felicissima vita Paradisiaca & cœpit & fere defit, novam quantum in se fuit, fenerarentur lucem.

In dignoscendis *Lapidibus* & terræ speciebus diversis inoffenso gradu longius processit Hominum industria: etenim ista nobis ubicunque degimus, toto die sunt obvia. Seculorum etiam progressu mirre succrevit *Plantarum* cognitio, quod neque illæ e conspectu nostro diffugiant, quin potius in eodem regionis tractu plerumque commorentur; præferunt ex quo tempore instituendis Hortis Botanicis, seu minoribus Paradisis, ubi plantæ mutuo inter se conferri possint, diligentior novata est opera.

P R A E F A T I O.

Cur autem in Zoologia, inde ab Adami ætate hucusque progressus omnium minimos fecerimus, in promtu caussa est: quippe Sylvis se obscondunt *Quadrupedia*, avolant *Aves*, abyssum petunt *Pisces*, latebras querunt *Serpentes*, *Insecta* denique cursu, saltu, volatu, nostris sese subtrahunt oculis; verbo: hominis adspectum refugit omne Animal, nec Lapidum instar & Plantarum, fixis hæret sedibus. Hæc jam diu fuit atque etiamnum est caussa, cur scientiarum operum nobilissima consideret, naturæ vel maxime consentanea, & innoxiae voluptatis plenissima merito judicabitur, ad hæc usque tempora rudis, incondita atque indigesta permanferit; prorsus ut hac ex parte Barbari simus, quantumcunque in aliis versati literis. Roganti quibus usibus vel Lapis vel Planta quædam inserviat, plurimi, dato responso, facient satis. Si quis autem percontatus fuerit, cui bono sit Insectorum aliquod? perinde ac si indictum foret silentium, presso ore obmutescet omnes, aut certe, si quid omnino regerendum est, de stupendo omnipotentis Creatoris opere non verebuntur regerere, quod nullius sit usus: Postea vero, quum Animalia (haut si ne prægravi sumtu, si in vivis essent alenda) Musis suis Viviorum supplentibus vicem, adservare cœperunt curiosi, speramus olim fore tempus, quo nobilissima hæc Historiæ naturalis pars ad optatum denique culmen perducatur; sic fortasse seris Nopotibus concedatur luce meridiana clarioribus facibus eos pervestigare Naturæ mæandros, in quibus hodie, tenebricosa caligine circumdati, palpando viam inquirimus.

P R A E F A T I O.

Studii hujus amor, quem initio, ante hos quindecim annos, modicum sane nec satis fervidum in me persensi, paullatim animum meum usque adeo cepit, ut nihil supra. Sæpius quidem ipse mihi dictum putabam illud Poetæ:

Studium quid inutile quæris?
neque aliter me dehortabantur amici. Adhæc inimici, me studiumque meum habentes despiciunt, subridebant, nec sine fastu & fastidio; sed ut ipsis quidem videbatur, non sine sale tamen, identidem oggerebant: muscos & muscas curet, cui, quod agat, nihil aliud est reliquum. Verum tamen ista omnia refrenandæ studii hujus cupidini avidissimæ neutiquam satit erant; quin me quotidie Doctissimi Raji & sapientissimi Davidis effata in hoc studium exstimulabant.

Quod DEI opera sint, in quibus contemplandis memet exerceo.

Quod Divinæ artis & potentiae sint effecta, quibus inquirendis successivas horas addico.

Quod ille me in hunc mundum introduxerit, tam inexplebili rerum varietate instructum & ornatum.

Quod oculis, quos mihi contulit ea videnda, animo & consideranda objecerit.

In Dei ergo contumeliam redundat, quod hæc quæ Eum creasse negare non audes, supervacanea & inutilia esse affirmes.

Mundum hunc sublunarem, omniaque quæ in ea sunt, Hominis caussa condita fuisse, recepta Theologorum sententia est; ergo & ipsa Infecta.

Quam autem potiorem Hominibus usum præstent, quam ut ea contemplentur, divinæque artis vestigia in iis efformandis observent & mirentur.

Quod

P R A E F A T I O.

Quod si omnia ad corpus referas, omniaque ei vel pascendo, vel tegendo, vel ornando vel mendendo comparata esse contendas, suum etiam in his usum habent haec genera, ut facile esset omnia percurrendo ostendere.

Si majora dices & magis necessaria studia esse, quæ hominem, uti hodie vivitur, totum requirunt; scias me tantum hisce studiis & inquisitionibus me recreare & oblectare: Quod alii venationibus, Confabulationibus, Tesseris, Chartis, Lusibus, Compotationibus insumunt, illud ergo insectis indagandis, colendis, contemplandis impendo.

Recreat & refocillat animum, quamvis laboriosum sit, illud quocunque oblectatur.

Ne itaque humanis rationibus divina opera curiosius excutiamus, sed ex operibus manuducti admiremur artificem.

Meditabor ergo in omnibus Operibus Tuis Domine,

Delectasti enim me Deus in factura tua, & in operibus manuum tuarum exsultabo.

Docuisti me Deus a juventute mea, & usque nunc pronunciabo mirabilia tua.

Dedisti mihi Domine *artem*, *mercedem meam*, & in illa laudabo nomen Tuum.

Narrabo omnia Mirabilia tua Domine & virtutem terribilium tuorum dicant generationes.

Terribilia sunt opera tua Domine, in multitudine virtutis Tuæ, Temetientur inimici Tui.

O Jehova quam ampla sunt opera Tua,
quam ea sapienter fecisti,
quam plena est terra possessione Tua?

P R A E F A T I O.

In magnis corporibus facilior officina sequaci
materia fuit; in Insectis vero tam parvis atque tam
nullis, quæ ratio? quanta vis? quam extricabi-
bilis perfectio? Turrigeros Elephantorum mira-
mur humeros, Taurorumque colla & truces in
sublime jactus, Tigriumque rapinas, Leonumque
jubas, cum tamen rerum natura numquam magis
quam in minimis tota sit. Quia propter quæfōne hæc
legentes, quoniam in his spernunt multa, etiam re-
lata fastidio damnent, cum in contemplatione
Naturæ nil possit videri supervaca-
neum. *Plin.*



RATIO OPERIS.

QUUM ad patriam Academiam Upsaliensem 1729 degerem, conquirendis INSECTIS primam dedi operam, nec prius destiti, quam visendæ mihi essent 1735 exteræ Regiones.

Eorum, quæ reperi, Catalogum, a me exhibitum, *Regia Scientiarum Societas Upsaliensis Actis* suis pro anno 1736 inferuit.

AVIUM indigenarum icones eximiæ, quas RUD-BECKIUS filius, Prædecessor meus, adornavit, mihi plurimas subministrarunt Species, a me ipso non animadverfas.

ARTEDI, mei ad Academiam Upsaliensem commilitonis, amicissimi, indefessa in Ichthyologicis opera, Catalogum *Piscium* facilem mihi & expeditum reddidit.

Cubicularius Regius CAROLUS DE GEER, Dominus in Löffstad, Upsaliæ commorabatur 1741, quando illic mihi fixa sedes obtingeret. Solidiorem magisque fundamentalem insectorum cognitionem in alio nemine hucusque deprehenderam. Excellebat fane Nobilissimus Vir in examinandis Insectorum moribus & œconomia, in characteribus eorum indagandis, denique specierum differentiis rite consti-tuendis. Ea insuper erat indeole vere nobili & generosa, quam in mortalium plerisque desiderabis, ut ab omni invidia alienus, omnium, quæ noverat, copiam ultro faceret curioso, nec soli sibi sapere præ-optaret. Quam ob rem Ei uni plus, quam alii cuiquam, acceptum refero.. *Datos a me Insectorum*

cara-

RATIO OPERIS.

characteres examinans, dubia sua proponebat, quo factum, ut, in editione tertia & quarta systematis naturæ, generum quædam mutatio admissa sit, immo nova genera complura emerserint, qualia Thrips, Coccus, Chermes, Tenthredo, Podura &c. et sane familiarior consuetudo, quæ cum viro Nobilissimo mihi intercessit, pristino meo in hoc studii genus ardori non modicum addidit cumulum.

JOH. LECHE M.D. factam in Scania, per annos complures, plus quam 500 *Insectorum* collectionem, una cum variarum Avium iconibus, mihi sponte obtulit, & meum hunc catalogum insigni augmento ditavit.

Denique ut hæc collectanea nostra in publicum usum converterem, atque ut studiosi in Botanicis excursionibus, una eademque opera duplum lucrarentur, non Plantarum modo, sed & Quadrupedum, Avium, Amphibiorum, Pisces, Insectorum, Vermiumque notitiam sibi paraturi, hujusque tractatus consignandi typisque vulgandi consilium cepi.

Etiamsi vero haud sine voluptate quadam subit animum, quod Insectorum Genera & Characteres primus constituerim; attamen jam nunc prævidere mihi videor posteram ætatem, mancos hac ex parte labores non injuria mihi olim exprobraturam. O! fortunatos, qui aliquot interjectis seculis, scientiam hanc ad fastigium suum adductam adspecturi, beatorem vivent vitam.

NOMINA SPECIFICA, quæ aliunde desumere maluissem, tantisper a colore fæpius mutuatus sum, unice habita ratione insectorum, quæ inter patria mihi nosse datum est.

SY-

RATIO OPERIS.

SYNONYMA non parum mihi negotii dederunt; Quam facile heic error potuerit admitti, fatis noverit quisquis Phalænas & Papiliones, cetera similimos, diversissimis Larvis induitos vidi. Quippe in hac scientia tantum adhuc deest, quantum quidem Pinace suo præsttit C. Bauhinus.

LOCA NATALIA paucorum Insectorum, v. e. *Plantas*, in quibus naescuntur, certo definire potui, utpote cui temporis defuit spatium atque opportunitas singularum metamorphosin attentioribus oculis persequendi.

MINUTISSIMAS Species *Phalænarum*, *Muscarum*, *Culicum* &c. multas sciens prætermisi, quippe quarum differentiam specificam eruere non dum licuit. Itaque ego has, haud secus ac olim minutissimos suos Muscos Botanici, tantisper intactas relinquo & curis posterioribus reservo. Insectorum enim cognitio, nostro adhuc seculo, ad sublimiorem gradum non evecta est, quam quidem Gessneri jam ætate, ipsa Botanice.

AVIUM sæpe variat color pro anni tempestate, ætate, sexu denique diverso. Neque aliter *Insecta* pro diversitate sexus, colore sæpe numero & magnitudine inter se differunt. Unde novas species facile quivis effingat.

LARVAS insectorum plurimas vidi, quæ larvis exutas nec reperi, nec novi. Itaque et ista omisi, abunde mihi satisfactum ratus, si vel dimidiam insectorum Sueciæ partem enumeravero.

Varietates plurimas studio omisi, uti albo colore spectabiles *Mures*, *Vulpes*, *Hirundines*, *Tetraones*,

RATIO OPERIS.

n̄es, Cornices, Passeres; inter has eminent SCIURUS NIVEUS, oculis dentibusque rubris, cauda minus plana quem amabilis sexus ornamentum, Conjur celsissimi Comitis & Senatoris *Jac. Cronstedt*, in propria aula nuper educavit.

OCCIDUI MARIS littora nunquam lustravi, si exceperis hujus portiunculam, quæ Finmarkiam Norvegicam (sub elevat: gr. 72) superius alluit.

Qui SYNONYMA plura ex *Reaumurii*, *Raji*, *Frischii* &c scriptis mihi communicaverit, rem faciet multo mihi acceptissimam.

Si quis Insectorum, apud nos non occurrentium, semina, connotatis plantarum unde vicitant nominibus, ab exoticis oris ad me transmittenda curaverit, huic alia id genus animalcula, nostris regionibus obvia, lubentissimus reddam.

Qui insectorum naturas, metamorphoses, œconomiam, anatomiam &c. scire velit, adeat *Svammerdamium*, *Reaumurium*, *Frischium*, *Jussiæum*, *Trembleyum*, *Leyonettum*, *De Gereum*, alios; ego ut compendium nostrorum animalium exhiberem, sola nomina commemoravi.

Dabam UPSALIÆ
ex Horto Academicō
1746 Februar. 25

Carolus Linnæus

)**(
AU-

AUCTORES.

Zoologi.

ANONYMUS.

Description of 300 Animales.

Lond. 1730. Oct. p. 212. t. figuris.

BRADLEY Richard.

Philosophical account of works of natur.

Lond. 1721. Quart. p. 194. t. 28.

PETIVER Jacobus.

Centuriæ Musei Petiveriani.

Lond. 1695. Oct. p. 96. t. 2.

Gazaphylacii Naturæ & Artis Decades.

Lond. 1702. Oct.

MERRET Christ.

Pinax rerum naturalium Britannicarum.

Lond. 1667. Oct. p. 223.

CHARLETON Gualter.

Onomasticon Zooicum.

Lond. 1668. Quart.

BAUHINUS Johannes.

Historia fontis Bollenfis.

Montifb. 1598. Quart. p. 222.

WAGNERUS Joh. Jac.

Historia naturalis Helvetiæ.

Tigur. 1680. Duod. p. 390.

SCOTTUS P. Gasp.

Physica curiosa s. Mirabilia naturæ & artis.

Her bip. 1662. Quart. p. 1583.

KLEYNIUS Jac. Theodor.

Classis Quadrupedium & Amphibiorum.

Gedan. 1743. Quart.

WORMIUS Olaus.

Museum Wormianum.

Haffn. 1655. Folio.

OLEARIUS Adamus.

Gottorffische Kunst-Kammer.

Sleswig. 1666. quart. Obl. p. 88.

SEBA

SEBA Albertus.

Thesauri rerum naturalium.

Amstel. 1734. Fol. Vol. 1.

Amstel. 1735. Fol. Vol. 2.

LINNÆUS Carol.

Animalia Sueciæ.

Act. upsal. 1736. quart. Quart.

QUADRUPEDIA.

ÆLIANUS Claud.

Historia Animalium.

Colon. 1616. Oct.

GESNERUS Conrad.

Historia Animalium de Quadrupedibus.

Tigur. 1551. Fol.

Gesnerus redivivus auctus & emendatus.

Francf. 1669. Fol. germ. Vol. 4. per Christium.

JONSTONUS.

Historia naturalis de Quadrupedibus.

Francf. 1652. Fol.

RAJUS Johannes.

Synopsis animalium Quadrupedum & serpentum.

Lond. 1693. Oct. p. 336.

* * *

PAULLINUS Christ. Franc.

Lagographia curiosa.

Aug. wind. 1691. Oct.

Lycographia.

Francf. 1694. Oct.

Cynographia.

Norib. 1685. Quart.

De Afino.

Francf. 1695. Oct.

Talpa.

Francf. 1689.

GRABA Joh. Andr.

Elaphographia s. Descriptio Cervi.

Zen. 1668. Oct.

)**(
2

AGRI-

AGRICOLA Joh. Georg.

Cervi natura & proprietates.

Amberg. 1617. Quart. german. p. 243.

LEOPOLD J. F.

Diff. Acad. de Alce.

Basel. 1700. Quart.

SCHROECKIUS Lucas.

Historia Moschi.

Aug. wind. 1682. Quart.

CAJUS Johannes.

Libellus de Canibus Britannicis.

Norib. 1685. Quart. cum Paullini cynogr.

CASTELLUS Petrus.

Hyæna odorifera.

Francf. 1698. Oct. p. 80. t. 5.

WALDUNGIUS Wolffg.

Lagographia.

Amberg. 1619. Quart.

MARIUS Johannes.

Castrologia.

Aug. wind. 1685.

WORMIUS Olaus.

Historia Animalis e Norvegia.

Haffn. 1653. Quart. t. I. est Mus. 26.

A V E S.

BELLONIUS Petrus.

Portraits de Herbes, Oyseaux, Serpens.

Paris 1618 & 1557. Quart.

GESNERUS Conradus.

Historia Animalium de Avium natura.

Francf. 1586. Fol. p. 806.

ALDROVANDUS Ulysses.

Ornithologia.

Francf. 1610. Fol. Vol. 3.

JONSTONUS Johannes.

Historia naturalis de Avibus.

Francf. 1650. Fol. p. 227. t. 62.

WILLUGBY Franciscus.

Ornithologia reformata a J. Rajo.

Lond. 1676. Fol. p. 307. t. 77. f. 354.

RA-

RAJUS Johannes.

Synopsis methodica Avium.

Lond. 1713. Oct. p. 198. t. 2. f. 24.

ALBIN Eleazar. Pictor. notis *Derhamii*.

Natural History of Birds.

Lond. 1738. Quart. vol. 1. p. 96. t. 101.

1738. Quart. vol. 2. p. 92. t. 103.

1740. Quart. vol. 3. p. 95. t. 101.

MARSILIUS Comes.

Danubius Pannonicus - Mysius. Volumen V.

Amsterd. 1724. Fol.

A M P H I B I A.

HAST Bart. Rudolf. Praeside LINNÆO.

Amphibia Gyllenborgiana. Diss. Acad.

Ups. 1745. Quart. p. 34.

WURFFBAINIUS Joh. Paulus.

Salamandrologia.

Noriberg. 1683. Quart.

PAULLINUS Christ. Franc.

Bufo curiosus.

Noriberg. 1686.

P I S C E S.

BELLONIUS Petrus.

Libri duo de Aquatilibus.

Paris. 1553. Oct - oblong. p. 448.

RONDELETIUS Guilielm.

Libri duo de Piscibus marinis.

Lugdb. 1554. Fol. p. 583.

GESNERUS Conradus.

Historia Animal. de Piscibus & Aquatilibus.

Françf. 1604. Fol.

Françf. 1620. Fol. acutior.

Françf. 1598. Fol. germanice.

ALDROVANDUS Ulysses.

Libri V de Piscibus.

Bonon. 1738. Fol. p. 732.

JONSTONUS Johannes.

Historia naturalis de Piscibus.

Francf. 1649. *Fol.* *Amsterd.* 1657. *Fol.* *Amsterd.* 1716. *Fol.* *Theatrum Animalium.*

SCHONEVELDE Stephanus.

Ichthyologia.

Hamburg. 1624. *Quarta.*

WILLUGBY Franciscus.

Historia Piscium.

Lond. 1686. *Fol.* p. 343.

RAJUS Johannes.

Synopsis methodica Piscium.

Lond. 1713. *Oct.* p. 166. t. 2.

PAULLINUS Christ. Francisc.

Anguilla.

Francf. 1689.

ARTEDIA Petrus,

Ichthyologia.

Lugdb. 1738. *Ott.*

I N S E C T A.

RAJUS Johannes.

Historia Insectorum.

Lond. 1710. *Quart.* p. 398.

FRISCH Johan Lenoh.

Beschreibung von Insecten in Teutschland.

Berolin. 1720. *Quart.* Vol. 13 *singulo t. 3.*

à 1666. *Mart.* 19. *Sultzbach.* w 1743. *Mart.* 21.

REAUMUR.

Historie des Infectes.

Parif. 1734. *&c.* Vol. 5. *Quart.*

Amstel. 1737. *&c.* Vol. 5. *Ottavo.*

DE GEER Carolus.

Varia: Cicada. Podura, Physapus, Curculio.

Aetis Stockholm. & Upsal. 1740 *&c.*

SWAMMERDAM Johannes.

Historia Insectorum.

Utrecht. 1693. *Quart.* *Latine.*

Utrecht. 1685. *Quart.* *Gallice.*

Utrecht. 1669. *Quart.* *Belgice.*

Biblia Naturæ.

Lugdb. 1738. *Fol.*

MER-

MERIANA Maria Sibylla.

Erucarum Ortus & paradoxa Metamorphosis.

Norib. 1679. Quarto.

Francf. 1683. Quarto.

Amsterd. 1730. Quarto.

Metamorphosis Insectorum Surinamensium.

Amsterd. 1705. Fol. p. 60. t. 60.

GOEDART Johannes, Pictor Medioburgensis.

Metamorphosis naturalis s. de Insectis.

Middelb. . . . Oet. belg. Vol. 3. t. 80. 51. 24.

Lond. 1685. Oet. Latine. p. 356. per Listerum.

ALBINUS Eleazar.

Historia naturalis Insectorum Anglicanorum.

Lond. 1710. quart. t. 100.

Lond. 1731. quart. latine; notis Derhami.

BLANCARD Stephanus.

Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden.

Amsterd. 1688. Oet. 1. Belg. p. 282. t. 17.

Lipsia 1690. Oet. germanice.

HOEFNAGEL Johannes Pictor.

Icones Insectorum volatilium.

. . . . 1630. quart. obl. t. 16.

Francf. 1692. quart. obl. vol. 4. singulo t. 12.

ROBERT Nicolaus. Pictor.

Species Florum variæ æneis tabulis.

Parif. . . . Fol. t. 30.

MOUFFETUS Thomas.

Theatrum Insectorum.

Lond. 1634. Folio. p. 326. fig. sparsis.

LISTER Martin.

Historia Animalium Angliae.

Lond. 1678. quart. p. 1 - 100. t. 1. de Araneis.

Appendix ad historiam animalium Angliae.

Lond. 1685. Oet. 2. 3. mutæ cum Goedartio.

Appendix de Scarabæis Britannicis.

Lond. 1710. quart. cum Raj. hist. insect.

JUNGIUS Joachim.

Historia Vermium.

Hamburg 1691. Quart.

ALDROVANDUS Ulysses.

Libri VII de animalibus Insectis.

Bonon. 1638. Fol. p. 767.

JONSTONUS Johannes.

Libri III historiae naturalis de Insectis.

Francf. 1653. 1658. Folio.

REDUS Francisc.

Experimenta circa generationem insectorum.

Amsterd. 1671. 1686. 1712. Duod.

Animalia in animalibus vivis.

Florent. 1684. Quart.

BONANNUS

Micrographia s. Animalia viva in vivis.

Romæ 1691. Quart.

VALISNERIUS Antonius.

Observationes & Experim. circa Hist. nat. & medic.

Patau. 1726. Quart.

JOBLOT.

Descriptions & Usages des plusieurs microscopes.

Paris 1718. Quart.

LEWENHOEK Anton.

Arcana naturæ.

Delph. 1695. Quart. latine vol. 4.

* * *

CLUTIUS Theodorus.

Van de Byen.

Leid. 1597. Octavo.

BUTTERUS Carolus.

Monarchia femina s. Historia Apum.

Lond. 1673.

TRIEWALD Martinus.

Tractat om Bij.

Stockholm 1728. Oct.

ANONYMUS.

Historie naturelle des Abeilles.

Paris. 1744. Duodec. iconibus Reaumuri.

CLUTIUS Augerius.

Opusculum de Hemerobio & Verme majali.

Amsterd. 1634. Quart. p. 103.

SWAM-

SWAMMERDAM Johannes.

Vita Ephemeræ.

Amsterd. 1674. Oct. belgice.

WILLICHIUS Johannes.

Dialogus de Locustis.

- - - 1544. Octavo.

RAPPOLT Carolus Henricus.

An Damnum per Locutas compensetur?

Berolin. 1730. Quart.

REMBOLDUS.

Tractatus de Locustis.

Berol. 1731. Octavo.

BARTHIUS Johan Math.

Dissertatio de Culice.

Ralif. 1737. Fol. p. 8. t. 2.

MOSCETTI.

De Pulice.

1544. Octavo.

RANGO Corn. Tiburt.

De Curculionibus.

Berolin. 1665. Duod. german. p. 94.

SACHS Phil. Jacob.

Gammarologia.

Franckf. 1665.

BREYNIUS J. Phil.

Historia naturalis Coccii radicum tinctorii.

Norib. 1733. in App. E. N. C. tom. 3.

Gedani 1739. Quart. cum prodromo. append.

VERMES.

BONANNUS.

Recreatio mentis & oculi.

Rom. 1681. Quart. Italice.

Rom. 1684. Quart. latine. figuris 540.

LISTER Martinus.

Historia Conchyliorum.

Lond. 1685. Folio.

Historiae Animalium Angliæ pars posterior.

Lond. 1678. Quart. latine. p. 100 - 250. t. 8.

Exercitato anatomica de Cochleis.

*Lond. 1694. Oct.)**(' 5 Exer-*

Exercitatio anatomica de Buccinis.

Lond. 1695. Octav.

RUMPHIUS Georg. Euphard.

Amboiniske raritæten Kammar.

Amsterd. 1700. folio belgice.

ANONYMUS f. Argenwille.

Histoire naturelle la lithologie & conchyliologie.

Paris 1742. Folio p. 491. t. 33.

LANGIUS Carolus.

Methodus testacea marina.

Lucern. 1722. Quart. p. 102.

COLUMNA Fabius.

Observationes aquatilium & terrestrium animalium.

Rome. 1610. Quarto.

HARDERUS Johan. Isac.

Examen Cochlearum terrestris domi portae tab.

Basil. 1674. Quart.

Epistola de partibus genitalibus cochlearum.

Aug. wind. 1684. Quart.

MAJOR Joh. Dan.

Columna de purpura cum methodo Testaceorum.

Kilon. 1675. Quart.

HEBENSTREIT Ernest.

Diss. acad. de ordinibus Conchyliorum methodice.

Lips. 1728. Quart.

ALDROVANDUS Ulysses.

Libri IV. de Exanguibus.

Bonan. 1642. Fol. p. 593.

PAULLINUS Christ. Francif.

Schediasma de Lumbrico terrestri.

Francf. 1703.

LINCKIUS Joh. Henric.

Liber de stellis Marinis.

Lips. 1733. Fol.

STOBÆUS Kilian.

Diss. epistol. de Nummulo Brattensburgensi.

Lund. 1732. Quart. p. 22. t. 1.

FOUGT Henricus. Præside C. LINNÆO.

Diss. Acad. Corallia Balthica.

Upsal. 1745. Quart. p. 40. t. 1. fig. 27.

TER-

TERMINI ARTIS.

QVADRUPEDIA,

Manus pedes anteriores.

Palmae pedes posteriores.

Elongata cauda quæ longitudinem corporis attingit.

Abrupta s. *Truncata* cauda, quæ corpore longe brevior,

A V E S.

Cera tunica nuda frontis basin rostri cingens.

Urrbopygium locus inter dorsum & caudam.

Rectrices Pennæ majores caudam constituentes.

Remiges Pennæ majores in ala quibus volitat avis.

Primariae remiges a flexura alæ ad apicem sitæ.

Secundariae remiges inter flexuram alæ & corpus dispositæ.

Tectrices pennæ quæ alas tegunt.

Papillosa facies nuda papillis tecta.

Artus sunt alæ, cauda, pedes.

Palmati Pedes digitis membrana intertextis.

Lobati Pedes digitis utrinque membraha auctis.

Tridactyli, *Tetradactyli* digitis 3, 4 &c.

A M P H I B I A.

Scuta Abdominis singula seu squamæ latæ Abdomen subtus transversim cingentes.

Verticillata cauda ex squamis in annulos disposita.

Anceps cauda utrinque acie instructa.

P I S C E S.

Dorsalis pinnæ in dorso collocata.

Pectorales pinnæ ad latera corporis juxta caput.

Ventrales pinnæ in abhomine sitæ.

Ani pinnæ pone exitum excrementorum inserta.

Caudæ pinnæ corpus piscis terminans.

Monopterygius, *Dipterygius*: pinnæ unica, gemina.

Branchioptega membrana operculo branchiarum adnexa, radiis instructa, quæ in conspectum prodit dum opercula elevantur.

IN-

TERMINI ARTIS.

INSECTA.

Larva, Eruca. Vermiculus e semine insecti enatus, antequam subierit metamorphosin.

Propolis, Puppa, Chrysalis, Aurelia est Larva quum primam metamorphosin subierit, antequam in perfectum statum pervenerit.

Coleoptera insecta quorum alae elytris tecta sunt.

Hemiptera insecta quorum alae non ex toto, sed parte tecta sunt elytris.

Gymnoptera insecta elytris destituta.

Elytron est ala superior cornea s. crustacea, quæ alas inferiores tenuiores tegit.

Scutellum est crusta parva inter elytrorum aut alarum paria ad basin collocata, quasi thoracis apex a tergo.

Sutura elytrorum est rima qua coëunt vel cum thorace vel inter se invicem.

Antennæ sunt cornua mobilia insectorum.

a figura clavatae, pectinicornes, prismaticornes, subulatae.

Halteres capitella petiolata sub alis Dipterorum.

Elinguis, os nullum, unde insectum edere nequit.

Spirilinguis, os lingua spirali simplici vel duplo.

Tetrapus Pedes 4 unguiculati, licet saepe duo alii absque unguibus.

Alæ *Primores* in papilionibus sunt majores seu anteriores, *secundarie* in iisdem alæ posteriores.

Classis I.

QUADRUPEDIA
I. ANTHROPOMORPHA.

Homo.

I. HOMINES inhabitantes Sueciam sunt vel

α GOTHI corpore proceriore, capillis albidis rectis, oculorum iridibus cinereo-cærulescentibus.

β FENNONES corpore toroso, capillis flavis prolixis, oculorum iridibus fuscis.

γ LAPPPONES corpore parvo macro, capillis nigris rectis brevibus, oculorum iridibus nigricantibus.

δ VARII & mixti ex præcedentibus α . β . & aliis, qui sedem in Sueciæ regno fixerunt; prout alios ubique per Europam videre est.

Habitan per totam Sueciam, sic tamen ut *Hos* (δ) præfertim in urbibus reperias; *Gothos* in remotissimis provinciis ab Holmia; *Fennones* ab orientali plaga sinus Bothnici; *Lappones* fere solos intra Lapponiæ sylvas per hyemes, & inter alpes per æstates, semper casas & tentoria inhabitantes, nec domibus & palatiis gaudentes; *Hi* (γ) moribus, victu, amictu, lingua &c. ex eadem cum Samojedis se prognatos esse gente, aperte testantur.

II. FERÆ.

Ursus.

2. URSUS cauda abrupta. *Syst. nat.* 35.

Gesn. quadr. 14. Ursus.

Aldrov. digit. 117. Ursus.

Scott. phys. 1093. t. 50. Ursus.

2 QUADRUPEDIA. FERÆ.

Fonst. quadr. 125. t. 55. Ursus.

Charl. onom. 13. Ursus.

Gall. adopt. 67. t. 67. Ursus.

Raj. quadr. 171. Ursus.

Suecic Biorn.

Habitat in sylvis vastissimis densissimisque borealis Sueciæ.

Fila e tendinibus conficiunt Lappones rhangiferinis præstantiora.

Felis.

3. FELIS cauda elongata; auribus æqualibus. *Syst. nat.* 35.

Gesn. quadr. 98. Felis vulgo Catus.

Aldrov. digit. 564. Felis.

Fonst. quadr. 180. t. 72. Felis domestica.

Charl. onom. 20. Felis.

Raj. quadr. 98. Felis vulgo Catus.

Suecic Katta.

Habitat in domibus cicurata, exoticæ originis.

4. FELIS cauda truncata; corpore rufescente maculato.

Syst. nat. 35.

Gesn. quadr. 155. Lupus cervarius.

Aldrov. digit. 90. Lynx.

Fonst. quadr. t. 71. Lynx.

Charl. onom. 13. Lynx.

Raj. quadr. 166. Lynx.

Suecic Warglo.

Habitat in sylvis densis, arbores scandens.

5. FELIS cauda truncata; corpore albo maculato. *Syst.*

nat. 35.

Aet. upf. 1736. p. 2. n. 3. Lynx colore albo; maculis nigris; cauda truncata.

Suecic Kattlo.

Habitat rarius in vastissimis sylvis, arbores scandens.

Mustela.

6. MUSTELA rufo-fusca; medio dorſi nigro.

Ot. *Magn.* Gulo.

Charl.



QUADRUPEDIA. FERÆ.

Charl. onom. 14. Gulo.

Scheff. lapp. 339. Gulo.

Rzacz. polon. 218. Gulo.

Suecis Järf, Filfrass.

Habitat in alpibus Lapponicis, Dalekarlicis, sylvisque vastissimis.

7. MUSTELA fulvo-nigricans, gula pallida.

Gesn. quadr. 151. Martes.

Jonst. quadr. t. 64. Martes.

Charl. onom. 19. Martes.

Scott. phys. 1068. t. 46. f. 3. Martes.

Raj. quadr. 200. Martes aliis Foyna.

Suecis Mård.

Habitat in sylvis fageticinis abietinisque.

DESCR. Duplex datur varietas Fagorum & Abietum.

Aures breues. Nafus prominens. Maxilla superior obtusa. Dentes superiores incisores 6, paralleli, parvi, obtuso-acuti; canini 2, maximi, spatio remoti: Molares 5, quorum tres anteriores simplices minores, reliqui duo spatio remoti. Inferiores incisores 6, quorum duo medii retusi, minimi, obtusi. Canini duo maximi, cum incisoribus paralleli: Molares uti superiores. Lingua longa, lævis, testa papillis acutis, mollibus, retro-spectantibus.

Pedes 5. dactyli, digitis subæqualibus, undique villosi, semipalmipes, pollice paulo breviori.

Cauda magna, longitudine corporis ad collum usque.

Color totius fuscus, collo subtus pallide albo. Myxtaces ut in fele.

8. MUSTELA flavescente-nigricans, ore albo, collaris flavescente.

Gesn. quadr. 767. Putorius.

Aldr. quadr. 330. Putorius.

Jonst. quadr. 155. t. 64. Putorius.

Merr. pin. 163. Putorius.

Raj. quadr. 199. Putorius.

Scanis Iller.

Habitare fertur in Scania campestri.

9. MUSTELA caudæ apice atro.

Gesn. quadr. 149. Mustela.

Aldr. quadr. 307. Mustela vulgaris.

Jonst. quadr. t. 74. Mustela vulgaris.

Raj. quadr. 195. Mustela vulgaris.

Charl. onom. 19. *Mustela sylvestris.*

Smolandis Wesla.

β Raj. quadr. 198. *Mustela candida* f. *animal Ermineum recentiorum.*

Charl. onom. 19. *Hermellanus.*

Wagn. helv. 180. *Mustela alpina candida.*

Suecic. *Hermelin*, *Lekatt.*

Habitat in sylvis, præsertim Lapponiæ; nec non passim ad domos.

Lutra.

10. *LUTRA* digitis omnibus æqualibus. *Syst. nat.* 36.

Bell. aquat. 31. t. 32. *Lutra.*

Gesn. ichth. 515. *Lutra.*

Aldr. quadr. 294. *Lutra.*

Jonst. quadr. 104. *Lutra.*

Schonev. ichth. 46. *Lutra.*

Charl. onom. 17. *Lutra.*

Scott. phys. 1063. f. 45. *Lutra.*

Gall. adopt. 147. t. 147. *Lutra.*

Raj. quadr. 187. *Lutra.*

Suecic. *Utter.*

Habitat in flaviis, stagnis, piscinis passim.

Phoca.

11. *PHOCA* dentibus caninis tectis. *Syst. nat.* 36.

Gesn. aqu. 702. *Phoca* f. *vitulus marinus.*

Aldr. pisc. 722. *Phoca* f. *vitulus.*

Jonst. ichth. t. 44. *Phoca vulgaris.*

Rond. pisc. 1. p. 453. *Vitulus marinus.*

Gall. adopt. 191. t. 191. *Veau marin.*

Raj. quadr. 189. *Phoca* f. *vitulus marinus.*

Ephem. N. C. 1. p. 9. t. 1. *Phoca.*

Suecic. *Siäl.*

Habitat in mari Bothnico & Baltico frequens.

DESCR. Varietas duplex numeratur Græ Siäl & Wikare Siäl: hic parit Februario; ille Januario; hic solitarius incedit; ille gregarius; hic niger est, ille canus.

Canis

Canis.

12. CANIS cauda recurva. *Syst. nat.* 36.

Aldr. *quadr.* 482. *Canis.*

Gesn. *quadr.* 91. *Canis socius & fidelis.*

Jonst. *quadr.* 122. *Canis.*

Raj. *quadr.* 177. *Canis oicurus, domesticus s. socius.*

Charl. *onom.* 23. *Canis villaticus.*

Suecic Hund.

a *Charl.* *onom.* 23. *Canix sagax.*

Suecic Jagt-hund.

B *Raj.* *quadr.* 176. *Canis venaticus grajus. s. græcus,*
nonnullis scoticus.

Suecic Wint-hund.

y *Raj.* *quadr.* 176. *Canis mastivus.*

Gesn. *quadr.* 92. *Canis sanguinarius.*

Suecic Blod-hund.

d *Raj.* *quadr.* 177. *Canis aquaticus aviarius.*

Suecic Engelsk Dogg.

e *Raj.* *quadr.* 177. *Canis melitæus.*

Suecic Knåhund.

f *Vulgi* *Canis nudus æthiopicus.*

Suecic Naken-hund.

Habitat in domibus, exoticæ originis, frequen-
tissimus.

13. CANIS cauda incurva.

Syst. nat. 36. *Canis cauda recta, corpore breviore.*

Gesn. *aquat.* 152. *Lupus.*

Aldr. *quadr.* 144. *Lupus.*

Jonst. *quadr.* 89. *Lupus.*

Charl. *onom.* 14. *Lupus vulgaris.*

Raj. *quadr.* 173. *Lupus.*

Suecic Warg, Ulf.

Habitat hodie vulgaris in sylvis, ante 26. annos
rarius animal in Suecia.

14. CANIS cauda erecta.

Syst. nat. 36. *Canis cauda recta longitudine corporis.*

Gesn. quadr. 55. *Vulpes.*

Aldr. quadr. 195. *Vulpes.*

Jonst. quadr. t. 56. *Vulpes.*

Charl. onom. 14. *Vulpes.*

Raj. quadr. 177. *Vulpes.*

Suecic Råf.

Habitat ubique in sylvis.

Varietates plurimæ dantur in nostra Suecia:

α *Fulvus*, qualis noster communis est.

β *Albus*, Fjäll Racka, in alpibus Lapponicis omnibus.

γ *pedibus* fere leporinis. an distincta species?

γ *Cærulescens*, Blåraf.

δ *Cruciatus*, Korssraf.

ε *Ferrugineus*, Brandraf.

Meles.

15. MELES unguibus anticis longissimis. *Syft. nat.* 37.

Gesn. quadr. 686. *Meles.*

Aldr. quadr. 264. *Taxus.*

Jonst. quadr. t. 64. *Taxus.*

Charl. onom. 17. *Taxus & Daxus.*

Raj. quadr. 185. *Taxus f. Meles.*

Merr. pin. 168. *Taxus suillus, Meles.*

Suecic Gråf-svin.

Habitat in sylvis umbrosis depresso lapidosis minus frequens.

DESCR. Corpus supra album, subtus nigrum, contra ac in reliquis plerisque animalibus.

Erinaceus.

16. ERINACEUS spinosus auriculatus. *Syft. nat.* 37.

Gesn. quadr. 368. *Echinus terrestris.*

Aldr. quadr. 459. *Echinus terrestris.*

Jonst. quadr. 119. t. 68. *Erinaceus.*

Charl. onom. 19. *Erinaceus.*

Raj. quadr. 231. *Echinus f. Erinaceus terrestris.*

Seb. thes. 1. p. 78. t. 49. f. 1. 2. *Erinaceus par-*
oys nostras.

It. gotl. jul. 10. Erinaceus.

Suecic Igelkott.

Habitat in Gotlandia & Gothia frequens; in Suecia rarius; in Norlandia vix ullibi.

DESCR. *Corpus spinis undique coopertum: spinis subcinereis vel albidois Zonis fuscis variis. Caput (excepto vertice) & corporis pars supina pilis, non spinis, testa, subcinerea. Auriculae rotundæ. Oculi parvi, nigri. Nasus acutus: narium foramina exteriore latere appendiculo membranaceo-carnoso criso instruenda. Manus ursi pentadactyli & palmae omnino similes, e quibus secundus longior reliquis. Preputium propendens.*

Talpa.

17. TALPA caudata. *Syst. nat. 37.*

Gesn. quadr. 931. Talpa.

Aldr. quadr. 451. Talpa.

Jonst. quadr. 118. Talpa.

Charl. exerc. 25. Talpa.

Raj. quadr. 236. Talpa.

Seb. thes. 1. p. 51. t. 32. f. 2. Talpa virginianus niger.

α Seb. Thes. 1. p. 68. t. 41. f. 1. Talpa alba nostras.

β Seb. Thes. 1. p. 68. t. 41. f. 4. Talpa maculata ost- frifica.

Suecic Mullvad. Smolandis Surck.

Habitat sub terra in agris, pratis, hortis.

Vespertilio.

18. VESPERTILIO caudatus, naso oreque simplici.

Syst. nat. 37.

Bell. av. 147. Vespertilio.

Gesn. av. 694. Vespertilio.

Aldr. orn. 1. p. 571. Vespertilio.

Jonst. av. 34. Vespertilio.

Charl. Exerc. 80. Vespertilio.

Raj. quadr. 243. Vespertilio.

Dal. pharm. 451. Vespertilio.

Alb. orn. 3. p. 95. t. 101. Vespertilio.

Suecic Läderlapp, Flädermus. Smolandis Nattblacka.

Habitat in cavis arborum & murorum rimis, noctu-

volitat, phalænis viicitat.

DESCR.

DESCR. Dentes primores superiores 6, acuti, distantes.
inferiores 5, acuti-contigui.

Canini superiores 2, anteriore majore.

inferiores 3, antico maximo.

Molares utrinque 3; tricuspidati.

Manus pentadactylæ palmato-alatae maximæ.

Palmæ pentadactylæ fissæ parvæ.

Maxilla inferior prominet extra superiorem.

Obs. *Ursus*, *Meles*, *Erinaceus*, *Talpa*, *Vespertilio perhyemes* dormiunt abstemii.

III. GLIRES.

Lepus.

19. LEPUS cauda abrupta; pupillis atris. *Syst. nat.* 38.

Gesn. quadr. 69. *Lepus.*

Aldr. quadr. 247. *Lepus.*

Jonst. quadr. t. 65. *Lepus.*

Charl. onom. 20. *Lepus.*

Raj. quadr. 204. *Lepus.*

Suecic Hare.

Habitat ubique in sylvis, apud nos æstate cinereus, hyeme semper albus.

E lana alba Leporis conficitur acu pannus (Filt dictus) retia potius dicas pulicum, in quibus pulices omnes congregantur corporis totius Dalekarlorum experimento, corpori intra indusium scilicet admotus.

20. LEPUS cauda brevissima; pupillis rubris. *Syst. nat.* 38.

Gesn. quadr. 72. *Cuniculus.*

Aldr. quadr. 382. *Cuniculus.*

Jonst. quadr. t. 65. *Cuniculus.*

Charl. onom. 21. *Cuniculus.*

Raj. quadr. 205. *Cuniculus.*

Suecic Kanin.

Habitat in domibus aliunde advectus.

Sciurus.

21. SCIURUS palmis solis faliens. *Syst. nat.* 38.

Gesn.

Gesn. quadr. 13. *Sciurus.*

Fonst. quadr. t. 66. *Sciurus.*

Raj. quadr. 214. *Sciurus vulgaris.*

Suecic *Ikorn.* *Ostrobothniensibus Gråskin.*

Habitat in arboribus frequens, æstate ruber, hyeme incanus, Gråwerck dictus.

22. **SCIURUS** *hypochondriis prolixis volitans.* *Syst. nat.* 38.

Seb. thes. I. p. 67. t. 41. f. 3. *Sciurus volans.*

Att. petrop. *Habitat in Finlandia & Lapponia,* licet rarius.

Castor.

23. **CASTOR** *cauda ovata plana.* *Syst. nat.* 39.

Ælian. anim. 359. *Castor.*

Hildeg. physf. 115. *Biber.*

Bellon. aquat. 29. t. 30. *Fiber.*

Gesn. ichth. 185. *Castor.*

Fonst. ichth. t. 68. *Castor.*

Rond. ichth. 236. *Castor.*

Charl. onom. 17. *Castor.*

Gall. adopt. 131. t. 131. *Castor.*

Scott. physf. 979. t. 33. *Castor s. Biber.*

Schonev. icbth. 34. *Fiber s. Castor.*

Raj. quaar. 209. *Castor s. Fiber.*

It. lapp. maj. 28.

Suecic *Båfwer.*

Habitat in lacubus & fluviis, præsertim Lapponiæ, victitans corticibus Populi, Sorbi &c.

24. **CASTOR** *cauda longa lanceolata plana.*

Clus. exot. 375. *Mus aquaticus exoticus.*

Worm. mus. *Mus aquaticus.*

Raj. quadr. 217. *Mus aquaticus exoticus.*

Suecic *Dæfman.*

Habitat in stagnis vadosis, visus ut fertur in Suecia, sed non nobis; in Russia frequens.

25. CASTOR cauda linearis tereti. *Syst. nat.* 39.

Raj. quadr. 217. *Mus major aquaticus* s. *Rattus aquaticus*.

Habitat in fossis, paludibus & ad aquas luto-sas rarius.

Mus.

26. MUS cauda brevi, corpore fulvo nigroque variegato.

Scheff. lapp. 346. *Mus montanus*.

Ol. Magni sept. l. 18. c. 20. *Lemmus*.

Worm. mus. 322. t. 325. *Mus norwagicus vulgo Lemming.*

monogr. 6. *Mus norwagicus*.

Olear. mus. 21. t. 12. f. 6. *Leming*.

Raj. quadr. 227. *Mus norwagicus vulgo Leming*.

Charl. onom. 22. *Mus norwegicus*.

Act. stockb. 1740. p. 326. t. 6 f. 4. 5. *Mus cauda abrupta*; corpore fulvo nigro maculato.

Suecias Fiällmus, *Säbelmus*. *Lappis Lumimick*.

Habitat in alpibus Lapponicis omni anno, descendit gregatim in adjacentes Provincias incertis temporibus & annis.

27. MUS cauda brevi, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascente.

Raj. quadr. 218. *Mus agrestis*, capite grandi, brachyuros.

Habitat in agris frequens sub messe.

28. MUS cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerascente.

Gesn. quadr. 109. *Mus domesticus major*.

Jonft. t. 66. *Glires*.

Raj. quadr. *Mus domesticus major* s. *Rattus*.

Suecias Rotta.

Habitat ubique in Suecia, excepta Lapponia, in domibus tædiosus.

29. MUS cauda longa pilosa; auribus subrotundis velle-re brevioribus.

Ha-

QUADRUPEDIA. JUMENTA. ii

Habitat circa Upsaliam plerumque sub terra & in aqua. hortis admodum noxius.

DESCR. Magnitudo & facies ferme precedentis; *at cauda* minime glabra & nuda, sed pilosa uti corpus, nec est ejusdem longitudinis ac in Ratto, cum in hoc vix dimidiam corporis longitudinem adtingit. *Dorsum* fuscum s. nigrum. *Abdomen* cinereo-fuscum. *Aures* parvæ, pilosæ, uti reliquum corporis. *Pedes* fissi. *Dentes* superiores buxei coloris.

30. MUS cauda longa, corpore nigro-flavescente, abdome albo.

Raj. quadr. 218. Mus domesticus medius.

Habitat in domibus & sylvis.

31. MUS cauda longa nudiuscula; corpore cinereo-fusco, abdome subalbescente.

Raj. quadr. 218. Mus domesticus vulgaris s. minor.

Jonst. quadr. t. 66. Mures.

Suecic Mus.

Habitat ubique in domibus & sylvis glandiferis non solum animalculum rebus esculentis.

32. MUS cauda longa pilosa; corpore rufo, gula albicans.

Raj. quadr. 220. Mus avellanarum minor.

Habitat in sylvis, & hortis saepe infestus.

IV. JUMENTA.

Sorex.

33. SOREX.

Gesn. quadr. 747. Mus araneus.

Aldr. quadr. 441. Mus araneus.

Jonst. quadr. t. 66. Mus araneus.

Charl. onom. 25. Mus araneus.

Schwenckf. quadr. 114. Mus araneus.

Dal. pharm. 450. Mus araneus.

Raj. quadr. 239. Mus araneus.

Suecic Nåbbmus.

Habitat passim in fodinis, sylvis.

DESCR. Corpus cinereo-nigricans, magnitudine muris minoris. *Cauda* ex-
alte

aëte muris, longa. *Aures* breves, ampleæ. *Rosfrum* suillo magis prominenſs, apice naribus instruēto, longissimo, undique vibrizis obvallato. *Labium* inferiorius $\frac{2}{3}$ minus superiori. *Pedes* nudi 5-5. fissi. *Maxilla* inferioris molares 4. acuti, quadrifidi. Incisores 2. recti, ferrati. superioris molares 4. bifidi. *Canini* 4. minimi. Incisores 2. bifidi, incurvi.

Equus.

34. EQUUS cauda undique setosa. *Syst. nat.* 40.

Gesn. quadr. 132. Equus, Caballus, Equa.

Aldr. quadr. 12. Equus.

Jonst. quadr. 1. t. 1. 23. 4. Equus,

Charl. onom. 2. Equus,

Raj. quadr. 62. Equus.

Suecis Håst.

Habitat interdum sponte in Scania & Gotlandia, communiter cicur. Oelandi, ex gothici maris insula, totius orbis minimi. *Jonst. quadr.* 20.

Hippomanes theophrasti Corpus linguiforme, facie lienis, in os pullorum dum excluditur, frequens observatur, de quo veteres multa; magicum & antepilepticum &c.

35. EQUUS cauda extremo setosa. *Syst. nat.* 40.

Gesn. quadr. 40. Afinus.

Aldr. quadr. 295. Afinus.

Jonst. quadr. 12. t. 6. Afinus.

Raj. quadr. 63. Afinus.

Charl. onom. 3. Afinus domesticus.

Suecis Afna:

et *Raj. quadr.* 64. Mulus.

Suecis Mulåfna.

Habitat in Magnatum prædiis rarius, aliunde aduentum animal.

Sus.

36. SUS dorso antice setoso; cauda pilosa. *Syst. nat.* 41.

Gesn. quadr. 146. Aper.

Aldr. bisulc. 1013. Aper.

Charl.

Charl. onom. 11. Aper.

Fonst. quadr. 74. Aper.

Raj. quadr. 96. *Sus agrestis* f. Aper.

Suecic Will-Swin.

β *Charl. onom.* 11. Sus.

Aldr. bisulc. 937. Sus.

Fonst. quadr. 47. Scrofa.

Gesn. quadr. 872. Sus.

Raj. quadr. 92. *Sus* f. *Porcus domesticus*,

Suecic Swin.

Habitat in Oelandia a Rege nostro Potentissimo

FRIEDERICO I. ibidem introductus; at varietas β
ubique ab œconomis alitur.

Obs. *passim* reperiuntur Sues monungulæ f. *ungulis solidis*
nec bifidis.

V. PECORA.

Cervus.

37. CERVUS cornibus acaulibus palmatis. *Syst. nat.* 42.

Gesn. quadr. 39. Alces.

Aldr. bisulc. 836. Alce.

Fonst. quadr. 65. t. 30. Alce.

Charl. onom. 9. Alce.

Scott. phys. 901. t. 24. Alce.

Gall. adopt. 169. t. 169. Alce.

Raj. quadr. 39. Alce.

Olear. mus. 12. t. 9. f. 2. Alcis cornu.

Suecic Elg.

Habitat in sylvis rarius obvius hodie, quam olim.

38. CERVUS cornibus ramosis teretibus incurvatis.

Syst. nat. 42.

Gesn. quadr. 79. Cervus, Cerva, Hinnulus.

Fonst. quadr. t. 31. Cervus.

Charl. onom. 8. Cervus.

Raj. quadr. 84. Cervus.

Sue-

Suecis Hiort, Kronhiort.

Habitat in sylvis rarius, in vivariis Regis frequens.

39. CERVUS cornibus ramosis teretibus: summitatis
bus palmatis. *Syst. nat.* 42.

Gesn. quadr. 130. Rangifer.

Aldr. bisulc. 859. Tarandus.

Jonst. quadr. t. 37. Cervus palmatus.

t. 36. Cervus mirabilis. *fig. bon.*

t. 34. Tragelaphus.

t. 34. Hippelaphus.

Olear. mus. 16. t. 10. f. 3. Rhangifer.

Raj. quadr. 88. Ceruus rangifer. (*fig. bona*)

Charl. onom. 9. Rangifer & Tarandus.

Suecis Rhen.

Habitat in alpibus Lapponicis plane spontanei, licet
& cicures pecora sint unice Lapponum.

Hujus femina æque ac mas cornuta est, quamvis cornua minora; reli-
quæ species feminis inernibus gaudent. Ruminat æque ac aliae species
sui generis; vicitrat præfertim Lichenibus per hyemem.

40. CERVUS cornibus ramosis compressis: summitati-
bus palmatis. *Syst. nat.* 42.

Bell. itin. clus. 57. Dama.

Gesn. quadr. 84. Dama vulgaris platyceros.

Aldr. bisulc. 741. Dama.

Jonst. belg. t. 31. Dama.

Raj. quadr. 85. Cervus platyceros.

Suecis Dof, Dofhiort.

Habitat in vivariis Regis & Magnatum, nec non in-
terdum in sylvis.

41. CERVUS cornibus ramosis teretibus erectis. *Syst.*
nat. 41.

Gesn. quadr. 64. Capra, Capreolus s. Dorcas.

Aldr. quadr. 738. Caprea plinii, Capreolus.

Jonst. quadr. t. 33. Capreolus marinus.
t. 33. Capriolus.

Charl. onom. 9. Dorcas.

Raj. quadr. 89. Caprea Plinii, Capreolus vulgo.

Sue-

Suecis Rådiur.
Habitat in sylvis rarer hodie, quam olim.

Capra.

42. CAPRA cornibus carinatis arcuatis. *Syst. nat. 42.*

Gesn. quadr. 57. Capra.

Aldr. bisulc. 619. Caper.

Jonst. quadr. 27. Hircus.

Charl. onom. 7. Hircus domesticus.

Raj. quadr. 77. Capra domestica.

Suecis Get.

Habitat culta frequens, vicitans tenellis ramulis
fruticum.

Ovis.

43. OVIS cornibus compressis lunatis. *Syst. nat. 43.*

Aldr. bisulc. 370. Ovis.

Gesn. quadr. 138. Ovis.

Jonst. quadr. 38. Ovis.

Raj. quadr. 73. Ovis domestica.

Charl. onom. 6. Ovis.

Suecis Får.

Habitat ubique culta; vivit præsertim in aridis ste-
rilissimis.

Bos.

44. BOS cornibus teretibus flexis. *Syst. nat. 43.*

Charl. onom. 5. Bos domesticus.

Aldr. bisulc. 13. Bos

Gesn. quadr. 25. Bos.

Raj. quadr. 70. Bos domesticus.

Suecis Ko, Nöt,

Habitat ubique culta; nullibi apud nos Ursus sylve-
stris est; vicitat præsertim plantis paludosis.

Classis

Classis II.

AVES.

I. ACCIPITRES.

Strix.

45. STRIX capite aurito; corpore rufo.

Gesn. av. 234. Bubo primus.

Bell. av. 25. a. Bubo.

Willugb. orn. 62. n. 12. Bubo primus.

Alb. orn. 2. p. 9. t. 9. Bubo.

Suecic. Uf.

Habitat in petris sylvaticis præruptis, arcibus ac turribus præaltis, ruderatis, victitans leporibus, mustibus.

DESCR. Magnitudo circiter anseris domesticæ. *Corpus* testaceo - rufum hæneolis omnibus transversis undulatis nigris & majoribus longitudinalibus itidem nigris. *Cauda* alis longior fasciis folidis. *Alæ* maculis nigris adspersæ. *Tibiae & pedes* crasso vellere, leporis instar, vestitæ. *Rostrum* nigrum basi fetis loco seræ vestitum.

46. STRIX capite aurito; corpore albido.

Rudb. piæt. Bubo scandianus.

Habitat in alpibus Lapponicis.

DESCR. Magnitudo Meleagridis; *corpus* totum album nigris maculis adspersum. Similis Noctuae 54. ni supercilia aurita adefessent in hoc Bubone.

47. STRIX capite aurito pennis sex.

Bell. icon. 25. 6. Afio, Otus.

Will. ornith. 64. f. 12. Otus f. Noctua aurita.

Raj. av. 25. n. 2. Otus f. Noctua aurita, Afio latinis.

Alb. orn. 2. p. 10. t. 10. Otus f. Afio.

Suecic. Horn-uggla.

Habitat in sylvis, cavis arboribus & domibus desertis.

48. STRIX capite lœvi; corpore ferrugineo; oculorum iridibus atris; remigibus primoribus serratis.

Gesn. av. 773. Ulula.

Aldr. orn. 8. t. 6. Ulula.

Will. ornith. 68. t. 13. Ulula aldrovandi.

Raj. av. 26. n. 4. Ulula latinis.

It. oel. 69. Noctua.

Habitat in cavis arborum.

DESCR. Magnitudo fere Gallinæ; Color dorsi, caudæ, alarum griseus. Caput e griseo albo nigroque maculatum. pone aures circuli segmentum nigrum e pennis singularis stricaturæ. Maculæ albæ ad latera dorſi & in tegitibus alarum. Remiges 1. 2. 3; sensim breviores, & exteriori margine ferratae; omnes 1-24 griseæ fasciis latis fusciis; Ræfrices subgriseæ fasciis 5. subfuscis, exceptis duabus intermediis. Abdomen albicans maculis oblongis griseis nigrisque. Pedes albidi punctis nigricantibus.

49. STRIX capite lœvi; corpore luteo.

Rudb. pict. Strix tota flammea.

Habitat Upsaliæ rarius.

50. STRIX capite lœvi; corpore fusco; iridibus oculorum fulvis.

Rudb. pict. Noctua major, oculorum iridibus croceis.

Habitat in Suecia boreali.

DESCR. Magnitudo Cuculi.

51. STRIX capite lœvi; corpore fusco; iridibus oculorum flavis.

Rudb. pict. Noctua major, oculorum iridibus pallide luteis.

DESCR. Antecedenti similis, sed paulo major. Magnitudo corvi. Corpus totum supra sordido-cinereum maculis pisiformibus albis. Caput utrinque annulo sordido-nigricante cinctum; intra annulos singulos color fusco-albicans; infra circulos albidum est caput cum tintura e sordido fusca. Iris oculorum pallide lutea. Rostrum albidum; ungues nigri.

52. STRIX capite lœvi; corpore supra fusco: albo maculato; rectricibus omnibus fasciis albidis.

Habitat inter Pithoam & Luloam urbes Westrobotniæ.

DESCR. Multa habet cum antecedenti communia, ut forte vel sexu vel aetate sola differat. Corpus supra fuscum maculis albis majusculis adspersum; subræs tota avis cinereo-alba lineis transversis subundulatis fusciis, ita ut singula penna fasciis 5 vel 6 fusciis picta sit. Alæ fuscae maculis raris albis, quorum remiges fuscae a lateribus inaculis subrotundis albis notentur. Cauda pedalis fere, angusta, fusca, fasciis 9. vel 12. albidis cincta. Caput ci-

cinereum punctis s. undulis eonglobatis tegitur. *Regio temporum cinerea*-alba. Canthus oculi uterque niger. a regione aurium macula nigra oblonga descendit usque ad maxillam inferiorem, sensim angustata, quam excipit macula oblonga cinerea undulis raris nigris, dein & alia nigra prima simillima, quae basi cum prima coit. *Mentum* s. gula macula parda nigra tegitur. *Tibiae* plumosae cinereæ lineis pallidis testæ, ungues acutissimi pallido-nigricantes. Magnitudo avis corvi est.

53. STRIX capite lævi; corpore fusco; remigibus albis maculis quinque ordinum.

Gesn. av. 620. Noctua.

Aldr. orn. l. 8. c. 7. Noctua.

Will. orn. 69. t. 13. Noctua minor & minima.

Raj. av. 26. n. 6. Noctua minima.

Alb. orn. 2. p. 12. t. 12. Noctua minima.

Habitat in cavis arborum.

DESCR. Magnitudo Meruleæ. *Corpus* totum supra fusco-cinereum punctis albicantibus, infra vero totum albicans cum maculis longitudinalibus fusco. *Alæ* subtus maculis albis per 5. ordines dispositis, quarum extimæ minores sunt. testrices alarum tam supra quam infra alba. extus in aliis puncta albida per 5. vel 6. ordines disposita. *Cauda* lineis 4. albis transversis. *Caput* punctis numerosis albis; tempora alba. *Rostrum* luteum vibrissis nigris. *Pedes* albidi subtus lutei, unguibus nigris.

54. STRIX capite lævi; corpore albido.

Rudb. pit. Noctua scandiana maxima ex albo & cinereo variegata.

Suecic Harfang.

Habitantem reperi Arofæ in prædio illustrissimi comitis Cronstedtii Regis Regnique Senatoris, Fulleröa.

DESCR. Gallo duplo major; *Corpus* totum fere niveum; *Pectus* & abdomen lineis undulatis transversis fusco, uti & testrices alarum eodem modo pictæ. *Remiges* expansæ niveæ secundum longitudinem alarum duplex ordine macularum parvarum, subrundarum, cinerearum, quibus & interdum tertius macularum ordo accedit. *Caput* fere album, ut & cauda, quæ tamen nigris minimis punctis aut maculis temere notantur.

55. STRIX capite lævi; corpore ferrugineo; remige tertia longiore.

Aldr. orn. 561. t. 563. Strix.

Will. orn. 65. Strix.

Raj. av. 25. n. 2. Strix.

Habitat in sylvis frequens per Sueciam.

Falco.

56. FALCO cera lutea; pedibus lanatis; corpore rufo.

Gesn.

Gesn. av. 168. Aquila germana.

Jonst. av. t. 1. Aquila gesneri s. Chrysaëtos aquila.

Will. orn. 27. t. 1. Chrysaëtos.

Raj. av. 6. n. 1. Chrysaëtos.

Suecis Örn.

Habitat in petris altis & præruptis.

DESCR. Magnitudo anserem superat; Corpus testaceum, anterius magis rufelcens, posterius magis nigricans. Cauda rufa, maculis rariis albidi sparsis. Tibiae lanatae digitis luteis: ungibus longitudine digitorum. Rostrum breve, apice aduncum, nigro, myxtaces setis constructæ, supra quas cera lutea, in qua nares transversæ. Ova 4.

57. FALCO pedibus ceraque cæruleis; corpore supra fusco; capite albo.

Gesn. av. 74. Falco, cui pedes cærulei, Cyanopoda.

Aldr. orn. l. 2. c. 3. Haliætus.

l. 2. c. 7. Morphnos.

Will. orn. 37. t. 6. Balbusardus.

Raj. av. 16. n. 3. Balbusardus anglorum.

Suecis Blåfot, Fisk-örn.

Habitat humi inter arundines juxta aquas; Ova 4. alba, elliptica, magna. Vicitat piscibus.

DESCR. Cera cærulescens. Iris flava. Nares oblongæ. Pedes cærulescentes, digitus extimus retrorsum quasi versatilis: corporis color supra fusco, excepto capite albo. Corpus subtus totum album; unguis subtus tertiusculi.

58. FALCO cera flava; restringibus albis, versus apices nigris.

Bell. icon. 15. Pygargus.

Gesn. av. 205. Pygargus.

Will. orn. 31. Pygargus s. Albicilla, quibusdam Hinularia.

Raj. av. 7. n. 5. Pygargus.

Habitat passim in sylvis.

DESCR. Corpus testaceum; pennæ capitis & colli acutæ; pennarum marginæ albicant s. pallescit. Abdomen brunneum. Remiges nigrae, quarum majoræ introrsum albæ, harum duodecim versus apicem albæ, extrorsum vero nigrae. Tibiae, rostrum & cera lutea. magnitudo anseris. Fæmina albidior est.

59. FALCO cera flava; cauda forcipata, corpore ferrugineo, capite albidiore.

Gesn. av. 610. Milvus.

Aldr. orn. 368. t. 1. Milvus.

Will. orn. 41. t. 6. Milvus.

Raj. av. 17. n. 6. Milvus.

Albin. orn. 1. p. 4. t. 4. Milvus.

Suecic Glada.

Habitat ubique, vulgaris.

DESCR. Corpus supra & infra ferrugineum, pennis a tergo & supra alas in medio nigra macula, versus basi albis. in capite pennæ albae acuminatae rachi nigra apicibusque albidis, pectus & femora longis pennis ferrugineis rachi nigra vestita sunt. Remiges primores 10 quarum 1 - 5. supra nigrae, at 6 - 10. nigro-ferruginea, subtus omnes 1 - 10 pone albent; remiges secundariae 11 - 20 supra nigricantes apicibus ferrugineis, subtus cinereæ, fasciis nigricantibus. Cauda longa, forcipata, ruta, remige 1. supra margine exteriore nigricante. Pedes flavi. unguis nigri. Rostrum nigrum, cera flava.

60. *FALCO* pedibus flavis; corpore cinereo, maculis fuscis; cauda fasciis quatuor.

Will. orn. 46. Falco gentilis i. e. nobilis dictus.

45. t. 5. Falco montanus.

Raj. av. 13. Falco gentilis i. e. nobilis dictus.

Falco montanus.

Suecic Falck.

Habitat in alpibus Dalekarlicis copiose, ubi quotannis capitur a Germanis.

DESCR. Magnitudo Gallinæ aut Corvi. Pedes, Cera, Iris oculorum flava. Corpus totum cinereum maculis fuscis. Cauda cinerea fasciis quatuor transversis fuscis. Capitis pennæ nigra lateribus ferruginea. Collum, dorsum & alæ supra fuscæ apicibus pennarum ferruginea; subtus flavescens maculis raris oblongis fuscis sub gula, collo, pectore, abdomine; adhuc angustioribus in femoribus. Remiges fuscæ a latere nudo, at interiori latere albidae cum punctis cinerascentibus & fasciis fuscis 5 vel 6. Rectrices extra & subtus omnes fulceæ, fasciis latis 5 vel 6 nigricantibus, æqualibus, apice obsoletis: rectrices subtus albido-flavescentes lineolis longitudinalibus rarissimis fuscis.

61. *FALCO* pedibus rostroque cæruleis, maculis albis nigrisque longitudinalibus.

Gesn. av. 76. Lanarius.

Aldr. orn. 1. 7. c. 10. Lanarius gallorum.

Will. orn. 48. Lanarius cuius mas Tertiarius.

Raj. av. 15. n. 13. Lanarius.

Alb. orn. 2. p. 7. t. 7. Lanarius.

Habitat in sylvis.

DESCR.

DESCR. Dorsum & Ale ferrugineæ; Caput & corpus totum subtus cinereo-alba maculis nigris longitudinalibus. Cauda longa maculis oppositis albidis. Tibiæ ultra medium vestitæ. Pedes cœrulei. Rostrum cœrulecens. Hinc distinctissimus a Lanario Italico.

62. FALCO rostro nigro; pedibus luteis; corpore supra fusco, subtus albido-cinereo maculis transversis.

Rudb. piæt. Falco albo-cinereus viridis, pedibus luteis.

Will. orn. 44. Gyrfalco.

Raj. av. 12. n. 3. Gyrfalco.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. Dorsum nigro-cinereum, Venter albo-cinereus maculis transversis. Pedes lutei. magnitudo Galli.

63. FALCO cera luteo-viridi; pedibus luteis; corpore ferrugineo, vertice fulvo.

Will. orn. 42. t. 7. Milvus æruginosus.

Raj. av. 17. n. 4. Milvus æruginosus.

Alb. orn. 1. p. 3. t. 3. Milvus æruginosus.

Suecic Höns-tjuf.

Habitat in sylvis.

DESCR. Corpus testaceum maculis capitis, colli, pectoris nigris longitudinalibus. Alarum remiges nigræ, teætrices ferrugineæ. Cauda testacea. Femora testacea maculis nigris irregularibus. Tibiæ plumis testæ maculis longitudinalibus variegatae; digitii cornei. Rostrum nigro-cœruleum. *Rudb.*

64. FALCO pedibus cera palpebrisque flavis, capite fuscō, nucha alba, abdomine albicante maculis oblongis.

Alb. orn. 1. p. 6. t. 6. Subbuteo.

Rudb. piæt. Dendro-Falco.

Habitat in Scania. *J. Leche.*

DESCR. Fæmina. Rostrum cœruleum; cera flava. palpebræ luteæ; iris rubra. Caput nigro-fuscum, nucha albicante; gula & latera capitis albida. Abdomen albicans cum macula oblonga in singula penna. Femora ferruginea. Cauda subtus albicante ferruginea. Ale cauda longiores.

Remiges nigro cinereoque cœrulecentes, exceptis primoribus nigris apicis margine albicante. Remiges 1-20 maculis 5 ad 10 albidis a latere interiore, excepto 21.

Cauda acuminata remigibus subratis maculatis, exceptis intermediis duabus longioribus & immaculatis; in singula remige maculæ 9. pallide ferrugineæ, præfertim in latere interiore conspicuæ.

Pedes nudi, lutei. pennæ omnes totius corporis versus basin cinereo-cœrulecentes.

65. FALCO cera pedibusque luteis, dorso fuscō, pectore pallido maculis longitudinalibus fuscis.

Gesn. av. 46. Buteo.

Will. orn. 38. t. 6. Buteo vulgaris.

Raj. av. 16. n. 2. Buteo vulgaris s. Triorchis.

Uplandis Quidfogel.

Habitat passim frequens, *Upsalie* ad Gottsunda. Pul-
li medio Julii mensis sepibus nostris insident, con-
tinuo ejulatu, unde Uplandis Quidfogel dicitur.

DESCR. Magnitudo Gallinæ. Rostrum unguesque nigra, cera pedesque fla-
vi. Tota avis capite, collo supra fusca: pennarum marginibus terrugi-
neis; subtus tota avis ex albido flavescens, maculis longitudinalibus fuscis,
quarum posteriores fere cordatae. Iris exalbida, membrana nititans ca-
rulescens. Reniges nigricantes, latere interiori inferne albæ, harum 1, 2,
3, 4 absque, reliqua cum fasciis 5. vel 6. magis obscuris latere interio-
re externe & interne pinguntur. Reptrices nigro-cinerea, æquales, fasci-
is plurimis obscurioribus præsertim supra conspicuis, apice obsolete ferru-
ginea; basin versus subtus albæ sunt reptrices.

Ova alba maculis majusculis tuberculatis paucis.

66. FALCO pedibus seminudis flavis; cera nigra; capite
cinereo; caudæ fascia cinerea, apice albo.

Will. orn. 38. t. 3. Buteo apivorus s. vespivorus.

Raj. av. 16. n. 2. Buteo apivorus s. vespivorus.

Alb. orn. 2. p. 8. t. 8. Accipiter palumbarius.

Suecis Slaghök.

Habitat in sylvis. Ova cinerea maculis obscuris.

DESCR. Rostrum nigrum: cera nigra rugosa, iris oculorum crocea. Capitum
cinereum. Dorsum ferrugineo-fuscum. Caudæ reptrices apice albæ, tum
linea transversa nigra, dein fascia lata cinerea. Pectus & abdomen alba
maculis nigricantibus. Pedes flavi.

67. FALCO pedibus ceraque flavis; dorso rufescente;
pectore maculis longitudinalibus fuscis; cauda
rotundata.

Gesn. av. 54. Tinnun-

Aldr. orn. 1. 5. c. 6. Tinnunculus s. Cenchrus.

ulus accipiter.

Will. orn. 50. t. 5. Tinnunculus s. Cenchrus.

Raj. av. 16. n. 16. Tinnunculus.

Alb. orn. 1. p. 7. t. 7. Tin-
nunculus.

Suecis Kyrkio - Falck.

Habi-

Habitat in turribus & muris præaltis. Ova 4 albi-dia maculis rubentibus crebris.

MARIS caput canum fibris tenuissimis nigris striatum, constantibus ex rachi singulæ pennæ nigra. *Rostrum* breve, curvum, cæruleo-atrium; cuius maxilla superior urrenque denticulo, uti inferior sinu, norata. *cera flava*, uti & regio nuda circum oculos flava. *Gula albida*.

Dorsum & tectrices alarum rufæ s. ferruginea, singula pluma versus apicem maculâ nigra acuta notata.

Pectus, venter & femora dilutius rufa s. ferruginea, maculis longitudinalibus nigris linearibus in pectore, ovatis in abdomine, miliaribus rarioribus in femore.

Sub cauda regio pallida immaculata. regio a dorso ad caudam cana.

Tibiae maxima ex parte nude luteæ.

Remiges 22. quarum secunda longissima, reliquæ dein gradu breviores; omnes fuscæ supra, subtus canæ, antice immaculatæ, (exceptis secundariis parum ferrugineis) pone sinubus seu maculis albidis septem vel octo.

Rectrices longæ, laterales breviores, omnes canæ, versus apicem fascia late nigra notatae; omnes antice immaculatae, at pone s. introrsum lineis octo nigris latiusculis notatae, exceptis pennis 2 intermediis, quæ his maculis destituantur & totæ canæ sunt, excepta fascia ad apicem, ut in reliquis nigra.

Tectrices alarum subtus albæ maculis parvis nigris.

FÆMINA. Magnitudo Columbæ. omnia ut in mare, sed caudæ color præcipue diversus est.

Rectrices 12. ferrugineaæ, apicæ macula magna nigra terminatae, & singula 9 vel 10 lineis transversis nigris notatae, harum 6. 6. seu intermedie summo apice non albent, uti reliqua 1. 2. 3. 4. 5.

68. FALCO cera viridi; pedibus flavis; pectore albo undulis transversis fuscis; cauda fusca fasciis nigricantibus.

Albin. orn. 3. p. 4. t. 4. Accipiter fringillari-

us.

Gesn. av. 51. Falco frin-

gillarius.

Aldr. orn. l. 5. c. 2. Ac-

cipiter Fringillarius.

Bell. ic. 19. 6. Accipi-

ter Fringillarius.

Will. orn. 51. t. 5. Ac-

cipiter Fringillarius

s. recentiorum Nifus

& Sparverius.

Raj. av. 18. n. 2. Frin-

gillarius accipiter, re-

Alb. orn. 1. p. 5. t. 5. Acci-

piter fringillarius.

Gesn. av. 52. Accipiter mi-

nior mas, quem vulgo Ni-

fum s. Sparverium appel-

lant.

Aldr. orn. 345. Moschetus,

centiorum Nifus &

Sparverius.

Suecic Sparfhök.

Habitat in antiquis turribus & alibi passim.

DESCR. *Cauda fusa fasciis nigris quinque. Pectus, abdomen, collum sub-tus alba undulis transversis fuscois. Dorsum & corpus supra fuscum. Pedes flavi. cera viridis.*

II. PICÆ.

Corvus.

69. CORVUS ater, dorso cærulecente.

Gesn. av. 334. Corvus.

Fonst. orn. 38. t. 16. Corvus.

Aldr. orn. l. 12. c. 1. Corvus.

Will. orn. 82. t. 18. Corvus.

Raj. av. 39. n. 1. Corvus.

Alb. orn. 2. p. 19. t. 20. Corvus.

Suecic Korp.

Habitat in densis sylvis; super arborum, præfertim abietum ramis nidificat; mira sagacitate cadavera subolfacit, licet remotissima: Saneta avis a nostris habetur, nec facile ab ullo occiditur. In Smolandia & australibus provinciis cœlo sereno alte volitat & singularem clangorem seu tonum (clong) remotissime sonantem exicitat.

DESCR. Magnitudo Galli. *Corpus totum atrum, dorso parum cæruleo-scens, remiges 20; quarum due primæ paulo breviores: rectrices æquales.*

70. CORVUS ater.

Aldr. orn. l. 12. c. 3. Cornix frugilega.

Will. orn. 84. t. 18. Cornix frugivora & frugilega.

Raj. av. 39. n. 3. Cornix frugilega.

Alb. orn. 2. p. 21. t. 22. Cornix frugilega.

Oelandis Roka.

Habitat in Oelandia, Scania & australibus maritimis provinciis, nidificat in arboribus, satæ segeti noxia avis.

71. CORVUS capite gula alis caudaque nigris, trunco cinerascente.

Aldr.

Aldr. orn. l. 2. c. 4. *Cornix cinerea frugilega.*

Will. orn. 84. t. 77. *Cornix cinerea frugilega.*

Raj. av. 39. n. 4. *Cornix cinerea frugilega.*

Alb. orn. 2. p. 22. t. 23. *Cornix cinerea.*

Suecis Kråka.

Habitat in nemoribus; communiter in alnis, parit quatuor ova. edit infēcta & varia cadavera, volat gregatim, erucas depascitur, hinc purgant pascua & prata a vermibus, qui fœnum consumunt; futuræ tempestatis & venti nuncia in maritimis; edit etiam Conchas & Ranarum capita.

DESCR. Caput, gula, alæ, cauda, pedes, rostrum nigra sunt. Reliqua omnia cinerea. a gula ad medium collum subtus nigra. ova 4 parit.

72. CORVUS fronte nigra; occipite incano; corpore fusco; alis caudaque nigris.

Will. orn. 85. t. 19. *Monedula s. Lupus.*

Raj. av. 40. n. 5. *Monedula s. Lupus.*

Alb. orn. 1. p. 14. t. 14. *Monedula.*

Suecis Kaja.

DESCR. Nigra rostrum, frons, gula, alæ, cauda, pedes. cinerea caput pone, collum.

nivea Iris oculorum.

nigricans dorsum.

obscure cinereum pectus, abdomen.

73. CORVUS dorso sanguineo; remigibus nigris; rectricibus viridibus.

Gesn. av. 335. *Cornix cærulea.*

Aldr. orn. l. 12. c. 18. *Garrulus argentoratensis.*

l. 12. r. 5. *Cornix cærulea.*

Will. orn. 85. t. 20. *Cornix cærulea.*

Worm. mus. 296. *Cornix cærulea.*

Raj. av. 41. n. 3. *Garrulus argentoratensis.*

Suecis Spansk Kråka. *Smolandis Blåkråka.* *Scania* Allekråka.

Habitat in Smolandia, Scania &c.

DESCR. Avis inter nostrates omnium splendidissima & pulcherrima: dorsum rubro-sanguineum est; remiges nigræ; rectrices virides; alarum te

74. CORVUS variegatus, te

Gesn.

Gesn. orn. 700. *Pica glandaria* I. *Garrulus avis.*

Aldr. orn. l. 12. c. 14. *Pica glandaria.*

Will. orn. 88. t. 19. *Pica glandaria.*

Raj. av. 41. n. 22. *Pica glandaria.*

Albin. orn. 1. p. 16. t. 16. *Pica glandaria.*

Suecis Nötskrika.

Habitat in Quercubus communiter.

DESCR. Caput griseo-ferrugineum. Scapularum regio, pectus & abdomen ferruginea. Frons ferrugineo-albicans maculis longitudinalibus nigris. macula sub oculis, pone rostrum, nigra. Gula in quibusdam albida. remiges nigræ, at 1-7 in margine exteriore maxima ex parte albida; 8-10, a basi, supra medium, exteriori latere niveæ; reliquæ omnes remiges nigræ, quarum 5 reliquis longiores. Testrices alæ exteriore latere cæruleæ lineis transversis nigris. Cauda nigra testricibus albis. Rostrum nigruum; vibrissæ utrinque ex 5. f. 6. setis nigris. Lingua membranacea, bifida.

75. CORVUS cinereus, cauda alisque nigris.

Gesn. av. 245. *Caryocatactes.*

Will. orn. 90. t. 20. *Caryocatactes gesneri & turneri.*

Raj. av. 42. n. 5. *Caryocatactes.*

Suecis Nöttecka, Nötkraka.

Habitat in Smolandia, rarior alibi.

76. CORVUS cauda cuneiformi.

Gesn. av. 695. *Pica.*

Lonic. hist. 343. a. *Pica.*

Jonst. orn. 44. t. 17. *Pica.*

Will. orn. 87. t. 19. *Pica varia f. caudata.*

Raj. av. 41. n. 1. *Pica varia f. caudata.*

Albin. orn. 1. p. 15. t. 15. *Pica varia caudata.*

Suecis Skata.

Habitat in arboribus juxta domos vulgatissima per totum Sueciæ regnum, excepta sola Lapponia.

Nidos artificiose struit ovis sæpius 7. Coracias hæc a Corvis genere distingui non debet.

Caput, collum, dorsum, uropygium, anus, femora, rostrum, pedes atra. pectus, latera, testrices baseos alarum alba. Remiges 1-10 exteriore latere nigræ, interiori albæ. Reliquæ nigræ extrorsum sericeo-cærulecentes. Cauda cuneiformis, longitudine corporis, complicate pennæ super visibles sericeo-virescentes.

Cu-

Cuculus.

77. CUCULUS restringibus nigricantibus punctis albis.

Gesn. av. 363. Cuculus.

Aldr. orn. t. 5. c. 107. Cuculus.

Bell. ic. 22. 6. Cuculus.

Will. orn. 62. t. 77. Cuculus.

Raj. av. 23. Cuculus.

Alb. orn. 1. p. 8. t. 8. Cuculus.

Suecic Gjök. Lappis Geecka.

Habitat frequens per Sueciam, educatur communiter a Moticilla alba.

DESCR. Variant Cuculi colore, sed utrum hoc sexu, aetate vel specie, adhuc haereo. sic descripti

1732. V: 16. *Caput* obscure canum, ut & *collum*, & totum *dorsum*, pennis hic inde griseis interlucentibus. *collum* subtus coloris cinerei undulati luteo mixti. *urhopygium* ejusdem coloris cum dorso, sed dilutioris. *venter* albescens; linea transversis fusco nigrescentibus; similiter pennæ sub cauda albantes, sed adhuc magis albidae. *Cauda* respectu corporis sat longa, restringibus 10: nigrescentibus apicibus albis, ab altero latere, & in medio, albo maculatae sunt. *Alæ* longæ, superne fusco-nigrescentes, subtus obscure canæ lineolis albis transversis; reiniges nigricantes. *rostrum* parum incurvatum, maxilla superior longior nigra, inferior pallidior subvirescens. *Nares* patulæ prominentes nude. *Tibiae* anterius quoad partem testæ, una cum pedibus flavæ. *Lingua* sagittata plana: *digiti* duo antici; totidemque postici. *FÆMINA* erat, in qua duo ova magnitudine feminis pisii majoris. *venter* erucis pilosus plenus.

1733. VI: 2. & IX. 16. *MAS* similis praecedenti in omnibus, at differebat rostro ad angulum oris membrana lutea laxa molli, ut in pullis passerini generis. (An itaque hoc anno pullus?) *Caput* cinereum s. canum absque ulla griseis maculis, uti & *dorsum*, quod tamen certo situ positum versus lucem splendebat. *Collum* totum, etiam subtus, absque maculis canum; *venter* obscurior quam in praecedente; sub *cauda* flavescens: *pedes* flavi.

1734. VII: 7. *Caput*, *dorsum*, & totum corpus supra canum, penna singula cinereo-nigra apice lineola alba terminata, disco unica alterave fascia testacea picta. *Remiges* cinereo-nigræ, maculis teprem pluribusve albis: *gula* nigricans: *collum* & *pectus* subtus albicantia linea transversis cinereo-albis. *Venter* albus. *Restringes* nigrae maculis albis & testaceis obscurioribus variegatae. *testaceis* caudæ superiores dorso concolores, inferiores alba maculis nigris. *Tibiae* seminudæ, uti etiam *pedes* & *ungues* flavi. *rostrum* nigrum intus flavum. *Lingua* integra, non bifurca; sub cantu occidetur.

FÆMINA habet lineas fuscas ad latera colli, quibus *MAS* destituitur.

78. CUCULUS subgrisea maculata, restringibus nigris fasciis undulatis.

Bell. ic. 76. a. Jynx, Terquilla, Turbo, Sisopigis.

Gesn. av. 573. Jynx.

Alst.

Aldr. orn. l. 12. c. 42. Jynx s. Torquilla.

Jonft. orn. t. 42.

Will. orn. 95. t. 22. Jynx s. Torquilla.

Raj. av. 44. n. 8. Jynx s. Torquilla.

Rudb. lapp. 66. t. 66. Jynx.

Alb. orn. I. p. 21. t. 21. Torquilla.

Suecis Gjöktyta.

Habitat apud nos vere.

DESCR. optimam & figuram laudabilem dedit O. Rudbeck Lapp. I. c.
Remiges fulcae, latere exteriore fasciis ferrugineis æqualibus 6 ad 7. Re-
ctrices 10. æquales, punctis nigricantibus adpersæ fasciis 4 vel 5 nigris
undulatis.

Picus.

79. PICUS niger; vertice coccineo.

Gesn. av. 708. Picus maximus vel niger.

Aldr. orn. l. 12. c. 31. Picus maximus.

Will. orn. 92. t. 21. Picus niger maximus.

Raj. av. 42. n. 1. Picus niger maximus.

Alb. orn. 2 p. 26. t. 27. Picus maximus niger.

Suecis Spillkråka, Tillkråka.

Habitat in arboribus antiquis aridis.

DESCR. Corpus totum atrum: a basi rostri ad occiput macula oblonga
purpurea. Rostrum & pedes cinereo-cærulefcentes.

80. PICUS viridis, vertice coccineo.

Gesn. av. 710. Picus viridis.

Aldr. orn. l. 12. c. 34. Picus viridis nostras.

Will. orn. 93. t. 21. Picus viridis.

Raj. av. 42. n. 2. Picus viridis major.

Alb. orn. I. p. 18. t. 18. Picus viridis.

Suecis Wedknarr, Grönsplik, Gröngjöling.

Habitat in exaridis arboribus.

DESCR. variat vertice purpureo maculis nigris; vertice purpureo maculis
albis, & vertice purpureo immaculato.

Rostrum acuto-compressum, maxilla superiori carinata trigona. Nares ob-
longæ setis testæ. Lingua cylindracea, apice acuto, tendinosa, intra cy-
lindraceam tunicam retrotracta. Caput & collum albicant punctis nigri-
cantibus, quæ puncta in maxillis magis nigra per lineas disposita. Vertex
purpureus est maculis constans plurimis cinereis apicibus purpureis aut
sanguineis; sub sinuoris utrinque linea purpurea. dorsum cum alarum te-
stricibus viride a medio dorso usque ad caudam extimam. Testricies luteo-
virides. Venter albus, maculis nigris transversis undularis virore perfusus.

Remi-

Remiges supra nigrae maculis candidis, subrufis nigricantes maculis albicanibus per series digestis. Cauda nigricat cum mixtura sordide viridi versus basin. Haec descriptio FÆMINÆ erat.

MAS differt a Fæmina, quod tempora & oculorum regio nigra sint, gula alba, pectus & venter subviridia undulata - variegata

81. PICUS albo nigroque variegatus, vertice nigro, rectricibus tribus lateralibus utrinque albescentibus.

Gesn. av. 708. *Picus varius major.*

Aldr. orn. l. 12. c. 32. *Picus major.*

Will. orn. 94. t. 21. *Picus varius major.*

Raj. av. 43. n. 4. *Picus varius major.*

Alb. orn. 1. p. 19. t. 19. *Picus varius major.*

Suecis Gyllenrenna.

Habitat ruri in arboribus.

DESCR. *Rostrum maxilla superiore carinata acuta, lateribus angularis; apex rostri compressus. Lingua longissima, apice tenui osse. Caput nigrum, fronte pallida; tempora alba; a rostro ad nucham extenditur nigredo. Mas in occipite maculis coccineis notatur. Collum a tergo in medio album. Remiges nigrae utrinque maculis 3-6 albis. Rectrices atræ 10. quarum 1, 2, 3 utrinque albescentes; sub cauda coccinea est.*

82. PICUS albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus apice albo-variegatis.

Will. orn. 94. t. 21. *Picus varius minor.*

Raj. av. 43. n. 5. *Picus varius minor.*

Gesn. av. 708. *Picus varius minor.*

Aldr. orn. l. 12. c. 33. *Picus varius minor,*

Habitat cum præcedenti passim.

DESCR. Præcedenti similis sed minor. *Capit macula magna coccinea tegitur, quæ antice extenditur inter oculos. Occiput nigra trianguli macula, quæ non extenditur ad rostrum. gula & collum subrufi uti & pectus alba, tempora albo-cinerea. Cauda nigra bifida; rectrices 10. quarum 5. nigrae, 1, 2, 3 obtusiores, apice albo nigroque variae, iubatus fuscæ. sub cauda ruber est. alæ nigrae, remigibus maculis utrinque 3-6 albis pictis.*

83. PICUS albo nigroque varius; rectricibus tribus lateralibus seminigris.

Raj. av. 43. *Picus varius tertius.*

Alb. orn. 1. p. 20. t. 20. *Picus varius minor.*

Habitat cum præcedenti in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo passeris. *Caput inter oculos versus nucham nigrum conjunctum lineola a tergo colli cum nigro capite. vertex inter oculos albus aut coccineus. Frons grisea; gula, pectus, abdomen grisea. macula alba supra oculos. tempora grisea. alæ nigrae sex ordinibus macularum alblicantium. Rectrices 4. 5. nigrae; 1, 2, 3 seminigrae quibusdam maculis nigris.*

84. PICUS pedibus tridactylis.

*Acad. stockb. 1740. p. 222. Picus pedibus tridactylis.
Habitat in alpibus Dalekarlicis.*

DESCR. Descriptionem inferui aëlis Academiae stockholmensis, quam hic contractam exhibeo. Magnitudo proxime præcedentis & ejusdem etiam facie. *Corpus nigrum, maculatum a sinu oris linea alba utrinque versus nucham extensa, ubi conjugebatur, dein descendebat dilatata per collum dorsumque ad caudam usque. Pectus & abdomen subtus nigro alboque varium. remiges supra nigre 3 vel 5. ordinibus macularum albarum minimarum, subtus vero cinereæ 7. vel 8. ordinibus macularum albarum majorum. testicæ alarum superiores nigrae. Cauda brevis, rigida, rectricibus atris, extima utrinque albo maculata. vertex croceus. Rostrum angulatum apice compresso cuneo. Pedes tridactyli, constantes digitis duobus anticis æqualibus, nisi quod interior paulo minor; posticus unicus est, nec duo, ut in reliquis, hicque longior & crassior.*

Upupa.

85. UPUPA.

Bell. ic. 72. a. Upupa.

Gesn. av. 776. Upupa.

Aldr. orn. 17. c. 11. Upupa.

Charl. onom. 92. t. 93. Upupa.

Will. orn. 100. t. 24. Upupa.

Raj. av. 48. n. 6. Upupa.

Jenst. orn. t. 42. 27. Epopos, Upupa.

Alb. orn. 2. p. 39. t. 42. 43. Upupa.

Suecis Hårfogel. Scanis Popp.

Habitat in vastissimis sylvis, sono proprium nomen recitans, unde facile dignoscitur; rusticis nostratis Bellonæ omen. Ova ponit in cavis arboribus duo cinerea.

DESCR. Rostrum nigricans, erectiusculum, compressum, angulatum, acutum. Crista duplex e pennis rostro longioribus, testacea, apicibus nigris. Collum & pectus flavescens. remiges 1 - 10 nigrae, versus basin albæ. Dorsum nigro flavoque mixtum. urrropygium album. Cauda nigra linea transversa alba. Abdomen albidum. Pedes subpurpurascentes.

Ispida.

86. ISPIDA.

Bell. observ. 16. Merops.

Gesn. av. 599. Merops.

Aldr. orn. l. 12. c. 45. Merops.

Charl. onom. 87. t. 87. Merops.

Will.

Will. orn. 102. t. 24. Merops f. Apiaster

Raj. av. 49. n. 3. Merops f. Apiaster.

Alb. orn. 2. p. 40. t. 44. Merops f. Apiaoster.

Habitat ad littora maris rarius.

DESCR. Dorsum virescit. Venter ex albo & cæruleo tintus. Mentum ad aures usque macula flava. Iris oculorum rubra. Cauda integra. Mas macula longa oculum tegente a femina distinguitur.

IV. ANSERES.

Anas.

87. ANAS rostro plano, apice dilatato rotundatoque.

Gesn. av. 666. Pelecanus f. Platea.

Aldr. orn. l. 20. c. 13. Leucoradios f. Platea, Pelecanus ornithologi.

Worm. mus. 1. f. 2. n. 10. t. 11. f. 10. Platea ciceroni.

Anon. orn. 134. f. 89. Spoonbill.

Olear. mus. 23. t. 13. f. 4. Platina f. Cochlearia.

Jonst. orn. t. 46. Platea f. Pelecanus.

Merr. pin. 181. Platea f. Pelecanus.

Mars. danub. 5. p. 28. t. 12. Platea f. Pelecanus.

Will. orn. 212. t. 52. Platea f. Pelecanus, Leucoradius f. Albardeola.

Raj. av. 102. n. 1. Platea f. Pelecanus.

Suecis Pelekan,

Habitat in Westrobotnia & Lapponia æstate rarius.

DESCR. Tota alba est; collum longissimum, rostrum longum supra & infra oinnino planum uti lamella, versus apicem dilatum in figuram subrotundam.

88. ANAS rostro semicylindrico; cera flava; corpore albo.

Bell. ic. 30. a. Cygnus, Cycnus.

Gesn. av. 372. Cygnus.

Aldr. orn. l. 19. c. 1. Cycnus.

Will. orn. 212. Cygnus ferus.

Raj. av. 136. n. 2. Cygnus ferus.

Alb. orn. 3. p. 31. t. 91. Cygnus.

8 Will.

- B** Will. orn. 271. t. 69. *Cygnus mansuetus.*
Raj. av. 136. n. 1. Cygnus mansuetus.
Suecic Swan.
Habitat in Scania, uti prope Malmogiam copiose,
passim in Lapponiae fluviis æstate.
- 89. ANAS** rostro semicylindrico, basi gibbo.
Raj. av. 138. Anser cygneus guineensis.
Will. orn. 275. Anser hispanicus an potius guineensis.
Suecic Turckisk Gås, Siberisk Gås.
Habitat tantum culta apud nos, ab exteris regionibus allata.
*DESCR. Color variat. Ansere domestico major, gutture crassiore & rau-
ciore.*
- 90. ANAS** rostro semicylindrico; corpore supra cinereo,
 subtus albido; rectricibus margine albis.
Gesn. av. 158. Anser ferus.
Aldr. orn. l. 19. c. 18. Anser ferus.
Will. orn. 274. t. 69. Anser ferus.
Raj. av. 136. n. 4. Anser.
Suecic Willgås.
- B** *Gesn. av. 141. Anser domesticus.*
Will. orn. 273. t. 75. Anser domesticus.
Raj. av. 136. n. 3. Anser domesticus.
Suecic Gås.
*Habitat in Lapponia præsertim, avis migratoria vere
accedens, hyeme discedens.*
*DESCR. Tota cinerea, dorso magis fusco margine pennarum exteriore
pallidiore; collum, pectus, latera cinerea margine albidiore. Pone fe-
mora & sub cauda albida. caput griseo-cinereum immaculatum. Omnes
rectrices cinereæ apice & margine albo, sed extimæ rectrices omnino albe-*
- 91. ANAS** capite colloque nigris.
Gesn. av. 110. Branta f. Bernicla.
Aldr. orn. l. 19. c. 33. Branta f. Bernicla.
Jonft. orn. t. 49. Bernicla, Brenta.
Will. orn. 274. Bernicla f. Bernacla.
275. f. 10. Branta.
Raj. av. 137. Bernicla f. Bernacla.

Val.

Val. mus. 495. Anser scoticus verus Bernicla.

Alb. orn. 89. t. 93. Brenta.

Belgis Ratgans.

Habitat in Scania.

92. ANAS cinerea; fronte alba.

Rudb. piēt. Anser cinereus ferus, torque inter oculos & rostrum albo, erythropes.

Habitat in Helsingia.

DESCR. FÆMINA. Rostrum sordide carneum: frons alba: Caput, collum, dorsum, caudā cinerea: pectus & abdomen candida: maculae in sterno nigrescentes: Pedes sanguinei.

93. ANAS albo-variegata, pectoris lateribus ferrugineis, abdomine longitudinaliter cinereo maculato.

Will. orn. 278. t. 70. 71. Tadorna.

Alb. orn. 90. t. 94. Vulpanser.

Raj. av. 140. n. 1. Tadorna bellonii, Vulpanser quibusdam.

Gotlandis Jugås.

Habitantem reperimus in sola Gotlandia.

Plumæ mollissimæ, ut in sequenti.

DESCR. Ansere domestico paulo minor. *Fæmina* alba: Pectus superne ferrugineum; Venter longitudinaliter cinereo-maculatus. Caput & colli superior pars subñeatea. Remiges versus apices ferruginæ: hinc macula alarum transversalis lata ferruginea. Rostrum anseris domestici, sed magis simum.

Marem non vidi; dicebatur ab incolis alteri coloratum & pulchritorem esse cum caruncula s. crista earnosa ad basin rostri.

94. ANAS rostro semicylindrico: tinge obtuso; cera superne bifida rugosa.

Barth. act. 1. p. 90. Anas plumis mollissimis, vulgo Eider.

Worm. mus. 310. Anas plumis mollissimis.

Will. orn. 277. Anas plumis mollissimis.

278. Anas cuberti s. farnensis.

Raj. av. 141. n. 3. Anas cuberti s. farnensis.

Suecias Åda, Eider, Gudunge.

Habitat in mari, nidificat in maritimis præsertim Gotlandiæ; ova 5 vel 6; sub juniperis sæpius nidi-ficans.

Plumæ e nido collectæ omnium mollissimæ, maxime elasticæ & pretiosissimæ.

DESCR. MARIS Corpus maxima ex parte album, excepto pileo capitis nigro: pone bipartito, antice triparitto, angulos versus finus certe maxilla superioris, emitente. *Sternum, abdomen*, tota pars postica atra; femora, urthopygium, rectrices & remiges nigra. Capitis postica pars juxta pileum virescit. *Pectoris* antica pars ex albo incarnata. Magnitudo fere anteris. **FÆMINÆ** Corpus totum Scolopacis s. cinereum maculis testaceis & nigris undulatum. Linea alarum transversa angustissima alba.

95. ANAS cauda cuneiformi forcipata.

Rudb. piæt. Anas cauda longa forcipata.

Suecis Winter-and.

Habitat in Borealibus Sueciæ provinciis, hyeme intensissima ad nos accedit, nescio unde.

DESCR. Corpus fuscum: *macula nigra*, longa, ad insertionem alarum. *Pectus* nigrum. *Cauda* pedibus longior bifurca. *Rostrum* nigrum, medio rubrum: *Collum* & *caput* fere alba. *Mas* maxilla fusca infra sordide luteo distinguitur a *fæmina*, cui maxilla tantum fusca est.

96. ANAS cauda cuneiformi acuta.

Gesn. av. 121. Anas cauda acuta.

Will. orn. 289. t. 73. Anas cauda acuta.

290. Anas cauda acuta islandica, Havelda ipsis dicta.

Raj. av. 145. n. 14. Anas cauda acuta.

Worm. mus. 302. Anas islandica.

Suecis Aler, Ahlfogel.

Habitat in maritimis frequens per Sueciam.

DESCR. MAS. *Caput & collum album*, macula capitis utrinque magna nigricante. *Dorsum nigrum*. *Sterni* regio nigra, quæ nigredo conjungitur cum dorsi nigredine. *Alæ nigrae* absque macula, subtus cinereæ. *Cauda* cuneiformis, supra nigra, subtus alba, rectricibus acutis, lateralibus quibusdam albis; intermedia rectrice duplo longiore reliquis. *Pedes* plumbrei. *Rostrum* convexum, semicylindraceum, obtusum, nigrum medio incarnatum. *Nares* oblongæ. Maxillarum margo squamis patulis dentatus. *Fauex* dentata. *Lingua* apice trilobo obtuso; lateralibus brevioribus, margine ciliato.

FÆMINA. Corpus totum cinereo-nebulosum, ventre toto exalbido. *Cauda* cuneiformis, rectrice intermedia reliquis longiore, non vero duplo longiore.

97. ANAS caudæ rectricibus intermediis recurvis.

Gesn. av. 114. Anas fera torquata minor. (mas)

115. Anas fera torquata major. (fæmina)

Aldr. orn. l. 19. c. 35. Boschas major s. Anas torquata minor. *Jonst.*

Fonst. orn. t. 49. Anas fera Spiegel Endte.

Will. orn. 284. t. 72. Boschas major.

Raj. av. 145. n. 1. Anas torquata minor.

Alb. orn. 2. p. 89. t. 100. Boschas major.

Suecis Grås-and, Blänacke.

Q *Will. orn. 293. t. 75.* Anas domestica vulgaris.

Raj. av. 150. n. 1. Anas domestica vulgaris.

Fonst. orn. 143. t. 49. Anas domesticus.

Gesn. av. 96. Anas cicur.

Aldr. orn. l. 19. c. 25. Anas domesticus mas.

Suecis Ancka.

Habitat in lacubus & fluviis frequentissima, mansuetia etiam ubique habetur.

DESCR. MAS. Caput azureum. dorsum ferrugineo-fuscum : urropygium virescenti-fericeum ; Reſtrices 8 utrinque laterales cinereo-albescentes ; at 4 intermediae nigrae recurvæ. Pedes & abdomen cinereum ex albo striis undulatis minutissimis confertis. Alæ supra subfuscæ, subtus albæ. Remiges primores 1-10 cinerea, secundarie 11-24 tupta subfuscæ, quarum 11-21 apice albæ, at 12-20 in medio violacea exterius nigra, apice picibus vero albis. Reſtrices harum 12-20 cinerea in medio albæ, apice nigrae.

98. ANAS facie nuda papillosa.

Raj. av. 150. n. 3. Anas moschata.

Gesn. av. 122. Anas indica mas.

Aldr. orn. l. 19. c. 26. Anas indica.

Will. orn. 294. Anas libycæ bellonii.

Alb. orn. 3. p. 92. t. 97. 98. Anas moschata.

Habitat in prædiis Magnatum culta, nullibi spontanea per Sueciam.

DESCR. Anate domestica proxime præcedenti duplo major; ex albo & nigro variegata; tota moschum olens. *Mas* pone collum s. in medio collo a tergo, papillis rubris nudis notatur.

99. ANAS crista dependente; corpore nigro; ventre maculaque alarum albis.

Gesn. av. 107. Anas fuligula prima.

Aldr. orn. l. 19. c. 34. Querquedula cristata s. Cοlymbus bellonii.

Will. orn. 280. t. 73. Anas fuligula prima.

Raj. av. 142. n. 7. Anas cristata.

Alb. orn. 1. p. 91. t. 95. Anas fuligula.

Suecis Wigge.

Habitat in mari.

DESCR. Corpus torum nigrum, excepto abdomine & pectore caudam versus albo. macula transversalis alarum itidem alba. *Rostrum & pedes nigro-canescentes.*

100. ANAS nigro alboque variegata; capite nigro viridi; sinu oris alba macula.

*Gesn. av. 119. Clangula.**Aldr. orn. l. 19. c. 42. p. 224. Clangula gesneri.**p. 225. Anas platyrhynchos mas.**Will. orn. 282. t. 73. Anas plathyryncos mas.**Raj. av. 142. n. 8. Anas platyrhynchos mas.**Alb. orn. 1. p. 92. t. 96. Clangula.**It. oel. 49. Anas clangula.**Suecis Knipa. Scanis Dopping.*

Habitat in cavis arborum.

DESCR. MAS. Caput magnum, fere cristatum, violaceo-nigrum, macula subrotunda alba ad sinus oris. *Dorsum nigrum. Alæ nigrae, apice medio parum albæ, macula magna alba subtus cinereo-nigra. Cauda obtusa utrinque nigra. Collum, pectus, abdomen & omnia subtus (excepto capite) alba. Femora nigricantia. Linea alba dorsum ab aliis distinguit. Rostrum nigrum. Pedes rubri, membrana nigra.*

FAMINA. Caput cæsio-rufescens. *dorsum, latera, canda fusca sunt. Alæ albo-cinereæ. abdomen album. pectus antice & ad latera cinereum canis marginibus seu lineolis transversis; Remiges primores nigricantes; secundariæ parum apice albæ, intermediae niveæ immaculatae, ultima alba latera exteriore nigro. tectrices tetrigum posteriorum albo nigroque variae.*

101. ANAS macula alarum rufa nigra alba.

*Gesn. av. 121. Anas strepera.**Aldr. orn. l. 19. c. 32. p. 233. Anas platyrhynchos, rostro nigro & plano.**Raj. av. 145. n. 2. Anas platyrhynchos, rostro nigro & plano.**Will. orn. 287. t. 72. The godwall or gray.*

Habitat in aquis dulcibus.

DESCR. Dorsum fuscum. *Caput cæruleo-nigricans. pectus albus, venter fordescit maculis transversis nigris. latera lineolis albis nigrisque variegata. Reætrices albæ maxima ex parte. Remiges 1-10 fuscæ; 11-13 apicibus albis; 14-17 pinnulae ad scapum exteriorem nigrae apicibus albis. 18-20 exterior tela a scapo. 21-25 rufo-fuscæ.*

102. ANAS rostri extremo dilatato rotundatoque: ungue incurvo. *It. gotl. 167.*

*Gesn. av. 120. Anas latirostra major.**Aldr.*

Aldr. orn. 3. p. 227. Anas latirostra major.

p. 224. Anas latirostra Taschenmaul.

Will. orn. 283. t. 74. Anas platyrhynchos altera s. clypeata germanica.

Raj. av. 143. Anas platyrhynchos altera s. clypeata germanica.

Alb. orn. 1. p. 93. t. 97. 98. Anas clypeata germanica.

Habitat in Scania, Gotlandia.

DESCR. MAS. Caput nigro-ceruleum, nitens. Pectus album. Abdomine brunneo. Alæ albo ceruleoque variegatae macula viridi sericea. Pedes crocei.

FÆMINA. corpore tōto scolopacino colore. macula alarum viridi ænea inter duas lineas albas transversas. Rostrum utriusque sexus ampliatum extorsum rotundatum, apice aduncō obtuso, maxillarum marginibus ciliatis denticulis paleaceis.

103. ANAS macula alarum purpurea utrinque nigra albaque; pectore rufescente.

Aldr. orn. 1. 19. c. 32. p. 232. Anas platyrhynchos, pedibus luteis.

Will. orn. 284. Anas platyrhynchos, pedibus luteis.

Raj. av. 144. n. 13. Anas platyrhynchos, pedibus luteis.

Rudb. pict. Anas fluviatilis rufa mas, rostro superius virescente, inferius flavescente. (Mas).

Rudb. pict. Anas fluviatilis rufa, rostro sub-viridi, pedibus miniaceis.

Habitat in fluviosis.

DESCR. MAS. macula alarum violacea, nitida, utrinque nigra, extra nigredinem utrinque alba.

FÆMINA. macula alarum ut in mare, sed in medio magis cerulea. pectus in utroque rufescit; basis & apex alarum cinerea. Cauda alba. Dorsum fuscum totum margine ferrugineo. subtus tota ferruginea maculis obsoletæ fusca. Gula pallide ferruginea immaculata. Alæ cinereo-fuscae pennæ primores 10 immaculatae, longiores; secundariæ 11-20 fuscae apice albae, latere exteriore violaceo nitido. harum (11-20) tectrices fuscae versus apicem albæ, ipso apice nigrae. Rectrices fuscae lineolis serpentinis inæquali flexu pallidis. Pedes rubefcentes.

104. ANAS oculorum iridibus flavis; capite griseo; collari albo.

Bell. ic. 33. 6. Glaucion, Glaucus.

Aldr. orn. 1. 13. c. 38. Glaucion bellonii.

Will. orn. 281. Glaucium bellonii.

Suecis Brunnacke.

Habitat in maritimis, frequens.

DESCR. MAS. *Caput* *sordide nigrum*. *Oculorum* *iridibus* *flavis*. *macula* *alarum* *alba*.

FÆMINA. *Caput* *sordide fuscum*, *in alis loco maculae* *pennæ* *&* *distinctæ* *albæ*. *Rostrum* *nigricat*; *iris oculorum* *glauxa*. *collare* *album*; *pectus* *ad* *sternum* *usque* *nebulosum*. *Cauda & Alæ* *nigrae*. *dorsum* *fusco-nigrum*. *Pedes* *& tibiæ* *sordida*. *palmae* *atrae*.

105. ANAS capite brunneo, fronte alba, cauda subtus nigra.

Gesn. av. 108. Penelope.

Aldr. orn. l. 19. c. 39. Penelope.

Will. orn. 288. t. 72. Penelope.

Fonft. orn. t. 49. Penelope.

Raj. av. 143. n. 3. Penelope.

Alb. orn. 2. p. 88. t. 99. Anas fistularis.

Suecis Wriand.

DESCR. MAS. *Caput & collum* *brunneum*. *frons* *alba*. *Macula* *alarum* *alba* *magna* *ad* *basin* *alæ*, *dein* *nigra*, *tum* *azurea*, *denuo* *nigra*. *Rostrum & pedes* *nigri*. *Dorsum* *cinereo* *nigroque* *undulatum*, *collum* *interne* *griseum*. *Cauda* *acutiuscula*, *brevis*, *subtus* *nigra*. *denticuli* *squamosi* *transversi*; *Lingua* *utrinque* *ciliata*.

FÆMINA *cinereo-nebulosa* *excepto* *pectore* *ventreque* *albo*. *rostrum & pedes* *cinerei*. *Macula* *alarum* *nulla*.

106. ANAS corpore obscuro: macula pone oculos lineaque alarum alba.

Fonft. orn. t. 49. Anas fera fusca.

Rudb. piæt. Anas fera nigra.

Will. orn. 278. t. 70. Anas niger.

Raj. av. 141. n. 4. Anas niger.

Suecis Swärta.

Habitat in mari.

DESCR. MAS. *magnitudo* *circiter* *minoris* *anseris*. *Rostrum* *anserinum* *incarnatum*, *ad* *basin* *vero* *nigrum* & *gibbum* *est*. *macula* *alba* *sub* *oculis*. *Corpus* *totum* *nigrum*. *Remiges* *primores* *nigrae*, *secundariae* *vel* *tertices* *albae*. *Cauda* *brevis*. *Pedes* *rubri* *membrana* *nigra*.

FÆMINA. *Rostrum* *fuscum* *absque* *gibbo*, *marginibus* *maxillarum* *lammato-dentatis*: *Lingua* *ad* *latera* *ciliata*. *Corpus* *fuscum* *pennarum* *apicibus* *pallidioribus*. *Remiges* *1-10* *primores* *atri*; *11* *nigra*; *12-20* *albe* *apicibus* *fere* *nigricantibus*, *21* *undecimæ* *simillima*. *Pedes* *rubri* *membrana* *nigra* *palmata*. *cauda* *brevis*; *pone* *oculos* *macula* *alba* *rotunda*; *tempora* *exalbida*.

107. ANAS alis cinereis immaculatis; urrhopygio nigro.

Gefn. av. 116. Anas fera fusca vel media.

Aldr. orn. l. 19. c. 40. Anas fera fusca.

Will. orn. 288. t. 72. Anas fera fusca.

Raj. av. 143. n. 10. Anas fera fusca.

Alb. orn. 2. p. 87. t. 80. Anas fera fusca.

Habitat in aquis dulcibus.

DESCR. Mandibula superior plumbea ungue nigro, inferior nigra. *irides* oculorum rutilae. *Pedes* plumbei. *caput & collum* fulva. *media pectoris* pars alba fimbriis flavescentibus, inferior lineolis fuscis. *Remiges* 14 nigro-cinereæ. *Rectrices* unicolores cinereo-fuscæ. Nigra sunt urrhopygium, podex & ima pars colli. *Dorsum* lineolis fuscis cinereisque undulatum. *Willugb.*

108. ANAS macula alarum viridi; linea alba supra oculos.

Gefn. orn. 107. Kernell.

Aldr. orn. l. 19. c. 33. Kernell argentoratensis gessneri.

Will. orn. 291. Querquedula prima.

t. 74. Querquedula altera.

Raj. av. 148. n. 9. Querquedula prima.

Habitat in lacubus.

DESCR. Magnitudo fere sequentis. *Rostrum* nigrum. *Pedes* lividi. *vertex* nigricat; a cantho interiori oculi linea alba supra oculos aaresque ad medium cervicis. *gula* nigra. *Pectus* nigro-cinereoque undulatum. *Dorsum* purpureo-fuscum. *Femora* nigro-alboque undulata. *Remiges* 1-10 latere anteriore fuscæ, interiore murini coloris. 11-21 apicibus albis, cæterum anterius viridi nitentes. *Rectrices* 14 fuscæ, verum extimo maculis alborufis. *FÆMINA* magis decolor, gula nigra caret. *Willugb.*

109. ANAS macula alarum viridi: linea alba supra infraque oculos.

Gefn. av. 105. Querquedula.

Aldr. orn. l. 19. c. 31. Phalcas s. Querquedula minor.

Will. orn. 290. Querquedula secunda.

t. 74. Querquedula.

Raj. av. 147. n. 6. Querquedula secunda.

Alb. orn. 1. p. 95. t. 100. Querquedula francia.

2. p. 91. t. 102. Querquedula francia fæmina.

Suecis Årta.

Habitat in lacubus & fluviis, sapore præstantissima.

DESCR. Corpus inter anates minimum. *caput* ferrugineum: linea a rostro ad oculos extenditur, ubi bifurcatur & ramo altero oculum super-ascendit, altero vero infra oculum descendit, intra quam bifurcationem ma-

cula cærulea nitens descendit ab oculis versus collum & a tergo cærulescens coadunatur. *Corpus* totum supra lineis nigris albisque undulatum. *Remiges* 1 - 10 fusca, 11 - 18 apicibus albis, latere anteriore nigro. 16 - 19 viridi-nitentes anteriore latere; 20 anteriore latete nigra. sub urrhopygio macula nigra lateribus alba in mare. macula alarum viridi-sericea supra & infra nigra, ante & pone alba. *Rostrum* sumum, nigrum, pedes nigri unguibus acutis. *Tectrices* alarum fuscae: infimæ albæ. *Pectus* albicans. maculis rotundis nigris. *abdomen* albidum. *Rectrices* fuscae margine albo.

110. ANAS cauda longitudine pedum, vertice fuscō, pectore exalbido nebuloso.

Rudb. pict. Anas varia minor.

Habitat in Norlandia rarius.

DESCR. MAS. Pectus album, nebulosum: vertex capitis fuscus; cauda longitudine pedum, convenit in reliquis multis notis cum anate 95. *FEMINA* macula nulla ad alarum exortum. *pectus* folidum. *rostrum* virescens.

111. ANAS testaceo-nebulosa, superciliis albidis, rostro pedibusque cinereis.

Rudb. pict. Anas fusca media, rostro & pedibus cinereis.

Will. orn. 291. Anas circia Gesneri, an?

Alb. orn. 2. p. 92. t. 103. 104. Anas circia.

Habitat - - -

DESCR. Ad sternum folido nebulosa. Ale variegata, macula alarum cærulea supra infraque nigra, ante & post alba.

112. ANAS rufa, rostro pedibusque cinereis.

Rudb. pict. Anas fluviatilis rufa, rostro & pedibus cinereis.

Habitat in fluiis rarior.

Mergus.

113. MERGUS crista dependente, capite nigro cærulescente, collari albo.

Aldr. orn. l. 19. c. 63. *Gesn. av. 134.* Mergus cirratus s. longirostra major.

Merganser.

Will. orn. 253. t. 64. *Will. orn. 253.* Merganser fæmina.

Merganser.

Raj. av. 134. n. 1. Merganser.

Raj. av. 134. n. 2. Merganser.

Mars.

Mars. danub. 78. t. 37. | ser cirratus longiroster
Merganser. major.
Scheff. lapp. 348. Knipa. | *Alb. orn. 1.p. 83.t. 87,* Mer-
ganter.

*Suecic Wrakfogel, Kjörfogel, Gotlandis Ard. Up-
landis Skraka.*

Habitat in lacibus & fluviis.

DESCR. MAS. *Rostrum* teres denticulis recurvis subulatis. *Maxilla* supe-
rior apice elongata. *Caput* nigro-fuscureolescens, crista longa dependen-
te. *Collum* albicans. *Venter* albus. *Pectus* testaceum; *dorsum* cinereo-ni-
grum. *Remiges* primores nigrae, secundariae albæ, lineis duabus transver-
sis nigris. *Rectrices* 1-10 nigrae, 11-14 nigrae apicibus albis. 15-19 albæ
fundo nigro. 20-26 albæ apicibus nigris. *Regio urrhopygii* cinerea undula-
ta. *Cauda* nigra. *Pedes* & *Rostrum* rubra.

FÆMINA supra cinerea, capite griseo cristato; gula, collum, pectus, abdo-
men subruſ alba.

114. MERGUS crista dependente, capite nigro macu-
lis ferrugineis.

Gesn. av. 133. Anas longirostra.

Aldr. orn. l. 19. c. 60. Anas longirostra gesneri.

Will. orn. t. 64. Mergus cirratus minor.

p. 255. Mergus cirratus fuscus.

Raj. av. 135. n. 4. Mergus cirratus fuscus.

Gotlandis Pracka.

Habitat ubique in aquis.

DESCR. MAS. Caput nigrum maculis ferrugineis. *Pectus* griseum, nigris
punctis; venter albus lateribus albo nigroque undulatis. *Dorsum* nigrum.
Remiges nigrae, testrices alarum albæ, inferiores f. proximæ versus basi
nigrae, hinc macula alarum alba linea transversa fit. *Cauda* fusca. crista
dependens. *rostrum* denticulis subulatis recurvis.

115. MERGUS capite griseo crista destituto.

Will. orn. 261. t. 59. Mergus melanoleucus, rostro
acuto brevi.

Raj. av. 125. n. 5. Mergus melanoleucus, rostro a-
cuto brevi.

Rudb. piæt. Mergus minimus cinereus, capite semirufo.

Habitat in maritimis.

DESCR. Caput sordidum: maxilla inferior & gula alba. *Venter* & *pectus*
alba. *Dorsum* cinereo-nigricans. *Pedes* sordidi. macula alarum nigra ante
& pone alba.

Pelecanus.

116. PELECANUS subtus albicans; rectricibus quatuordecim.

Gesn. av. 137. Carbo aquaticus.

Aldr. orn. l. 19. c. 55. Corvus aquaticus.

Jonst. orn. t. 47. Carbo aquaticus.

Will. orn. 248. t. 63. Corvus aquaticus.

Raj. av. 122. n. 3. Corvus aquaticus.

Mars. dan. 16. t. 36. Corvus aquaticus.

Suecic Hafs - Tjåder.

Habitat in maris scopolis, arboribusque insidet.

DESCR. Magnitudo anseris. *Corpus* totum atrum. *Sinciput* lineolis albican-tibus longitudinalibus; *regio oculi* & *gula* cinerea. *Rostrum* albicans, absque dentibus, *rectum*, testaceo-nigrum, apice aduncu acuto. *Pedes* nigri, tetradyctyli digitis omnibus in usum connexis.

117. PELECANUS subtus fuscus; rectricibus duodecim.

Aldr. orn. l. 19. c. 58. Graculus palmipes aristote-lis s. Corvus aquaticus minor.

Will. orn. 249. t. 63. Corvus aquaticus minor s. Gra-culus palmipes.

Raj. av. 123. Corvus aquaticus minor, Graculus palmipes dictus.

Alb. orn. 2. p. 74. t. 81. Corvus aquaticus.

Habitat in maritimis: nidificat in arboribus.

DESCR. *Corpus* totum, uti *gula*, *rostrum*, *pedes* antecedentis; sed a *gula* ad *femora* usque *subtus* maculis testaceis albidis pingitur.

Alca.

118. ALCA rostri sulcis quatuor, oculorum regione tem-poribusque albisi.

Gesn. av. 725. Puphinus anglicus.

Aldr. orn. l. 19. c. 37. Fratercula marina s. Pica marina.

Alb. orn. 2. p. 73. t. 78. 79. Pica marina.

Mart. spitzb. 53. t. k. f. c. Avis glacialis.

Clus. exot. 104. Anas arctica.

Olear. mus. t. 15. f. 5. Anas arctica.

Will. orn. 244. t. 65. Anas arctica.

Raj. av. 120. n. 5. Anas arctica.

Worm. mus. 302. Anas arctica clusii.

Bar-

Barthol. act. I. p. 68. Lunda avis.

Oelig. mus. 2. f. II. n. 21. t. II. f. 21. Avis marina Lunda dicta.

Ferroenibus Lunda.

Habitat in rupibus & præcipitiis montium maris atlantici, præfertim in insulis, cum non nisi pacato mari piscari possit; uti sequentes nidificat in nudo scopulo, unico, semper in hoc genere, ovo.

Obs. Rostrum magis quam in Alca hoyeri compressum, maxilla superior non adunca; & maxillarum margo non excurrit infra oculos longiusculo processu ut in illa.

119. ALCA rostri fulcis octo; macula alba ante oculum.
Barthol. act. I. p. 91. Avis garfahl.

Will. orn. 242. t. 65. Penguin nautis nostratis diæta, quæ goifugel hojeri videtur.

Clus. exot. 101. Anser magellanicus.

Worm. mus. 300. t. 301. Anser magellanicus s. Penguin.

Raj. av. 118. n. 1. Penguin.

Habitat in mari Norvegico rarius.

120. ALCA rostri fulcis quatuor; linea utrinque alba a rostro ad oculos.

Will. orn. 243. t. 64. f. 1. t. 65. f. 2. Alca.

Worm. mus. 363. Alca.

Raj. av. 119. Alca hojeri.

Alb. orn. 3. p. 90. t. 95. Alca hojeri.

Gotlandis Tord. Angermannis Tordmule.

Habitat in insulis Carolinis Gotlandiæ, in insula Bon-
den Angermanniaæ. ovum 1.

DESCR. Magnitudine Cornicis. colore teto corpore prono nigro; subtus vero pectore, abdomine, testicibus inferioribus alatum albis. Remiges XI primores nigrae; secundarie XV nigrae apicibus albis. Ab oculis ad summum marginem rostri linea alba utrinque decurrit. Pedes nigri tridactyli palmati. Rostrum cultratum obtusissimum, nigrum fulcis 4 (in superiori maxilla, at 2 in inferiori) transversis exaratura, quorum se-
cundus albus est. maxilla superioris apex incurvus.

Colymbus.

121. COLYMBUS pedibus palmatis indivisis.

Clus. exot. 102. Mergus maximus Farrensis s. arcticus.

Worm.

- Worm. mus. 304. t. 305. Colymbus arcticus Lumme
dictus.*
- Will. orn. 259. t. 62. Colymbus arcticus.*
- Raj. av. 125. n. 7. Colymbus arcticus Lumme wor-
mio dictus.*
- n. 4. *Colymbus maximus caudatus.*
26. n. 8. *Colymbus maximus gesneri.*
- Nieremb. natur. 216. Mergus maximus Farrensis s.
arcticus.*
- Merr. pin. 180. Razorbill.*
- Oelig. mus. l. f. 11, n. 2. t. 1. f. 2. Colymbus a nor-
vegis Lumme.*
- Barth. act. 1. p. 90. Avis aquatica.*
- Besl. gaz. Hirundinis aquaticæ exoticæ singularis
species.*
- Scheff. lapp. 348. Lom.*
- Suecic Lomin.*

Habitat in lacubus Sueciæ ubique vulgaris, nidificat
in littore; ponit ova duo.

DESCR. Magnitudo fere Anseris; *Corpus* totum subtus album, supra ni-
grum punctis albis & nigris undulatum. *Caput* & *collum* canum, a gu-
fa ad sternum usque macula scutiformis nigro-purpurascens. *Corium*
avis tenacissimum est, hinc pro Scopeti tegmento usurpatum, nec non
ad cingendum pileum hyemale. Vidi corium præparatum, quod pulchre
insertiones pennarum exhibit perforatis poris; ubi pennæ per quin-
cumcem, uti arbores in campo quo minimum spatium repleant, & circum
singulam pennam in quadrato ordine plumæ 12. *Varietas.* Alia nobis vi-
fa, cui caput & latera collis cinerea; tergum collis albis nigrisque lineolis.
dorsum fuscum absque punctis albis. Pectus antice cinereo alboque ma-
culatum.

- 122. COLYMBUS** pedibus lobato-divisis; capite nigro.
Gesn. av. 139. Colymbus major.
- Aldr. orn. l. 19. c. 52. p. 254. 255. Colymbus ma-
jor cristatus.*
- Will. orn. 257. t. 61. Colymbus cristatus & cornutus.*
- Raj. av. 124. n. 2. Colymbus major cristatus & cor-
nutus.*
- Merr. pin. 180. Colymbus cristatus & cornutus.*
- Marf. danub. 80. t. 38. Colymbus major cristatus.*
- Habitat in mari.

DESCR.

DESCR. Crista bifida: caput croceum, collare atrum eminens extra reliquas pennis. macula in singula ala alba unciformi seu bifurca.

123. COLYMBUS pedibus lobato-divisis; capite rufo.

Gesn. av. 140. Trapazorola vel Mergulus.

Aldr. orn. l. 19. c. 52. t. 258. 252. Colymbus minor.

Will. orn. 258. t. 61. Colymbus f. Podiceps minor.

Raj. av. 125. n. 3. Colymbus f. Podiceps minor.

Sloan. hist. 2. p. 322. t. 271. f. 1. Colymbus f. Podiceps minor.

Mars. danub. 82. t. 39. Colymbus minor.

Ostro - Botniensibus Fiorna.

Habitat in mari. Ova 4. 5.

DESCR. Auritus est auribus brunneis. Caput nigrum. Collum brunneum. Rostrum acutum. Iris rubra. Crista duplex e plurimis nigris angustis. Collare expansum sed a tergo contractum, ad latera majus, sub gula bifidum nigricans marginibus, alias ferrugineum: pedes extra aequilibrium. Tibiae pone margine duplice ferrato. Digiitae tres semipalmatae fissi præter posticum minorem absque ungue. Vertex capitis fuscus. gula fusca, ut & pars corporis superior fusca. Alba sunt abdomen, gula, aures, oculi versus rostrum. Remiges 12-26 albae. Collum antice flavescens.

MAS. niger capite & collo; ab oculis deorsum versus collum linea e peninis longotibibus descendit ferruginea. Dorsum nigricans. Remiges primores nigrae, quo magis interiores eodam latenter interiorē albæ: remiges secundarie albæ. Corpus sub alis ferrugineum. Cauda fere nulla. Rostrum nigrum. FÆMINA tota grisea rostro, collo, dorso: remiges paulo magis nigricantes, secundariae vix albæ.

ALIA. Caput supta nigricans. gula sub oculis & colli initio alba. Collum & peccus antice ferruginea. Dorsum fuscum. canda nulla. remiges secundarie albæ. Pedes tetradactyli: tibiae postice duplicato ferrato.

Nidum conficit natantem in ipsa aqua marina (tamen in sinibus maris) & incubat ovis natante nido, ut me certiore fecit Rud. Haff.

124. COLYMBUS pedibus tridactylis palmatis.

Mart. spitzb. 56. t. L. f. B. Columba.

Will. orn. 245. Columba grœnlandica.

Raj. orn. 121. n. 6. Columba grœnlandica.

Rudb. pict. Colymbus minimus.

Alb. orn. 1. p. 81. t. 85. Columba grœnlandica.

2. p. 73. t. 80. Columba grœnlandica mas.

Suecic Sjö-orre, Grifla. *Gotlandis Grylle,* Grautle. *Olandis Alle.*

Habitat in Gotlandia maritimis, nidificat in petris, non alto loco. Ova duo ponit.

DESCR. Magnitudo gallina domestica minor. colore toto atro, exceptis testrilibus alarum albis, hinc macula alarum alba magna. Rostrum subulatum modice

dice compressum, fere gallinæ, nigrum, maxilla superiore longioro apice incurvo. Cauda brevis. Pedes rubri, tridactyli, palmati, pone æquilibrium positi: tibiis anticipitibus. Incedit erecta. *Communis. G. Wallerius.*

Larus.

125. LARUS albus, dorso cano.

Alb. orn. 2. p. 77. t. 84. Larus albus.

Suecis Homåka. Gotlandis Mave. Lappis Straule.

Habitat in mari & lacubus.

DESCR. *Corpus* totum album, sed dorsum & alæ supra dilute cinerea, uti & remiges, quarum primores 1, 2, 3, (interdum plures) versus apicem nigrae, macula alba in medio nigredinis notatae, omnes extimo margine (exceptis primis) albae. *Cauda* integra, alba. *Pedes* flavi, palmati, postico brevi. *Femora* seminuda. *Iris* oculorum cinerea. *Palpebrarum* margo nudus, coccineus; rostri maxilla superior fere corvi, convexa, cultrata, arcuata; inferior gibba. *Canthus* oris nudus, coccineus. *Lingua* sagittata, apice bifido. *Rofstrum* flavum, palatum denticulatum. *Magnitudo* fere gallinæ. *MASerat*, quem descripsit. *Ova* 3 ponit fæmina.

126. LARUS albus, dorso cinereo-fusco.

Raj. av. 127. n. 2. Larus cinereus maximus.

Habitat in mari & lacubus præcedenti mixtus.

DESCR. Omnia ut in præcedenti excepto quod dorsum & alæ supra fuscocinerea. *Remiges* secundariae (10-30) inclusive nigrae apicibus albis. Remiges primores vero eo magis versus apicem albi, quo principio propiores, nam prima penna alæ nec albo apice in hac ave notatur. *Mandibula* inferior, ubi subtus gibba, croceo colore tingitur. Hujus *pulli* colore diversissimi, non nisi peracta prima hyeme colores mutantur, patruumque vestitum induunt, quorum itaque descriptionem luber subjicere: *Corpus* totum scolopacino colore s. cinereo exalbido pallido, maculatum. *Pedes* cinerei, non flavi ut in præcedentibus: *Rofstrum* nigrum absque cantho oris ullo coccineo, nec palpebrarum annulo coccineo gaudet. *Collum* & *pectus* cinerea. *Remiges* cinereæ apicibus nigris, sed extima nulla macula alba infra apicem scatet. *Rectrices* albae maculis fuscis, versus apicem nigrae, summo margine albae.

Sterna.

127. STERNA rectricibus extimis maximis dimidiato-albis nigrisque.

Gefn. av. 53. Sterna.

Aldr. orn. l. 19. c. 7. Sterna.

Will. orn. 268. Hirundo marina, Sterna turneri.
t. 68. Hirundo marina major.

Jonst. av. 130. t. 46. Larus minor, Sterna.

Raj. av. 131. n. 1. Hirundo marina, Sterna turneri.

Alb. orn. 2. p. 79. t. 90. Hirundo marina minor.

Sue-

Suecis Tärna.

Habitat ubique ad lacus & stagna.

DESCR. *Caput* superne atrum. *Dorsum* cum alis superne incanum. *Pectus* adhuc dilutiū incanum. *venter*, *cauda*, alæ subtus albæ. *Cauda* forcipata albæ, rectricibus utrinque duabus extiniis exteriore in margine superne fuscis, quorum extima longissima. *Remiges*, quo apice alæ propiores eo longiores. *Rostrum* subulatum, versus apicem compressum, rectum, coccineum uti & pedes. *Nares* oblongæ, lineares: *femora* feminada. *pedes* palmati. *Ova* 3.

128. STERNA supra cana, capite rostroque nigro, pedibus rubris.

Habitat ultunæ prope Upsaliæ in minimarum insularum caretis.

DESCR. *Facies* & ferme magnitudo Sternæ. *Caput* atrum, modice convexum, parum compressum, acuminatum. *Nares* oblongæ, perviae, nude. *Color* totius avis *supra* canus una cum gula, pectore, abdomine, *Testrices* alarum inferiores una cum rectricibus inferioribus caudæ niveæ. *Remiges* primores 1-10 acuminatæ, secundariae 11-25 obtuse. *Cauda* parum forcipata *rectricibus* 12, quarum exteriore superioribus paulo longiores, nec extimæ longissimæ sunt ut in (127) præcedente. *Remiges* & *Rectrices* omnes unicolores & subtus albiscentes rachi nivea. *Pedes* semipalmati, tetradyli, rubri, postico libero digito interiore paulo breviore quam extinus. *ungues* nigri, horum intermedius introrsum marginatus.

129. STERNA rectricibus maximis nigris.

Mus. dan. i. s. 11. n. 20. Avis Norvagica Kyuffwa vel Tjufva.

Mart. spitzb. 63. t. L. f. D. Struntjager.

Bart. aet. i. p. 91. Truen s. Fur.

Raj. av. 127. n. 2. Struntjager i. e. Coprotherus.

Suecis Swartlaesse. Angermannis Labben.

Habitat in Angermannia, Finmarkia & alibi ad mare.

DESCR. *Caput* supra oculos nigrum: *pectus* albicans. *dorsum* fuscum. *Caudæ* due pennæ longissimæ nigrae.

Fulica.

130. FULICA fronte calva æquali.

Bell. ic. 36. b. Fulica.

Gesn. av. 390. Fulica recentiorum.

Aldr. orn. l. 19. c. 13. Fulica.

Lonic. 337. a. Fulica.

Will. orn. 239. t. 59. Fulica.

Raj. av. 116. n. 1. Fulica.

Anon. angl. Hoopoe.

Mars.

Mars. danub. 70. t. 33. Fulica.

Alb. orn. 1. p. 79. t. 83. Fulica.

Suecic Blås-klacka.

Habitat in aquis.

DESCR. *Corpus supra nigrum, subtus nigro-cinereum. pectus undulata canitie pictum. Rostrum carneum. Frons calva albo incarnaata. rostrum breve, nares oblongae; maxilla superiore longiore acuta recta. Cauda brevissima. Pedes longi tetradastyli lateralibus membranis acuti.* Afi ad ordinem gallinaceum rectius referri debeat, judicent, qui copiam habebunt hujus, semel enim & quondam ipse examinavi.

IV. SCOLOPACES.

Ardea.

131. ARDEA vertice papilloso.

Bell. it., 41. b. Grus.

Gesn. av. 529. Grus.

Aldr. orn. l. 20. c. 5. Grus.

Fonft. orn. 166. t. 54. Grus.

Blas. anat. t. 41. f. 8. Grus.

Will. orn. 200. t. 48. Grus.

Raj. av. 91. n. 1. Grus.

Mars. danub. 5. p. 6. t. 1. Grus.

Alb. orn. 2. p. 60. t. 65. Grus.

Suecic Trana.

Habitat passim in campis subhumidis.

DESCR. *Corpus cinereum. Remiges nigrae. frons nigra. occiput nigrum. vertex papillis coccineis coronatus. canda nigricans. Femora seminuda. pedibus nigris. Rostrum rectum, viride.*

132. ARDEA alba tota; capite laevi.

Raj. av. 99. n. 4. Ardea alba major.

Will. orn. 205. Ardea alba major.

Habitat in Scania, visa ad Araslöf.

DESCR. tota nivea, caret crista. *Rostrum luteum.*

133. ARDEA crista dependente.

Gesn. av. 212. Ardea pulla s. cinerea.

Fonft. orn. 151. t. 50. Ardea cinerea.

Aldr. orn. l. 20. c. 9. Ardea cinerea major.

Will-

Will. orn. 203. t. 49. Ardea cinerea major.

Raj. av. 98. n. 1. Ardea cinerea major.

Mars. danub. 5. p. 8. t. 2. Ardea cinerea major.

Alb. orn. 1. p. 64. t. 67. Ardea cinerea major f. pulla.

Suecic Håger.

Habitat ad aquarum ripas: nidificat in arboribus.

DESCR. *Rostrum* compressum, acutum. *Maxilla* superior nigra, inferior carnea. *crista parva dependens nigra*. *macula intra oculos & rostrum* untrinque albida. *gula alba*. *collum a tergo & dorsum cæruleo-cana*. *collum subitus albicat maculis nigris longitudinalibus pictum*. *Pectus & venter* albida. *Femora* flavescentia. *Remiges 24*, *nigræ*. *Cauda (12)* cana. *Femora* seminuda, cinereo-incarnata. *Pedes* nigricantes. *digiti intermedii unguis extrorsum ferratus*: extimus digitus adnexus intermedio digito.

134. ARDEA vertice nigro; pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus.

Gesn. av. 215. Ardea stellaris minor.

Aldr. orn. l. 20. c. 16. Ardea stellaris minor f. Oenus.

Will. orn. 207. t. 50. 52. Ardea stellaris.

Raj. av. 100. n. 11. Ardea stellaris.

Mars. danub. 5. p. 16. t. 6. Ardea stellaris.

Alb. orn. 1. p. 65. t. 68. Ardea stellaris.

Suecic Rördrum.

Habitat ad aquas.

DESCR. *Rostrum* longum, convexum, obsolete nigrum. *Nares* oblongæ valvula f. squama a latere superiore testæ, a qua canalis f. sulcus ad apicem rostri excurrit. *Lingua* angusta, acuta, triangularis. *Femora* seminuda, dilute viridia. *ungues* leviter arcuati, postico longiore. *Remiges* in singula ala 22. *Rectrices* 12 obtusæ: *Color corporis* supra rufo-testaceus maculis oblongis transversalibus; subtus vero dilutior maculis pennarum longitudinalibus. *Capitis* color luci objectus a rostro ad collum usque niger.

135. ARDEA nigra; pectore abdomineque albo.

Aldr. orn. l. 20 c. 2. Ciconia nigra.

Will. orn. 211. Ciconia nigra.

Raj. av. 97. n. 2. Ciconia nigra.

Gesn. av. 273. Ciconia nigra.

Alb. orn. 3. p. 77. t. 82. Ciconia nigra.

Rudb. pict. Ardea fusca, pectore & cauda nigra, rostro & pedibus sub-viridibus.

Suecic Odenswala.

Habitat in Smolandia rarius.

DESCR.

DESCR. magnitudo congenerum. corporis color supra niger, subtus albus est. Nigra sunt caput, collum ad sternum usque, dorsum, alæ, cauda. Alba vero pectus & venter: femora seminuda una cum rostro viridia.

136. ARDEA alba, remigibus nigris.

Bell. ic. 45. *a.* Ciconia.

Lonic. herb. 341. *a.* Ciconia.

Gesn. av. 262. Ciconia.

Aldr. orn. l. 20. c. 1. Ciconia.

Fonst. orn. 147. t. 50. Ciconia.

Will. orn. 210. Ciconia alba.

Raj. av. 97. *n.* 1. Ciconia alba.

Mars. dan. 5. *p.* 26. *t.* 11. Ciconia.

Alb. orn. 2. *p.* 59. *t.* 64. Ciconia alba.

Suecic Storck.

Habitat in Gothia, præfertim in Scania: nidificat super tectis, turribus, altis decollatis arboribus: edit ranas, serpentes, non vero bufones.

DESCR. Alba sunt caput, collum, venter, cauda. nigrae remiges. Rostrum pedesque rubri. facies magna ex parte alba.

Recurvirostra.

137. RECURVIROSTRA albo nigroque varia. *It. oeland.* 89.

Gesn. av. 232. Avosetta, Recurvirostra.

Aldr. orn. v. 3. l. 19. c. 64. Avosetta italis dicta.

Will. orn. 240. *t.* 60. Recurvirostra, Avosetta italorum.

Raj. av. 117. Recurvirostra, Avosetta italorum.

Mars. danub. 5. *p.* 72. *t.* 34. Recurvirostra.

Alb. orn. 1. *p.* 96. *t.* 101. Recurvirostra.

Ölandis Skjärflacka.

Habitat in Ölandiæ extimo apice s. maxime australi littore prædii Ottenby.

DESCR. Corpus album, sed supra caput, collum, latera dorſi & alas nigrum. *urhopygium* breve, nigrum. Remiges versus apicem alarum longiores, versus basin alæ breviiores: harum primores octo nigrae, sed versus basin albae, ea proportione, ut quo breviiores, eo magis albae, ut octava solo apice sit macula nigra notata, reliqua remiges omnes albæ. *tectrices* albæ, exceptis primis 5 apice nigris. *Rectrices* brevissimæ albæ. *Pedes* subcærulei cauda duplo vel triplo longiores, palmati omnino, postico minimo; unguibus nigris. *femora* seminuda. *Macula* alba patva sub & supra oculum utrin-

utrinque. *Rostrum* nigrum, depresso-planum & fere coriaceum, subulatum, actaninatissimum, recurvum versus superiora, minime rigidum, capite triplo longius, apice membranaceum. *nares* oblongæ, luci perviae.

138 RECURVIROSTRA pectore croceo.

Rudb. piët. Scolopax rostro recurvo, pectore rufescente, pedibus nigris.

Habitat in Lapponia.

DESCR. *Rostrum* longum, vix notabile recurvatur, hinc posset ex hoc genere expungi & forte aptius Numenii inferi. Tota subtus crocea a rostro ad femora. *dorsum* griseum, *rostrum* & *pedes* fuscæ.

Numenius.

139. NUMENIUS rostro arcuato, alis nigris: maculis niveis, pedibus cœrulecentibus.

Gesn. av. 222. Numenius s. Arquata.

Aldr. orn. l. 20. c. 21. Numenius.

Will. orn. 216. t. 54. f. 1. 2. Numenius aldr. s. Arquata.

Raj. av. 103. n. 1. Numenius s. Arquata major.

Alb. orn. 1. p. 75. t. 79. Arquata.

Habitat in paludibus.

DESCR. *Pedes* fusco-subcœrulecentes. *Rostrum* arcuatum, nigricans, longissimum. *Remiges* primores nigræ, secundariæ albo-maculatae. Alba sunt *Venter* & *urropygium*. *Pennæ* in corpore nigricantes, sed margine cincereo-rufescente in dorso, albido in pectore, albo-rufescente in gula. *Arquata* s. *Numenius medius Rudbeckii* est hujus femina, quamvis colore aliquam quasi avem sifstat, cuius caput, collum, pectus dilute grisea, maculis longitudinalibus fuscis, femora seminuda cœrulea; pennæ dorsi nigræ maculis griseis.

140. NUMENIUS rostro arcuato, dorso maculis fuscis rhomboïdalibus, pedibus cœrulecentibus.

Rudb. piët. Arquata s. Numenius minor, plumis dorso fuscis rhomboidalibus.

Habitat in paludibus.

DESCR. *Rostrum* maxime arcuatum, nigrum. *Pedes* cœrulecent. *Capitum*, *collum* & *pectus* maculis longitudinalibus acuminatis; inferioribus veluti finu arcuatis. *Venter* albus; pone femora maculæ distinctæ. *Cauda* cincerea fasciis fuscis. *Remiges* nigrant.

FÆMINA hujus, quam a D. D. Lechio habui, sequentem subministravit descriptionem: *Remiges* 26 nigræ, quartum 1 rachi alba. 1-5 apice & latere exteriore nigræ, 6 & reliquæ insequentes non tantum a latere exteriore, sed & a latere interiore maculis 5-12 albis. *Rectrices* 14 fasciis 8, pallidioribus, totidemque obscurioribus alternis. *urropygium* album lineis nigricantibus. *Caput* dilutius cincereum rachiibus obscurioribus, supra vero fuso-cincereum est.

141. NUMENIUS rostri apice lœvi; capite linea utrinque nigra; rectricibus nigris apice albis.

Gesn. av. 502. Rusticola s. Perdix rustica major.

Aldr. orn. l. 20. c. 51. Scolopax s. Perdix rusticæ.
Will. orn. 213. Scolopax.

Raj. av. 104. n. 1. Scolopax, Gallinago maxima.

Alb. orn. 1. p. 67. t. 70. Scolopax.

Suecic Morkulla. Anglis The Woodcock.

Habitat in appropriatis locis volitans per noctes quasi viam strictissimam in ipso aëre itu redituque continuo. Per hyemes in Anglia habitant, inde matrimonio junctæ vere discedunt.

DESCR. *Corpus* supra griseum lineolis crassiusculis transversis nigris cum maculis saepe nigris temere sparsis; subtus albicat totum, lineis tenuioribus nigris. *Cauda* brevissima, *rectricibus* nigris, apicibus supra canis, subtus niveis. *Margo* lateralis exterior *rectricium* restaceo-variegatus. a rostro ad oculos linea nigra extenditur. *Rostrum* rectum, digitis duplo longius, utrinque fulco exaratum; apex glaber, maxilla superior productior. *Pedes* cinerei, ad genua testi. *venter* maculatus ut reliquum corporis.

142. NUMENIUS pedibus virefcentibus, urrhopygio albo, remigibus lineis albis fuscisque undulatis.

Gesn. av. 520. Glottis.

519. Limosa venetorum.

Aldr. orn. l. 20. c. 66. Pluvialis major.

Will. orn. 220. Pluvialis major.

t. 55. Glottis s. Pluvialis major.

Raj. av. 106. n. 8. Pluvialis major.

Sloan. jam. 2. p. 317. Glottis s. Pluvialis major.

Suecic Glutt.

Habitat in paludibus.

DESCR. *Pedes* plumbei. *venter* albus. *pectus* griseum. *dorsum* pennis nigris margine griseis apicibus albis testum. *Rostrum* nigrum, basi inferiore maxillæ rubra.

143. NUMENIUS capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso; femoribus seminudis.

Gesn. av. 503. Gallinago s. Rusticola minor.

Aldr. orn. l. 20. c. 53. Scolopax s. Gallinago minor.

Will. orn. 214. Gallinago minor.

Raj. av. 105. n. 2. Gallinago minor.

Alb.

Alb. orn. I. p. 68. t. 71. Gallinago minor.

Suecic Waldsnäppa.

Habitat in carectis.

DESCR. *Caput* testaceo-pallidum, lineis quatuor fuscis longitudinalibus, quarum exteriores per oculos ducuntur. *Collum* griseum maculis fuscis. *Sternum* & *venter* alba. *Alæ* nigro-cinereæ pennis nigricantibus; margine exteriore longitudinaliter pallide testacco: disco punctato. *Cauda* brevis, introrsum testaceo-variegata, apice albido. *Femora* feminuda; digito postico unico articulo brevissimo, at intermedio longitudine tibiæ. *Rostrum* pallidum, longissimum, exteriore atrum, apice inæqualibus punctis excavatis. *Remiges* secundariae apicibus albent linea alba transversali, hinc clausis alis linea lateralis alba.

144. NUMENIUS urrhopygio albo; rectricibus nigris, basi albis; remigibus transversa alba macula: exceptis quatuor primis.

Habitat in carectis.

DESCR. *Magnitudo* Vanelli. *Caput*, *collum*, *pectus* subflavescens, transverse fusco-maculata. *Rostrum* rectum, longissimum, apice glabro. *Abdomen* albicans maculis cinereo-flavescens. *Dorsum* cinereum maculis fuscis testaceisque, latera cinerea immaculata. *rectrices* caudæ superiores & inferiores albæ. *Rectrices* nigræ, basi albæ. *Pedes* tetradactyli, nigricantes, longi, fissipedes. *Remiges* 1-4 nigricantes latere interiori albæ, 8 &c. nigricantes macula transversa alba. Communicavit D. D. Wallerius.

Tringa.

145. TRINGA facie papillis granulatis minimis carneis; rostro pedibusque rubris.

Aldr. orn. I. 20. c. 19. f. 1. 8. Avis pugnax.

Jonft. orn. 152. t. 51. 52. Avis pugnax.

Will. orn. 224. t. 56. Avis pugnax.

Raj. av. 107. n. 3. Avis pugnax.

Mars. danub. 52. t. 24. Avis pugnax.

Alb. orn. I. p. 69. t. 72. 73. Avis pugnax.

Suecic Brushane.

Habitat ubique per Sueciam, præsertim in Scania.

DESCR. *Dorsum* testaceum maculis nigris cærulescens nitidis. *Alæ* supra cinereæ, subitus albae. *Pectus* albicans, pennis nigris maculatum. *Venter* albus. *Cauda* fusca, fasciis pallidis. *Remige* 5 utrinque nigro alboque variegata. *Pedes* rubri cum postico, in mare pennæ colli longæ albae. *Facies* infinitis parvis papillis carneis adspersa. in aliis tres intermediae *rectrices* rufo-maculatae, reliquæ fuscae.

146. TRINGA rostri apice punctato; pedibus livido-virescentibus, dorso fusco-viridi nitido.

Bell. av. Cinclus.

*Gesn. av. 517. Gallinæ genus, quod nomine ignoto
Samets humbe nomino.*

508. *Rhodopus.*

511. *Ochrophus medius.*

*Aldr. orn. l. 20. c. 39. p. 461. Gallinula Rhodopus
f. Phænicopous.*

l. 20. c. 54. p. 481. Tringa.

Will. orn. 222. t. 55. Tringa.

Raj. av. 108. n. 7. Tringa.

Suecic. Horsgjök.

Habitat ad carecta & ripas.

DESCR. Rostrum nigrum. crura plumbea. Corpus supra fuscum. Alæ subtus nigræ lineis albis undulatis. venter albus. collum maculatum. Cauda maculis transversis. Reætrices 1 1 penitus candidæ. 2 2 macula prope apicem alba. 3 3 ductu albo non longe ab apice. 4 4 ductibus duobus. 5 5 ductibus duobus cum diuidio. 6 ductibus quatuor.

147. *TRINGA* rostro lævi, corpore cinereo lituris nigris,
subtus albo.

Gesn. av. 509. Gallinula aquatica hypoleucus.

617. *Motacilla* cujus iconem Kentmannus,
descriptionem Fabricius ex Misnia dedere.

Aldr. orn. 3. p 469. Gallinula hypoleucus.

Will. orn. 223. t. 35. Tringa minor.

Raj. av. 108. n. 5. Tringa minor.

Suecic. Snappa. Genevensibus Beccafin.

Habitat ad lacus.

DESCR. cum hac forte eadem est avis Westmannis Strandsittare, quæ habita in littoribus fabulosis (Kallstrander). Rostrum apex lævis; pedes & rostrum livida, vix capite longiora. Caput, collum pone, dorsum, alæ, urrho-pygium & tota supra cinerea lituris undulisque fuscis. Gula, abdomen, femora, anus alba. collum subtus album, lineis longitudinalibus subfuscis. Reætrices 6, 7 cinereæ undulis fuscis obsoletis. 5, 8 cinereæ immaculatae. 4, 9 apice albae, alias cinereæ obsoleto fusco undulatae, 1, 3, 10, 11, 12 albae apicibus, & albis fuscisque fasciis variæ. at 11, 12 toto exteriori latere albae. Remiges fuscae 1 immanculata. 2-10 fuscae, interiori latere macula fusca. 11-20 fuscae macula alba, utrinque latus regens harum 15-20 apice albae. nullæ lineolæ undulatae subtus, eximus digitus medio adnectitur. linea alba supra oculos.

148. *TRINGA* crista dependente, pectore nigro.

Bell. ic. 49. a. Capra, Capellus, Vanellus.

Gesn. av. 764. Vanellus.

Aldr.

- Aldr. orn. l. 20. c. 63.* Capella, s. Vanellus.
Jonst. orn. 164. t. 53. 27. Vanellus s. Capella.
Will. orn. 228. t. 57. Capella s. Vanellus.
Raj. av. 110. n. 1. Capella s. Vanellus.
Anonym. 138. t. 95. Lapving.
Alb. orn. 1. p. 70. t. 74. Capella s. Vanellus.
Suecis Wipa, Kowipa.

Habitat ubique in pratis depressis.

DESCR. *MAS.* *Caput* supra nigrum plumis longis pone reclinato pendulis in cristam. *Gula* versus collum deorsum nigra. *Pectorale* nigrum. *tempora* alba. *collum* supra cinereum. *Dorsum* e brunneo, ceruleo, viridi, ferrugineoque splendens. *Pectus* album. *Alæ* te^ctrices collo concolores sed magis cæruleæ. *Remiges* 24, nigræ, primariae 5 apicibus alblicant, secundariae versus basin alblicant. *Cauda* integra. *Rectrices* 12 albae, a medietate extiore nigræ, apicibus pallidis, quarum remex extima utrinque alba, excepta macula nigra prope apicem. *te^ctrices* caudæ extra & subtus ferrugineæ. *Rostrum* nigrum. *Nares* oblongæ, perviae. *Pedes* rubri. *Mas* gula nigra: *Fæmina* gula alba. *Maris* remex extima alba, macula infra apicem nigra. *Fæminæ* extimus remex totus albus est.

149. TRINGA rostro nigro, basi rubra: pedibus coccineis.

Gesn. av. Totanus.

Raj. av. 107. n. 1. Totanus.

Alb. orn. 3. p. 82. t. 87. Totanus.

Habitat ad paludes.

DESCR. *Femora* seminuda, plantis parum palmatis. *Cauda* albida nigro-undulata transversim. *Remiges* exteriores nigricantes. 11-21 albae: *dorsum* nigro-cinereum maculatum, uti & *caput* & *collum*. *pectus* album nigris maculis. *Abdomen* album. *Rostrum* capite longius, subulatum, lave.

150. TRINGA cinerea, remigibus secundariis basi tota-
liter albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis.

Raj. av. 105. n. 5. Canuti avis?

Habitat juxta aquas, ubi currit, caudam motacillæ instar continuo motitans.

DESCR. Magnitudo fere *Sturni*. *Caput*, *dorsum*, *collum* fusco nigro griseoque undulata. *Abdomen*, *pectus*, *gula*, *collum* subtus, alba. *Remiges* 20, fuscae, primores in medio pone albae, secundariae in medio totaliter 1. utrinque albae. apices in his secundariis albae, in primoribus minus manifeste albae. *Rectrices* fuscae 1, 2, 3, 4 albo-variegatae, at 5, 6 (seu quatuor intermediae) omnino albedine expertes & griseo-maculatae. *rostrum* fuscum, capite paulo longius. *Pedes* cinerascentes, tetractyli, ultimus medio adnexus infimo articulo. *femora* seminuda. *Alæ* subtus fascia quadruplici alba pinguntur. *te^ctrices* alæ superiores, præfertim priuæ, alblicant apicibus. *Remiges* 1 2 3 4 5 6 margine exteriore versus apicem serratae sunt. macula supra oculos alba. in lingua basi esto denticuli, & in fauce plures retro spectantes denticuli.

151. TRINGA remigibus fuscis, prima rachi nivea.

Rudb. piæt. Gallinula aquatica minima, pedibus nigricantibus.

Habitat in paludibus.

DESCR. rostrum nigrum. maxilla inferior versus basin pallidior. Collum fuscum lineis obliquis albicantibus. Dorsum fulcum, maculis punctis ferrugineis s. griseis. Urrhopygium album, pennis tamen versus basin nigricantibus. tectrices alarum superiores dorso concolores, sed punctis s. maculis dilutioribus. tectrices inferiores alæ exalbidae lineis transversis cinereis. Pectus & abdomen albidum. Caudæ tectrices inferiores albæ. Remiges nigrae, secundariae apice albescunt. Remex primus rachi nivea gaudet. Rectrices fusco & albo undulato maculatae, exterioribus maxima parte albis; intermediis maxima parte fuscis. Pedes fusti. Magnitudo Turturis. regio oculorum albicat; linea inter oculos & rostrum fusca.

152. TRINGA nigra albo punctata, pectore maculato, abdomine subalbido, pedibus virescentibus.

Rudb. piæt. Gallinula aquatica minor, pedibus sordide viridibus.

Habitat in sylvis uliginosis.

DESCR. Dorsum nigrum punctis albis adspersum; venter fere albus; pectus maculatum.

153. TRINGA luteo cinereoque maculata subtus alba, rostro pedibusque rubris.

Rudb. piæt. Gallinula aquatica rostro & pedibus rubris.

Habitat in desertis paludosis.

DESCR. Corpus luteo & cinereo maculatum; pectus albo & cinereo maculatum.

154. TRINGA nigro albo ferrugineoque variegata; pectore abdomineque albo.

Gotlandis Tolck.

Habitat in *Gotlandia* insulis Heligholmen & Clasen.

DESCR. Magnitudo Turdi. Venter, pectus, coda subtus, alæ subtus, dorsum pone alba. Caput magna ex parte album maculis griseis adspersum. Collum s. Pectus anterior nigrum lata macula, a qua utrinque versus partem superiorem colli, alia per oculos versus frontem, alia versus maxilla inferioris latera. Hanc nigredinem distinguit macula alba in gula; alia alba inter rostrum & oculos, alia ad aures, alia in sincipite. Cauda brevis fusca. Rectrices basi apiceque albæ, exceptis intermediis duabus. Alæ superne cinereæ. Remiges nigricantes, versus basin albæ, at secundariae & apice & basi albæ; dorsum tegunt pennæ longiores latiores nigre maculis ferrugineis. Rostrum breve, subulatum, obtusum, nigrum, longitudine digitorum. Nares oblongæ, perviae. Pedes sanguinei, fissi, tetradactyli, unguibus nigris; femoribus feminudidis.

155. TRINGA nigro-fusca subtus alba, rostro nigro, pedibus virescentibus.

Raj. av. III. n. 3. Pluvialis cinerea.

Alb. orn. I. p. 72. t. 76. Pluvialis cinerea.

Lechei Tringa augusti mensis.

Habitat in Scania.

DESCR. Rostrum nigrum. Pedes viridi-cinerei, incisuris transversis. Remiges 24, quarum 1 rachi alba; 2-4 nigriores, reliquæ magis fusca. omnes margine apicum præsertim albae. tectrices insuper maculis transversis notantur. Rictices 12 albae lineis transversis fuscis distantibus, exceptis intermediis duabus, in quibus lineæ latiores & propiores. Corpus nigro-fuscum, Peccus, abdomen, urrhopygium alba. Caput collumque nigris parvis maculis in cinereo adspersum. D. Leche.

Charadrius.

156. CHARADRIUS nigro lutescente variegatus, pectorre nigro.

Rudb. pict. Pluvialis minor nigro-flavus.

It. oel. 72. Alwargrim.

Ölandis Alwargrim. *Suecic Åkerhöns.* *Smolanaic Myrpytta.*

Habitat in Ölandiæ campis sterilibus.

DESCR. Magnitudo Columbæ. Caput, collum, dorsum, alæ, canda maculata maculis albis, nigris, luteoque fuscis mixtis, singula penna nigra maculis quibusdam luteo-fasciis ad latera, pallidioribus versus apicem. lana ad basin singulæ pennæ cinerea. Femora, sub alis, & sub cauda, alblicant. latera colli versus thoracem alba. Peccus nigrum. collum subtus nigrum. rostrum, longitudine capitis, nigrum, versus basin gibbum. Femora seminuda. pedes cinerei; digitus extimus adnexus intermedio membrana quadam primum articulum. Remiges nigricantes: primores octo, quarum extima longissima, reliquæ ordine breviores, acuminatæ, in medio juxta rachin albae. remiges secundarie itidem fuscae, obtuse, æquales, apicibus albis, uti etiam tectrices. Cauda integræ, rectrices 10 fuscae, lineis lateralibus octo utrinque flavescentibus.

157. CHARADRIUS nigro lutescenteque variegato, pectorre concolore.

Will. orn. 229. t. 57. Pluvialis viridis.

Raj. av. III. n. 7. Pluvialis viridis.

Sloan. hist. 2. p. 313. t. 269. f. 1. Pluvialis viridis.

Alb. orn. I. p. 71. t. 75. Pluvialis viridis.

Dalekarlis Åkerhöna. *Lappis Huttii.*

Habitat juxta alpes Dalekarlicas in orientali Dalekarlia & in Ölandiæ campestribus.

DESCR. *Magnitudo* Columbae. *Corpus* supra nigricans maculis parvis o-
vatis testaceis adspersum, inque singula penna ad marginem delineatis. *Gu-*
la albescens. *Collum* subtus a gula ad sternum e testaceo & fuscō macula-
tum. *Pectus* & *venter* alba. *Cauda* integra, rectricibus 12 fuscis, maculis
testaceis variegata. Alarum *remiges* nigro-fuscæ, margine apicum albican-
te. *rectrices* alarum nigro-fuscæ apicibus albis. *Ala* subtus alba. *Femora*
seminuda cinerea. *digitus* extimus adnectitur primo articulo membrana.
Aliam avem sic descripsimus: *Corpus* viridi-luteum, maculis in dorso ni-
gris, ramosis. *Pectus* ex flavo-viridi variegatum. *venter* albus. *Remiges* fu-
scæ 1-9 medio scapo albantes; 5 - &c. basi extrorsum albant.

158. CHARADRIUS pectore ferrugineo: linea alba
transversa collum pectusque distinguente.

Alb. orn. 2. p. 57. t. 61. 62. Morinellus.

Habitat ad Sernam orientalis Dalekarliae.

DESCR. *Collum*, *dorsum* dilute cinerea. *Pectus* ferrugineum, ad basin ster-
ni linea transversalis alba linea nigra superinducta. *venter* nigricat; sin-
gula tamen penna interius albicat. *gula* alba. *canda* cinerea albo marginæ.
Ala subtus pallidiores. Linea alba a rostro caput cingit. *digitus* extimus
medio adfixus membranula. *Rectrices* fuscæ, quarum 1 2 3 apice albae,
reliquæ vix margine apicis albantes. *Caput* supra nigricans. *Magnitudo*
Turdi. *Rostrum* pedesqñ nigri. *Mas* versus femora niger est.

159. CHARADRIUS pectore nigro, fronte nigricante
lineola alba, vertice fuscō.

Jonst. orn. 166. t. 53. Charadrios.

Aldr. orn. l. 20. c. 67. Charadrios s. Hiaticula.

Will. orn. 230. t 57. Charadrius s. Hiaticula.

Raj. av. 112. n. 6. Charadrius s. Hiaticula.

Marcgr. bras. 199. Mutuiti brasiliensibus.

Sloan. hist. 2. p. 314. t. 169. f. 2.

Alb. orn. 1. p. 76. t. 80. Charadrius.

Rudb. piæt. Charadrius s. Hiaticula flavipes.

Suecis Strandpipare. *Lappis* Pago.

Habitat ad ripas ubique, & in alpibus Lapponicis
frequens.

DESCR. *Rostrum* croceum, apice nigro. *Caput* cinereo-fuscum, fronte
subnigricante linea alba transversa. *tempora* obscuriora, *gula* & *collare* al-
bum, dein ad sternum usque nigra magna macula. *Dorsum*, *ala*, *canda*
cinerea. *venter*, *pectusque* alba. *Pedes* flavi, (in altero sexu fulvi.) *Remiges*
fuscæ, quarum 1 rachi alba, 5-19 apice albo. *Rectrices* fuscæ, sed 6 6 im-
maculatae; 3 4 5 apice albo, 2 apice & latere exteriore albæ. sed. 1 1 o-
mniño albæ macula fusca.

160. CHARADRIUS abdome rufescente, pectore ci-
nereo, vertice fuscō.

Rudb. piæt. Charadrius major cinereo-rufus, prona
parte flavescente.

Habitat in Lapponia.

DESCR. Magnitudo Turdi majoris. *Vertex* cinereo-fuscus. *Pectus* cinerum, *venter* rufescens, sub *cauda* albus. *dorsum* & *alæ* cinerea maculis rufescentibus picta. *digitus* posticus ut in reliquis nullus. *Rostrum* nigrum. *pedes* cinerei.

Hæmatopus.**161. HÆMATOPUS.**

Bell. obs. 18. Hæmatopus.

Gesn. av. 546. (fig. mal.) Himantopus.

Aldr. orn. l. 20. c. 31. Hæmatopus bellonii.

Barth. aet. 1. p. 90. Pica marina s. Kielder.

Will. orn. 220. t. 56. Hæmatopus bellonii.

Raj. av. 105. n. 7. Hæmatopus bellonii.

Alb. orn. 1. p. 74. t. 78. Hæmatopus.

It. oel. jun. 8. Strandskjura.

Gotlandis Marsspitt. *Ölandis* Strandskjura.

Habitat ad littora maris, præsertim Ölandiæ & Gotlandiæ.

DESCR. *Rostrum* sanguineum, capite longius, compressum præsertim apice cuneo. *Nares* oblongæ perviae. *palpebrae* nudæ circulo coccineo. *Iris* rubra, *pupilla* nigra. *Caput*, *collum* usque ad *sternum*, *dorsum* ad *medium* & *alæ* superius nigra. *Pectus*, *venter*, *dorsum* posterius, *rectrices* utrinque *caudæ* albæ. *Rectrices* albæ, a medio ad extremum nigrae. *Remiges* vero nigrae, ut in media costa linea alba, & latus interius remigum album. remiges secundariæ nigrae, versus basin albæ & margine albæ. *rectrices* apud alba. *Femora* seminuda. *Pedes* incarnati tridactyli.

Ortygometra.**162. ORTYGOMETRA** alis rufo-ferrugineis.

Turn. Crex aristotelis.

Aldr. orn. l. 13. c. 23. Ortygometra.

Will. orn. 522. t. 29. Ortygometra aldr.

Raj. syn. 58. Ortygometra.

Alb. orn. 1. p. 31. t. 33. Ortygometra.

Uplandis Ångsnärpa.

Habitat inter gramina in pratis fertilissimis æstate, ubi stridulo gemino fono crex crex continuo audiatur: frequentissima Upsilonæ, edit lumbricos.

DESCR. Magnitudo Picæ. *Caput* ratione corporis minimum. *Caput*, *collum*, *dorsum*, *cauda* testacea maculis majusculis nigris, nam singula pen-

na nigra est, margine undique testaceo. Ala remiges & rectrices ferruginea supra & infra. Cana sunt gula & macula pone oculos. pectus griseum. abdomen & latera ferruginea maculis fuscis (color exustus) albo undulata, qualia & cauda subtus. Femora supra genua nuda, livida, ingluvies nulla. Rostrum utrinque basi sinuatum, lividum. Nares oblongæ, perviae. Oculi nigri, pupilla rufescere. pollice vix incedit. alæ infra imagis quam extra rufa. difficile capitur, licet facile auditur.
Character consistit in Rostro fere gallinaceo, naribus perviis, lingua integrâ, pedibus tetrâdactylis rostro longioribus digitis.

V. GALLINÆ.

Pavo.

163. PAVO cauda longa.

Gesn. av. 656. Pavo.

Aldr. orn. l. 13. c. 1. Pavo.

Jonst. orn. 56. t. 22. Pavo.

Valent. mus. 464. Pavo.

Will. orn. 112. t. 27. Pavo.

B *Raj. av. 51. n. 2. Pavo colore albo.*

Suecic Pafogel.

Habitat apud nostrates rarius, præsertim in aviariis Magnatum, non vero sponte.

Meleagris.

164. MELEAGRIS.

Lonic. herb. 337. a. Gallo-pavo.

Gesn. av. 482. Gallo-pavo.

Aldr. orn. l. 13. c. 4. Gallo-pavo.

Bell. ic. 60. a. Meleagris.

Blas. anat. t. 46. f. 11. Gallus africanus.

J *Jonst. orn. 58. t. 24. Gallo-pavo mas.*
Gallina indica.

Will. orn. 113. t. 27. Gallo-pavo s. meleagris & numidica avis.

Raj. av. 51. n. 3. Gallo-pavo s. avis numidica & meleagris quibusdam.

Suecic Kalkon.

Habitat apud nos ubique culta ex America septentrionali, ubi niger semper est.

OBS. Mas pectore barbato est.

Gal-

Gallus.

165. GALLUS cauda compressa ascende[n]te.

Aldr. orn. l. 14. c. 1. Gallus gallinaceus & Gallina.

Gesn. av. 395. Gallus gallinaceus.

340. Gallina.

427. Capus.

Blas. anat. t. 44. f. 9. Gallus gallinaceus.

f. 10. Gallina.

Will. orn. 109. t. 26. Gallus gallinaceus.

Gallina domestica.

Raj. av. 51. n. 1. Gallus gallinaceus.

Suecis Höns, Tupp & Höna.

β *Raj. av. 51. n. 1.* Gallina crista in vertice plumosa
densissima & undequaque diffusa spectabilis.

Suecis Tofshöns.

γ *Raj. av. 51. n. 1.* Galliná cauda s. urrhopygio carens.

Will. orn. 110. t. 26. Gallus e Persia.

Suecis Gumphöns.

δ *Will. orn. 110.* Gallina frislandica.

Raj. av. 51. n. 1. Gallina crispa, nostratisbus Frislan-
dica pennis reflexis caput versus & velut inversis.

Suecis Kroll - Höna.

Habitat ubique culta.

Tetrao.

166. TETRAO rectricibus exterioribus subterioribus,
alarum basi alba macula.

Gesn. av. 491. Urogallus.

495. Grygallus major. (fæmina)

Aldr. orn. l. 13. c. 6. Urogallus s. Tetrao major.
Urogallus fæmina.

Will. orn. 123. t. 30. Urogallus s. Tetrao major.

Raj. av. 53. n. 1. Urogallus s. Tetrao major.

Nieremb. natur. 235. Tetrao.

Alb. orn. 2. p. 28. t. 29. 30. Mascovian.

Suecis Kjader.

MAS. cinereus lineolis minimis fuscis confertis: alæ ejusmodi lineolis
ferrugineæ. Pedes antice viridi nitens, alias nigro alboque varium. Rectri-
ces 18, quarum laterales sensim breviores, omnes nigrae in medio albo ma-
culatae. Remiges nigrae 2-6 margine exteriore albae. Alæ subtus albæ, que
albedo ad alas prominet, maculam albam cauflans.

167. TETRAO cauda bifurca subtus albo punctata.

Aet. stockb. 1744. p. 181. Rackelhane rutenschöldii.

Suecis Racklehanæ. *Roslagis* Roslare.

Habitat in sylvis Roslagiæ & Smolandiaæ.

OBS. Ipse non vidi; de hac ave multa venatores nostri, qui sono facile eam distingunt; dubia avis mihi visa fuisset, ni Nobiliss. D. *Carolus de Geer*, Cubic. Reg. ipse eam vidisset & delineasset. an species hybrida a præcedenti & sequenti specie. Magnitudo fæminæ præcedentis: colli color & caudæ structura ut in præcedenti. præcedenti longe rario, timidor & lingua s. sono diversus.

168. TETRAO remigibus secundariis a medio basin ver-
fus albis, cauda bifurca.

Gesn. av. 494. *Urogallus minor.*

496. *Grygallus minor.*

Aldr. orn. l. 13. c. 7. *Urogallus s. Tetrao minor.*
Grygallus minor s. Tetrix ne-
mesiani.

Will. orn. 124. t. 31. *Tetrao s. urogallus minor.*

Raj. av. 53. n. 2. *Tetrao s. urogallus minor.*

Scheff. lapp. 350. *Orrar.*

Alb. orn. 1. p. 22. t. 22. *Tetrao s. urogallus minor.*

Suecis Orre.

**Habitat ubique in sylvis, præsertim Norlandiæ; in
campis ericotisque vere fæminas provocat.**

OBS. Maris rectrices nigræ, quarum 3 utrinque exteriore extorsum recurvatae, & sic cauda bifurca. Remiges nigrantes, sed secundariæ a bafi ad medium albæ, ut & apices harum. testrices inferiores remigum & rectricium albæ. dorsum nigrum.

169. TETRAO rectricibus albis: intermediis nigris api-
ce albis.

Gesn. av. 577. *Lagopus.*

578. *Lagopus varia.*

Aldr. orn. l. 13. c. 21. *Perdix alba s. Lagopus.*

Will. orn. 127. t. 32. *Lagopus avis.*

127. *Lagopus.*

Raj. av. 55. n. 5. *Lagopus avis.*

54. n. 3. *Lagopus altera.*

Scheff. lapp. 351. t. 352. *Lagopus.*

Suecis Snöripa. *Lappis* Cheruna.

Habitat in sylvis Norlandiæ, præsertim Lapponiæ.

OBS.

OBS. *Variat* magnitudine: in alpibus longe minor. *variat colore: hyeme* alba, *estate* flavescentia. *Rectrices* albae, at 8 9 omnino nigrae apice albo. *remiges* albae.

170. TETRAO rectricibus cinereis punctis nigris fascia lata nigra exceptis intermediis duabus.

Gesn. av. 229. l. 13. c. 11. Gallina corylorum s. Bonasia alberti.

Aldr. orn. l. 13. c. 11. Gallina corylorum.

Will. orn. 126. t. 21. Gallina corylorum.

Raj. av. 55. n. 6. Gallina corylorum.

Suecic Hjärpe.

Habitat inter Betulas præcipue, cujus amentis vicitat.

MAS. *Caput, collum* cinereum lineolis transversis fuscis. *gula nigra*; sub oculis versus aures a rostro alba macula oblonga. *alæ extra ferruginea* maculis nigris. *dorsum* cinereum punctis nigris. *abdomen* album maculis magnis cordatis fusco-ferrugineis. *Rectrices* duodecim cinereæ nigro punctatae scilicet 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versus apicem latata fascia nigra, apice albæ; at 8, 9, absque macula & fascia.

FÆMINA. *Tergum canum* maculis longitudinalibus nigris, reliquum anterius dorsi a capite cinereum, lineis transversis fuscis. *alæ supra* versus basin ferrugineo & nigro maculatae. *Remiges primores* cinereæ 10, quarum 1-7 margine anteriore griseæ, reliquæ non. *remiges secundariae* 10 cinereæ, a latere anteriore dilutis ferrugineis maculis adspersæ, at *remiges* 8, 9, 10 immaculatae. *gula nigra*, tempora alblicant. *Rectrices* 16 cinereo & nigro maculatae transversim; versus apicem has omnes fascia nigra ambit, exceptis duabus intermediis.

171. TETRAO rectricibus cinereis superiore mediante hinc inde rufis.

Gesn. av. 682. f. mal. Perdix major.

Aldr. orn. l. 13. c. 18. Perdix rufa s. major.

Jonst. orn. 68. t. 27. f. Perdix major.

Will. orn. 118. t. 29. Perdix rufa.

Raj. av. 57. n. 2. Perdix rufa.

Alb. orn. 1. p. 29. t. 29. Perdix rufa.

Suecic Aker-höna.

Habitat in cultis.

DESCR. Rostrum & pedes rubri, *Cinerea* sunt caput, collum, dorsum, urrhopygium, femora. colore vinaceo tingitur collum infimum. *gula alba*. *macula nigra* in infimo maxillæ inferioris angulo. *Torquis niger* a naribus supra oculos productus hanc albedinem cingit. *inguvies* infra linguam cinerea. *Pectus* e flavo rufum. *Rectrices* 1-5 hinc inde superiore medietate rufæ, inferiore cinereæ. 6 cinereæ. *Will.*

172. TETRAO macula nuda coccinea pone oculos, re-
ctricibus ferrugineis.

Adr. orn. l. 13. c. 19. Perdix minor cinerea.

Jonst. av. 68. t. 27. f. 1. bona. Perdix cinerea.

Will. orn. 119. t. 29. Perdix cinerea.

Raj. av. 57. n. 2. Perdix cinerea.

Alb. orn. 1. p. 25. t. 27. Perdix.

Suecic Rapphōna.

Habitat in cultis.

DESCR. Fæminæ *Caput* superius griseum punctis oblongis albidis adspersum. nares squama teste. macula pone oculum coccinea papillosa. palpebra inferior albida. *Pectus* cinereum lineis tenuissimis undulatum. *dorsum* griseum maculis linearibus undulatis brunneis. Alarum testrices griseæ maculis fusco-brunneis rachi alba. *Remiges* 22 cinereo nigrae-fasciis pallidis. Macula magna brunnea ad sternum. *Venter* albus. *Rectrices* 16 ferrugineæ. *Tibiae* flavæ. *Gula*, regio superciliarum & frontis ruffa. Mas macula nigra in sterno a Fæmina differt.

173. TETRAO pedibus nudis, corpore griseo macula-
to, linea superciliarum alba.

Gesn. av. 353. Coturnix.

Aldr. orn. l. 13. c. 22. Coturnix latinorum.

Jonst. orn. 69. t. 28. Coturnix.

Raj. av. 58. n. 6. Coturnix.

Alb. orn. 1. p. 28. t. 30. Coturnix.

Suecic Wachtel.

Habitat in arvis.

DESCR. Palpebræ rubræ. *pedes* pallide flavi. totum corpus tegitur pennis rachi flava linea notatis, iisque apice testaceis punctis nigris. Linea pallida longitudinalis supra oculos. *pectus* & collum pallide testacea maculis obtusis in singula penna utrinque solitariis. *abdomen* albidum. *Remiges* exteriores fuscae, interiores magis pallidæ a latere exteriore maculis dilute testaceis. *Rectrices* fuscae, rachi alba; adspersæ punctis testaceis transversis. *Area lata longa nigricans* sub mandibula inferiore.

VI. PASSERES.

Columba.

174. COLUMBA cærulescens, collo nitido, macula du-
plici alarum nigricante.

Aldr. orn. l. 15. c. 7. Oenas s. Vinago.

Will. orn. 136. t. 35. Oenas s. Vinago.

Raj.

- Raj.* av. 62. n. 10. *Oenas f. Vinago.*
Alb. orn. 3. p. 39. t. 46. *Columba vulgaris.*
Suecis Skogsdufwa.
- β *Will.* orn. 130. t. 32. *Columba domeftica f. vulgaris.*
Raj. av. 59. n. 1. *Columba domeftica.*
Suecis Dufwa, *Hemdufwa.*
- γ *Will.* orn. 121. t. 34. *Columba gutturofa.*
Raj. av. 60. n. 2. *Columba gutturofa.*
Suecis Kroppdufwa.
- δ *Will.* orn. 132. *Columba Turbita dicta.*
Raj. av. 60. n. 7. *Turbitæ.*
- ϵ *Will.* orn. 133. t. 34 *Columba barbarica f. numidica.*
Raj. av. 60. n. 8. *Barbaricæ seu Numidicæ.*
- ζ *Raj.* av. 60. n. 6. *Columba cucullata f. Jacobea.*
Gesn. av. 279. *Columba anglica vel russica.*
- η *Raj.* av. 60. *Columba percussor.*
 Habitat in sylvis agros frequentans; at varietates omnes cultæ & domesticæ sunt; nec dubito quin omnes, $\beta.$ $\gamma.$ $\delta.$ $\epsilon.$ $\zeta.$ $\eta.$ ex hæc ortæ sint.

175. COLUMBA collo utrinque albo, pone macula fusca.

- Aldr.* orn. l. 15. c. 5. *Palumbus major torquatus.*
Will. orn. 135. t. 35. *Palumbus torquatus.*
Raj. av. 62. n. 2. *Palumbus torquatus.*
Alb. orn. 2. p. 42. t. 46. *Oenas.*
Suecis Ringdufwa. *Ölandis Siutut.*
- α *Will.* orn. *Turtur.*
Raj. av. 61. *Turtur.*
Alb. orn. 2. p. 43. t. 47. *Turtur.*
 Habitat ubique in sylvis, at α culta ubique est; macula a tergo dorſi, magnitudo, facies, sonus suadent eandem speciem.

Loxia.

176. LOXIA linea alarum dupli alba.

- Gesn.* av. 276. *Coccothraustes.*
Aldr. orn. l. 16. c. 20. *Coccothraustes ornithologi.*

Fonst. orn. t. 37. *Coccothraustes.*

Charl. onom. 84. f. 85. *Coccothraustes vulgaris.*

Will. orn. 178. t. 44. *Coccothraustes vulgaris* *gen-*
fneri & aldrouandi.

Raj. av. 85. n. 1. *Coccothraustes vulgaris.*

Alb. orn. 1. p. 54. t. 56. *Coccothraustes vulgaris.*

Suecis Swensk Papegoja, Tallbit, Parisfogel.

Habitat in pinetis, edit semina & nucleos durissi-
mos; ut sequens conis Abietis vicitat, ita haec
Pini conis delectatur.

DESCR. *Dorsum & pectus rubra*, ita tamen, ut singulæ pennæ cinereæ
sint & extimo margine rubræ. *Venter cineretis*. *Aleæ nigricantes* lineis du-
abus obliquis albicantibus. *Cauda nigricans*. *Rostrum conicum*: maxilla
superiore longiore, incurva, ampliore. *Lingua integra*. pluinae nigrae nares
tegunt. *pedes nigri*.

177. LOXIA rostro forficato.

Gesn. av. 592. *Loxia.*

Charl. onom. 68. t. 68. *opt. Loxia s. curvirostra.*

Will. orn. 181. t. 44. *Loxia.*

Raj. av. 86. *Loxia.*

Rudb. lapp. 75. *Conirofor.*

Alb. orn. 1. p. 58. t. 61. *Loxia.*

Suecis Korsnäf, Kiågelrifware.

Habitat in sylvis abietinis, vicitans conis abietis,
ubi conos primo dejicit rostro ab arbore liberatos,
quotquot unquam valet, dein singulum per se ar-
ripit, pedibus tenet uti *Psittacus* vel *Sciurus*, ro-
stri forifice per singulas squamas frangendo semina
investigat; & quod singulare, magnitudine & co-
lore omnino abietis conum refert, & structura ro-
stri ad semina hujus solè edenda creata videtur;
licet & semina cannabis & juniperi baccas edere
queat. Mira fortitudo parvæ avis, utpote quæ ba-
cillos ligneos crassitie digiti brevi mora levique ne-
gotio detruncat. Maxilla superior in hac mobilis
est, ut in congeneribus.

DESCR. Cinerea sunt *canda* & *aleæ* nigra remiges & rectrices supra. Flava in
femina, fulva in mare sunt *pectus*, latera ventris, lumbi, albicans *venter*,
dorsum & *caput* & cinereo & sulphureo (in femina) seu fulvo (in mare)
nebulosum. *Rostri* utraque maxilla acuminata, obliqua, cruciatim exser-
ta. *Lingua* *integra*.

178. LOXIA artubus nigris, testicibus caudæ remigumque posteriorum albis.

Gesn. av. 733. Rubicilla s. Pyrrhula.

Aldr. orn. 4. t. 17. c. 31. Pyrrhula s. Rubicilla.

Jonst. orn. 122. t. 43. Pyrrhula s. Rubicilla.

Will. orn. 130. t. 43. Rubicilla s. Pyrrhula.

Raj. av. 86. n. 5. Rubicilla s. Pyrrhula.

Alb. orn. 1. p. 59. (mas) 60. (femina) Rubicilla.

Suecic Domherre.

Habitat in sylvis, edit avide gemmas arborum erumpentes. facile cicuratur, & egregie edocta cantilat. *Mas* accipiens araneam diu tenuit in ore, deinde dedit fæminæ.

DESCR. *MAS.* Caput nigrum. Rubra tempora, gula, pectus, venter. Cæruleo-cinerea collum, dorsum. Cauda indivisa, nigra, superne cæruleicens. regio circa caudam supra & subtus alba. Rostrum nigrum, crassissimum, utrinque gibbum; maxilla utraque mobilis. Lingua integra. Nares patulae letis parvis testæ. Alæ nigræ linea transversali albicante. Remiges 16 nigræ versus marginem interiorem albæ. Remiges 12 nigræ immaculatae. Testrices alæ nigrantes, sed 9 - 16 apice albæ.

FÆMINA. Caput ad oculos usque nigrum, gula nigra. Alæ nigræ subtus albæ, ut & cauda. regio pone femora alba. Urrhypogium album. dorsum cinereum. caudæ basis supra & subtus alba. rostrum brevissimum, crassissimum, undique convexum. lingua ovata, carnosæ, apice villis lacero. ab oculis per collum & pectus ad femora cinerea. remiges testricesque alteræ. remigum posteriorum & caudæ testrices apice albæ.

Ampelis.

179. AMPELIS remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis.

Gesn. av. 703. Garrulus Bohemicus.

Jonst. orn. 44. Garrulus Bohemicus gesneri, Ampelis aldr.

t. 43. Picæ glandariæ genus.

t. 17. Picæ glandariæ species alia.

Will. orn. 90. t. 20. Garrulus bohemicus.

Raj. av. 85. Garrulus bohemicus.

Alb. orn. 2. p. 25. t. 26. Garrulus bohemicus.

Suecic Sidenfwantz.

Habitat in sylvis.

DESCR. Rostrum nigrum, convexum. Maxilla superior longior, incurva, utraque apice utrinque emarginato. Lingua cartilaginea, curta, bifida. Caput ferrugineum, pennis longioribus versus nucham. Linæ albi ad canthum

thum oris. Cinereum totum *corpus* est, at versus caput magis *castaneum*. Nigra sunt *gula*, *tempora* & *oculorum regio*, *rectrices narium*, *rostrum*, *pedes*, *remiges*, *rectrices*. Grisea sunt *rectrices inferiores caudae* (frons & *regio sub oculis in quibusdam*); pennis longiores capitis dum erigit cristata est. *Rectrices nigrae*, *aequales*, apice *flavae*, costa *rubicunda*. *rectrices caudae* *croceo-fuscæ*, vel supra *cinereæ*, subtus *ferrugineæ*. *Remiges nigrae*, quarum 1 2 3 4 apice anterius *albae*, 5 6 7 8 apice anterius *albo-flavescientes*. 10 11 12 13 14 15 16 apice anterius *albae*. 17 18 *immaculatae*, at 11 12 13 14 15 16 terminatae membranula oblonga *coccinea*. *Rectrices alarum nigrae*, quarum majores anteriores apicibus *albis*.

180. AMPELIS dorso griseo, macula ad oculos longitudinali.

Will. orn. 54. *Lanius tertius*.

Raj. av. 18. *Lanius minor rufus f. tertius aldr.*

Alb. orn. 2. *p.* 14. *t.* 14. *Lanarius tertius*.

Habitat in arboribus pratorum *Upsaliæ*, ova 6, alba versus extremitatem obtusiore circulo fusco-rufescente.

DESCR. *Rostrum conico-cultratum*, maxilla superiore longiore utrinque apice emarginata. *Caput & urropygium cana sunt*. *dorsum* griseo-*f. rufo-testaceum*. *Venter* a *gula* ad *sternum* finem ut & latera corporis e dilute rubicundo *alba*. *venter* pone *sternum* *albus*. Linea a fronte & basi *rostri* per *oculos* ad *aures nigrae* & supra hanc linea minor *alba*. *Remiges nigricantes* 3 4 5 6 7 8 basi levissime *albae*; hinc macula *alarum alba*. *Rectrices nigrae*, at a basi ad medium, ut & apicibus extimis omnes *albae*, exceptis intermediis quatuor omnino *nigris*. *Pedes nigri*. *Rostrum nigrum*. *rectrices narium nigrae*. faux *alba*. *Lingua bifida lacera*. ergo non *cenanthes f. Motacillæ* species. *Magnitudo Loxiaæ Pyrrhulæ*.

FÆMINA hujus diverso colore a mare gaudet & est.

Raj. av. 19. *n. 5.* *Lanius minor*.

Alb. orn. 2. *p.* 14. *t.* 15. *Lanarius tertius femina*.

DESCR. *Rostrum*, magnitudo & facies *præcedentis*, *imœ* & *locus*. *Caput griseum*. *dorsum* griseo-*testaceum* lineolis transversis *nigris*, in singula penna prope apicem singulis. *venter & pectus* ad *gulam usque albicans*, manifesta lutei mixtura, lineolis undulatis crebris. *Remiges nigricantes immaculatae*. *Rectrices griseæ* margine & apice *albae*, exceptis 4 intermediis unicoloribus; penna rectrices extimæ solitariae breviores ut in *præcedenti*. adeoque *MAS rectribus nigris basi apiceque albis* quatuor intermediis unicoloribus; *FEMINA rectribus cinereis margine apiceque albis*: intermediis quatuor *immaculatis*.

181. AMPELIS cæruleiscens, alis caudaque nigricantibus.

Will. orn. 53. *t.* 10. *Lanius cinereus major*.

Raj. av. 18. *n. 3.* *Lanius f. Collurio cinereus major*.

Alb. orn. 2. *p.* 12. *t.* 13. *Lanarius cinereus major*.

Aucupibus Warfogel.

Habi-

Habitat in Scania rarius. *D. Leche.* Hac ad Falcones indigitandos utuntur Falconarii.

DESCR. Magnitudo merulæ. *Caput & dorsum* cinereo-cærulescens. pallidior in pectore, abdome & collo subitus; thorax tamen parum undulatus. a rostro per oculos versus aures linea nigra. *cauda nigra; remigibus apice albis:* extimis remigibus brevioribus & albidiioribus.
Est hæc quasi in media inter Accipitres, Corvos & Passeres.

Sitta.

182. SITTA rectricibus fuscis: quatuor margine apice-que albis, quinta apice cana.

Gesn. av. 711. Picus cinereus f. Sitta.

Aldr. orn. l. 12. c. 38. Sitta.

Will. orn. 98. t. 23. Sitta f. Picus cinereus.

Raj. av. 47. n. 4. Sitta f. Picus cinereus.

Alb. orn. 2. p. 27. t. 28. Sitta f. Picus cinereus.

Suecis Nötwåcka, Nötpacka.

Habitat in tectis, parietibus truncisque arborum.

DESCR. *Rostrum* subulato-conicum crure æquale. *Lingua* lacero-emarginata. *Caput* cinereum linea atra latitudine rostri a naribus ad nucham longitudinaliter signatum. *Collum, dorsum, rectrices* alarum superiores & *urhopygium* cinerea. *Gula, pectus, abdomen* alba. *rectrices* inferiores rectricum & latera abdominis maculis ferrugineis & albis tintæ. *Remiges* 17 cinereæ, primæ 6 a basi ad quartam fere partem albae. *rectrices* subalares albido-cinereæ macula atra. *Cauda* integra. *Rectrices* 12, quarum quatuor extremæ sunt signatae macula alba apicem verticaliter ad dimidiam partem secans. duæ secundariæ fuscæ, apice solummodo canæ; duæ tamen mediæ totaliter canæ. *Rinman.*

Sturnus.

183. STURNUS rostro flavescente, corpore nigro punctis albis.

Gesn. av. 747. Sturnus.

Aldr. orn. l. 16. c. 19. Sturnus.

Bell. ic. 81. a. Sturnus.

Jonst. orn. t. 40. Sturnus. (mas)

Sturnus vulgaris. (fæmina)

Merr. pin. 177. Sturnus cinereus. (mas)

Sturnus vulgaris. (fæmina)

Will. orn. 144. t. 37. Sturnus.

Raj. av. 67. n. 1. Sturnus.

Alb. orn. 1. p. 38. t. 40. Sturnus.

Suecis Stare.

Habitat in cavis arborum, ubi nidificat. volitat **gregatim**; discedit post medium æstatem in Scaniæ **campestrem**. Species paucæ hujus generis Europeæ sunt, at in India utraque propemodum infinitæ.

DESCR. *Rostrum rectum, angulato-depressum, obtusiusculum, flavescens. Corpus nigrum, pennarum apicibus exalbidis. Nares squamula semi-tecta. Pedum unguis politicus major. Remiges nigricantes, margine exteriore obsolete teltaceo. Cauda integra. Reñtrices nigrae margine exteriore subfuscæ; Lingua bifida.*

Turdus.

184. **TURDUS** ater, rostro palpebrisque fulvis.

Bell. ic. 30. b. Merula nigra.

Gesn. av. 603. Merula.

Aldr. orn. l. 16. c. 6. Merula.

Ab. orn. 35. t. 37. Merula.

Will. orn. 140. t. 37. Merula vulgaris.

Raj. av. 65. n. 1. Merula vulgaris.

Suecic Trast, Kohltragst.

Habitat in sylvis densis, nec non in nemoribus juniperetis, imo &c in hortis neglectis.

DESCR. *Rostrum fulvum. margo palpebrarum fulvus. pedes nigro-fusci. color totius ater; sed remiges 24 fuscae.*

185. **TURDUS** nigricans, rostro flavescente, torque albo.

Gesn. av. 607. Merula torquata.

Aldr. orn. l. 16. c. 11. Merula torquata.

Fonst. orn. 106. t. 39. Merula torquata.

Will. orn. 143. t. 37. Merula torquata.

Raj. av. 65. n. 2. Merula torquata.

Ab. orn. l. p. 37. t. 39. Merula torquata.

Habitat in sylvis montanis.

DESCR. *Rostrum flavescentia apice nigro. color corporis niger. annulus albus collum cingit. Remiges 1 2 3 4 5 6 7 8 lineola alba a latere exteriore, ab domino, femora & urinopygium taguntur pennis albescente lineola cinctis.*

186. **TURDUS** nigricans, rostro flavescente, torque fusco.

Will. orn. 144. t. 38. Merula montana.

Raj. av. 65. n. 3. Merula saxatilis.

Habitat in montibus sylvaticis.

OBS.

OBS. Rajus dubitat an specie, vel an sexu tantum a precedente differat, licet torque albo careat.

187. TURDUS rectricibus rufis, duabus intermediis cinnereis fascia nigricante, proxima apice cinerea.

Will. orn. 145. t. 36. Merula faxatilis.

Raj. av. 63. n. 3. Merula faxatilis Sturni generis.

Alb. orn. 3. p. 51. t. 55. Merula faxatilis.

Suecic Lappskata, Olycksfogel.

Habitat in sylvis acerosis, praesertim Lapponiae sylvaticae, uti audacissima avis, quæ nobis prandentibus saepe coram cibum abripuit.

DESCR. *rostrum* nigrum, crassum, breve, subtrigonum. *nares* ovatae testae fetis. *Caput* fuscum. *dorsum* pallide cincereum plumis pinnatis, pennis rarioris nec contiguis. *Remiges* 18 fuscæ, basi testaceo-rufæ. *rectrices* anteriores testaceo-rufæ. *remiges* tres primæ per gradus breviores. *cauda* longitudo corporis integra testaceo-rubra exceptis intermediis duabus cinnereis fascia nigricante, proxima utrinque apice cinerea, huic proxima vix apice cinerea. *rectrices* caudæ testaceo-rufæ. *Latera* testacea. *Pedes* nigri, postico firmo. *ungues* omnes compressi, medio introrium marginati. *Apex rostri* utrinque emarginatus. *Lingua* emarginata, lobis bifidis.

188. TURDUS rectricibus nigris, extimis margine inferiore apice albicantibus, capite cano.

Gesn. av. 753. Turdus pilaris.

Aldr. orn. l. 16. c. 1. Turdus pilaris.

Will. orn. 138. t. 37. Turdus pilaris.

Raj. av. 64. n. 3. Turdus pilaris.

Alb. orn. 1. p. 34. t. 36. Turdus pilaris.

Charl. onom. 83. Turdus trichas.

Merr. pin. 76. Trichas.

Suecic Kramsfogel.

Habitat in sylvis, maximis in arboribus nidificat, edidit baccas juniperi; alebatur Holmiæ ab œnopolia, bibebat e vitro vinum cum hospitibus, capite calcvescebat; at dein per annum caveis inclusa, nec vino pota, plumas in capite recuperabat.

DESCR. *Magnitudo* Turdi primi. *Caput* superne ut & regio urhopygii cincta. *dorsum* & *rectrices* alarum fusco-ferruginea. *Remiges* & *rectrices* fuscæ. *Pectus* a gula ad sternum subferrugineum maculis nigris adspersum, quarum gulae propiores oblongæ minores, sterno vero propiores latiores. *Venter* albus, maculis fuscis paucis. *rostrum* modice convexum: *mandibula* superior vix inferiori longior, apice nigro utrinque emarginato: *maxilla* inferior maxima parte flava. *nares* ovatae. *Lingua* cartilaginea, sagittata, bifida.

bifida. Macula nigricans inter oculos & rostrum. *Cauda* bifurca. alarum tectrices subtus albæ. remiges nigricantes margine exteriore subcinereo. Rictices nigrae, extimo, laterali margine interiore apicem versus albicanter. Pedes nigricantes.

189. TURDUS alis subtus ferrugineis, linea supra oculos albicante.

Lift. apic. 128. *Turdus alter minor.*

Will. orn. 138. *t.* 37. *Turdus simpliciter dictus s. viscivorus minor.*

Raj. av. 64. *n.* 2. *Turdus viscivorus minor s. simpliciter dictus.*

Alb. orn. 1. *p.* 33. *t.* 35. *Turdus iliacus.*

Smolandis Klæra. Ostrogothia Klædra.

Habitat in sylvis acerosis, e quarum summo cacumine tempore veris egregie cantillat. nidificat in mediis arbusculis s. sepibus. Ova 6, cæruleo-viridia maculis nigris variis.

DESCR. *Corpus* supra terum cinereo-fuscum. Linea alba, a rostro supra oculos ducta, recta. *Pedus* pallido-flavescens maculis fuscis. *venter* albus paucis maculis. *cauda* obtusa vix forcipata, *nares* semitecta. *Lingua* apice bifido laero. *rostrum* nigrum basi flavescens. *Rictices* fuscæ immaculæ unicolores. *tectrices* inferiores cauda alba. *remiges* fulceæ, latere interiore versus basin rufescentes. *tectrices* alæ inferiores ferrugineæ.

Alauda.

190. ALAUDA ricticibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis.

Gesn. av. 78. *Alauda sine crista.*

Aldr. orn. 1. 18. *c.* 12. *Alauda non cristata.*

Will. orn. 149. *t.* 40. *Alauda vulgaris.*

Raj. av. 69. *n.* 1. *Alauda vulgaris.*

Alb. orn. 1. *p.* 39. *t.* 46. *Alauda vulgaris.*

Suecis Lärka,

Habitat in arvis continuo volatu;

Ecce suum tirile tirile, suum tirile tractat.

DESCR. *Rostrum* convexum, tenuer. *maxillæ* subæquales. *Lingua* sagittata, apice membranacea, acute bifida. *unguis* posticus digitum intermedium longitudinaliter superat, rectus; laterales unguies inflexi; intermedius satis magnus est. *Cauda* bifurca. *rictices* 12. *remiges* 18, quorum 4 anteriores subæquales. *Corpus* totum fusco-testaceum pennis fuscis margine extimo testaceo-pallido. *Abdomen* albicans. *remiges* fuscæ. *Rictices* nigrae, at extima (1) alba margine interiori fusco; proxima (2) fuscæ margine exte-

exteriore longitudinaliter albo. remiges primores integræ, secundariae e-marginate apicibus obsolete albanticibus. Rectrices uti remiges fuscæ, sed due utrinque longitudinaliter albae.

191. ALAUDA lineola superciliorum alba, rectricibus duabus extimis introrsum albis.

Aldr. orn. l. 18. c. 15. Alauda pratorum bellonii.

Will. orn. 150. Alauda pratorum aldr.

Raj. av. 69. n. 3. Alauda pratorum.

Habitat in pratis; arboribus etiam insidet.

DESCR. *Corpus supra*, ut & *caput*, *dorsum*, *rectrices* alarum, *pectus* scolopacina s. griseo fuso maculata. *Venae* albicans. *Lineola alba supra oculos*. *Remiges* fuscæ. *Pedes & rostrum* pallida, *unguis posticus longus*, *rectus*. *Rectrices æquales*, nigricantes, exceptis duabus utrinque (12) extimis margine interiore longitudinaliter albis.

192 ALAUDA rectricibus fuscis, prima oblique dimidiato-alba, secunda macula cuneiformi alba.

Will. orn. 149. Alauda arborea.

Raj. av. 69. n. 2. Alauda arborea.

Habitat in arboribus, volitat gregatim cantando.

DESCR. *Rostrum* supra nigrum. Tota avis supra cinerea fusco-maculata. *Remiges & rectrices* fuscæ. *collum* subtus flavescens maculis fuscis, *pectus* & *abdomen* albicanus. *Rectrices* fuscæ, sed i dimidiato alba sed oblique, at apex totus albus, quæ albedo angustior versus marginem exteriorem. *rectrix 2:da* apice alba macula cuneiformi. *calcar* longitudine digitæ.

193. ALAUDA gula pectoreque flavescente.

Will. orn. 150. Alauda minor campestris.

Raj. av. 70. n. 6. Alauda minor campestris.

DESCR. *Magnitudo & facies* Passeris Ligurini dicti. *Corpus supra*, *caput*, *dorsum* grisea maculis nigris s. fuscis more scolopacum. *Gula pectusque* flavescunt. *Linea flavescens* supra oculos versus occiput à rostro ducta. *abdomen* albicans. *rectrices alarum* nigro-fuscæ albo maculatae. *remiges fuscæ*. *rectrices æquales*, fuscæ, a basi ad medium omnes albæ, exceptis duabus intermediis. *unguis posticus* intermedio paulo longior. *rostrum* & *pedes* nigrae.

194. ALAUDA remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis.

a Mart. spitzb. 53. t. K. f. B. Avis nivalis.

Acad. stockb. 1740. p. 368. t. 1. f. 9. Alauda remigibus albis, primoribus extrorsum nigris; rectricibus nigris, lateralibus tribus albis.

Act. upf. 1736. p. 11. n. 16. Passer alpino - Lapponicus s. nivalis.

Alb. orn. 2. p. 50. t. 54. Pied Chaffinch.

Suecic Snösparf. *Lapponibus Alaipg.* *Dalekarlis Ill-wärfsfogel.*

Habitat in alpibus Lapponicis æstate, descendit ad nos interdum hyeme. Caro sapidissima. Cursitat, nec arboribus insidet.

DESCR. *Caput, pectus, collum* alba vel albo-testacea. *corpus* subtus album vel albicans. *dorsum* nigrum. variat sexu & anni tempore ex albo in testaceum colorem. nigredo constans est. *alaæ complicatae* alba apicibus versus terram nigra, nec non macula nigra ad flexuram.

Remiges 1 - 8 verius basin albae, verius apicem nigrae, quo magis introrsum, eo minus nigrae.

9 - 15 totaliter albae; 16 tota nigra apice alba vel testacea.

Rectrices 1 2 3 10 11 12 albae, macula linearis nigra versus apicem rachis: 4 9 longitudinaliter latere exteriori albae, interiori nigrae.
5 6 7 8 nigrae.

OBS. Rostro cum Fringillis convenient; pollicis unguë longiore & quod per terram cursitat ad alaudas proprius accedit.

3 *Alb. orn. 3. p. 67. t. 71.* Fringilla montana.

Gesn. av. 798. Avis ignota a Piperino missa.

Aldr. orn. l. 8. c. 357. t. 15. f. 1. Fringilla albicans.

Will. orn. 187. t. 77. Montifringilla calcaribus alaudæ s. major.

Raj. av. 88. Montifringilla calcaribus alaudæ s. major.

Scantis Siôlárcka.

Habitat in campestribus Scaniae littoribus.

OBS. Præcedenti simillima est, sed minor & magis testacei coloris, uti præcedens æstate. *Locus* dein differt; hinc propono aliis eandem ulterius examinandum. forte præcedentis sola varietas. Hanc eandem cum præcedenti speciem esse statuit *J. Leche.*

Fringilla.

195. FRINGILLA remigibus antrorsum luteis: extima immaculata; rectricibus duabus extimis toto reliquisque apice albis.

Gesn. av. 242. Carduelis.

Aldr. orn. l. 18. c. 3. Carduelis.

Fonst. orn. 97. t. 37. Carduelis.

Will. orn. 189. t. 46. Carduelis.

Raj. av. 89. n. 1. Carduelis.

Merian. europ. t. 173. Carduelis.

Alb. orn. 1. p. 61. t. 64. Carduelis.

Sue-

Suecis Stiglitzia.

Habitat in juniperetis.

DESCR. *Rostrum* albicans apice nigro. *Caput* iuxta rostrum sanguineum, vertex niger; tempora testacea. *alæ* nigrae, apicibus albis, macula magna flava deflexa in medio alæ. *Remiges* nigrae, quarum 1 tota nigra; 2-10 nigrae antrorsum luteæ, 11-13 antrorsum albæ. *Rectrices* nigrae, quarum extima utrinque medio albæ reliqua apice albæ.

196. FRINGILLA capite nigricante maculato, macula alba pone oculos.

Alb. orn. 3. p. 59. t. 63.

Rudb. piæt. Carduelis Lapponica.

Habitat Tornoæ.

DESCR. *Rostrum* luteum apice nigro. *Caput* nigrum. linea alba pone oculos orta, descendit incurvata ad collum; *collum* a tergo rufescens. *dorsum*, *alæ*, *cauda* cinerea cum testacei tintura. *Pectus* albidum macula longitudinali nigra. *Cauda* bifida.

197. FRINGILLA fusca, pectore alarumque basi ruffis, alis nigris macula ruffa.

Rudb. piæt. Carduelis Lulensis.

Habitat Luloæ in Westrobotnia.

DESCR. *Caput* cinereo-nigrum, ut & *dorsum* & *cauda*. *mentum* macula alba. *venter* albicans. *Pectus* rufum. *alarum* basis rufa, quam macula nigra transversa, dein rufa, tum iterum nigra, demum alba excipit. *Remiges* nigrescunt. *Rostrum* fuscum.

198. FRINGILLA alarum basi subtus flavissima.

Rudb. piæt. Carduelis angermannica.

Foñst. orn. 99. t. 38. Montifringilla mas.

Will. orn. 187. t. 45. f. 5. Fringilla montana f. Montifringilla.

Raj. av. 88. Fringilla montana.

Alb. orn. 3. p. 60. t. 64. Montifringilla.

Suecis Norrquint.

Habitat in sylvis acerosis præsertim *Norlandiae*.

DESCR. *MAS* supra niger marginibus pennarum obsolete ferruginea. *Abdomen* album. *Pectus* fulvo-ferrugineum seu aurantium ut & *alarum* basis extus. *alarum* basis vero subtus saturallissime flava est. Sub ano obsolete ferruginea. *Remiges* nigrae margine exteriore albido; 4 & insequentes, versus basin, exteriore latere, dimidiato albæ. *Rectrices* nigrae, sed 1 & 1 margine exteriore, præsertim basin versus, albæ. *digitus posticus* intermedio vix longior.

FÆMINA fusca ubi ille canus. illa cinerea ubi ille rufus. sub alæ basi etiam illa lâte flavicat. illa pone anum obsolete ferruginea. *Rectrices* & *Remiges* uti in mare.

199. FRINGILLA artubus nigris; remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis; rectricibus duabus oblique albis.

Gesn. av. 387. Fringilla.

Aldr. orn. l. 13. c. 6. Fringilla.

• *Will. orn. 186. t. 45. f. 4. Fringilla.*

Raj. av. 88. Fringilla.

Alb. orn. 1. p. 60. t. 63. Fringilla.

Suecic Fincke, Bofinck.

Habitat ubique per Sueciam, nidificans in arbusculis. Fæmina migrat per hyemes, mas permanet. *J. Leche.*

DESCR. maculis purpureis a precedentibus differt hæc species. *MAS* pectore rubicundo a fæmia differt.

Rostrum plumbeum. *Caput* canum. *dorsi* posterior pars cinereo-viridis, anterior vero grisea; at regio oculorum, *gula*, *pectus*, latera ferruginea sunt. *Collum* eadem rubidine cingitur. *ala* nigræ macula triplici alba, alia ciliata ad flexuram alicet, alia in medio et rectricibus, tertia sub hac in remigibus minima.

Teetrices alarum nigræ apicibus albis; sunt etiam ad basin albæ.

Remiges omnes nigricantes: latere interiore, præfertim versus basin, albæ; omnes, tribus primis exceptis, versus basin in latere exteriore alba macula notatae. secundariae remiges etiam margine exteriore linea alba aut flavescente supra medium exaratæ.

Teetrices fere æquales nigrae; harum exteriore 2 macula obliqua alba in penna extima majore: par intermedium rectricum cinereum est.

FÆMINA, nisi fallor, est sequens: *Rostrum* plumbeum. *Corpus* totum supra cinereo-virescens, subtus albicans. *Remiges* nigricantes; omnes (exceptis tribus primis) basi utrinque albæ & margine interiore albescentes. *Cauda* forcipata. *Teetrices* nigricantes, intermedio pari virescente, sed extimus 1 2 versus apicem macula obliqua cuneiformi alba, quarum exterior major.

200. FRINGILLA artubus, remigibus, rectricibusque nigris: duabus utrinque extimis a medio extrosum albis.

Habitat in arboribus.

DESCR. *Rostrum* fuscum. *Caput* cinereum, temporibus subbrunneis. *Cauda* nigra, rectricibus duabus utrinque extimis a medio extrosum albis. *alarum* basis alba, dein teetrices nigræ, iterum albæ. *Remiges* nigræ. *Dorsum* brunneo-cinereum. *urhopygium* viride. *venter* brunneo-carneus. unguis posticus reliquis paulo longior.

201. FRINGILLA fusca, crista flammea. *Rudb. pict.*
Habitat in Norlandia.

202. FRINGILLA remigibus primoribus antice luteis; rectricibus tribus lateralibus basi luteis. *Gesn.*

Gesn. av. 259. Chloris.

Will. orn. 129. t. 44. Chloris.

Raj. av. 85. n. 4. Chloris.

Alb. orn. 1. p. 56. t. 58. Chloris.

Suecic Svenſka.

Habitat in ſepibus. ova ſex maculis ſanguineis adſperfa.

DESCR. *Roſtrum concucinum.* *Lingua* integra, carnoſa. *Corpus cinereo-testaceum*, ſubrus magis luteum, at maris aestate viride, abdomen flavo, alae & cauda nigra. *Remiges primores* 7 antice luteæ, magis verſus inferiorem pennarum partem, pone omnes albicantes. *Rectrices utrinque 1 2 3* a medio basin verſus luteæ, apice in versuſ nigricantes, at 4 5 6 nigricantes marginę exteriore flavescente. *nas pectore* flavo.

203. FRINGILLA remigibus medio luteis: primis quatuor immaculatis; rectricibus duabus extimis, reliquaque apice, albis.

Gesn. av. 1. Achantus avicula.

Aldr. orn. 353. t. 14. f. 28. Spinus f. Ligurinus.

Foſſt. orn. t. 37. Ligurinus spinus.

Cbarl. 79. Spinus f. Ligurinus.

Will. orn. 192. t. 46. Spinus f. Ligurinus.

Raj. av. 91. n. 1. Spinus f. Ligurinus.

Alb. orn. 3. p. 71. t. 76. Ligurinus.

Suecic Sifka, Grönſifka.

Habitat in juniperetis.

DESCR. *Corpus* ſupra cinereo-luteum, ita ut omnis penna interitus cinerea, exterius lutea macula nigricante. *Corpus* ſubtus cinereo-album macula in ſingula penna nigricante. *gula* albo flavicat. *remiges nigrae* circa basin anterius flave, posterius albidae; hinc lutea macula in ala, at primæ pennæ quatuor totæ nigrae. *Rectrices* luteæ apicibus nigris, sed ſingulae utrinque extimæ & due intermediae totæ nigrae.

204. FRINGILLA fulva, roſtro flavicante. *Rudb. piæt.*

Suecic Riska.

DESCR. *Corpus* cinereo-nigrum, anterius tamen dilutius fulvum. *Pedes atri.* alæ nigrae. *Canda bifaria.*

205. FRINGILLA rectricibus nigricantibus, extimis duabus laterè interiore alba acuminata macula.

Bellon. av. Hortulanus.

Aldr. orn. Luteæ alterum genus.

Turn. biſt. Chloris f. Lutea aristotelis.

Gesn. av. 653. Emberiza flava.

Merr.

- Merr. pin.* 176. Citrinella.
Will. orn. 196. t. 40. Emberiza flava.
Raj. av. 93. n. 2. Emberiza flava.
Alb. orn. 1. p. 63. t. 66. Emberiza flava.
Suecic Grönning. Smolandis Golspinck.
 Habitat ubique apud nos, nidificat in pratis humi.
 DESCR. *Corpus* griseo-flavum. *Caput* flavum. *rectrices* nigricantes, quarum
 duas laterales utrinque apicibus introrsum albis. *urhypygium* ferrugineum.
Corpus subtus flavum. *maxilla* superior nigra, inferior pallida.

206. FRINGILLA grisea nigro maculata.

- Gesn. av.* Emberiza alba.
Aldr. orn. Alaudæ congregæ.
Raj. av. 93. n. 1. Emberiza alba.
Will. orn. 195. t. 40. Emberiza alba.

Alb. orn. 2. p. 46. t. 50. Emberiza alba.
Suecic Kornlärcka.

Habitat in agris & cultis Scaniæ. *D. Leche.*

DESCR. *Rostrum* præcedentis, sed majus. *dorsum* ferrugineum nigro ma-
 culatum, maculis acutis. *Remiges* nigricantes margine exteriore albescen-
 te. *Rectrices* nigro-fusce marginé albescente. *Collum* & *pectus* albescientia
 maculis linearibus nigris.

**207. FRINGILLA rostro corporeque albicante, rectri-
 cibus remigibusque virescentibus.**

- Gesn. av.* 240. Canaria.
Jonft. orn. t. 36. Passer canariensis.
Will. orn. 192. t. 46. Passer canariensis.
Raj. av. 91. n. 6. Passer canariensis.
Alb. orn. 1. p. 62. t. 65. Passer canariensis.
Suecic Canarie - fogel.

Habitat in Canariis s. Fortunatis insulis; in caveis
 culta, apud nos prosapie peregrina avis, vicitans
 phalaridis & cannabis seminibus.

**208. FRINGILLA remigibus nigris: primis tribus mar-
 gine albidis; rectricibus nigris: lateralibus dua-
 bus extrorsum albis.**

- Gesn. av.* 567. Hortulana.
Jonft. orn. t. 37. Hortulanus.
Will. orn. 197. t. 40. Hortulanus.

Rai.

Raj. av. 94. n. 6. Hortulanus.

Habitat in Suecia, transmigrans mense martio.

DESCR. *Corpus ex nigro & testaceo variegatum. annulus pallidus oculos ambit. collum virescens. venter testaceus. Gula flava. Pectus pallidum. Remiges 16 nigrae, tribus primis margine albidis. Re|et
| |
rices 12 nigrae: duabus utrinque extrosum albis.*

**209. FRINGILLA remigibus nigris: primoribus margine utroque albis; re|et
| |
ricibus nigris utroque margine albis.**

Will. orn. 191. t. 46. Linaria rubra major.

Raj. av. 90. n. 2. Linaria rubra major.

Alb. orn. 3. p. 68. t. 72. 73. Linaria rubra major.

Suecis Hämpling.

Habitat in sylvarum nemoribus.

DESCR. *Caput cinereum. Dorsum griseum. Corpus subtrus pallidum, Pectus & vertex (in mare) sanguinolenta. Remiges nigrae, primores 1-9 margine utroque albæ; secundariæ vero anteriore marginè fuscæ apice albidæ. Canula bifurca. Femina caret macula sanguinea verticis & capitis. Re|et
| |
rices nigrae utroque marginè albæ, exceptis 6 6 marginè fuscis.*

**210. FRINGILLA remigibus re|et
| |
ricibusque fuscis margine obsolete pallido, litura alarum albida.**

Gesn. av. 591. Linaria rubra.

Aldr. orn. 1. 18. c. 9. Linaria rubra.

Will. orn. 191. Linaria rubra minor.

Raj. av. 91. n. 3. Linaria rubra minor.

Charl. onom. 80. Linaria rubra.

Alb. orn. 3. p. 70. t. 75. Linaria rubra minor.

Suecis Gräfiska.

Habitat in alnetis.

DESCR. *MAS pector & vertice sanguineo a Femina differt. Corpus fuscum alboque obsoleto cinereum. frons coccinea nitens. Re|et
| |
rices fuscæ margine obsolete pallido. Remiges fuscæ exteriori marginè obsolete pallido: tegetes litutam transversalem alarum albicanem efficiunt.*

211. FRINGILLA capite nigro, maxillis rufis, torque albo, corpore ruffo-nigricante.

Gesn. av. 652. Passer aquaticus f. Schœniclos.

Aldr. orn. 529. Junco f. Passer arundinaceus.

Will. orn. 196. Passer torquatus in arundinetis nidificans.

Raj. av. 93. n. 3. Passer torquatus in arundinetis nidificans.

Suecis Säffsparf.

Habitat in arundinetis.

DESCR. *Rostrum* nigrum. *Color supra caput, oculos & aures, inque gula & pectore* niger. *Latera capitis & circum nigredinem capitum* albus color; *nucha pallide cinerea;* in *dorso & supra colum* nigro maculata est. *Remiges nigrae* marginé exteriore ferrugineo. *Rectrices nigrae,* quarum 6 6 marginé cinereo; sed 1 1 latere exteriore toto, & interiore dimidio alba; 2 2 apice lateris interioris alba est. *urhopygium* cinereum. *abdomen* album.

212. FRINGILLA remigibus rectricibusque fuscis; gu-
la nigra; temporibus ferrugineis.

Gesn. av. 643. Passer.

Will. orn. 182. t. 44. Passer domesticus.

Raj. av. 86. Passer domesticus Struthos.

Alb. orn. 1. p. 59. t. 62. Passer domesticus.

Suecis Tätting, Grasparf. Smolandis Spinck.

Habitat in hortis & juxta domos.

DESCR. *Dorsum testaceo-fordidum.* *Caput supra canum.* *Gula nigra, ven-*
ter albicans, Remiges fuscae. *Cauda bifurca.* *mas ad aures brunneus?* *fæ-*
mina ibidem incana.

Varietas huius est forte PASSER MONTANUS ALDR. cui

DESCR. *Caput spadicum.* *dorsum pallido nigroque varium,* *urhopygium*
viridi-cinereum. *Gula nigra.* *Pectus & abdomen albantia.* *Remiges fuscae,*
marginé exteriore lutescentes, *subæquales.* *Rectrices caudæ integræ fu-*
scæ. *teætrices alarum duplice ordine remigibus concolores,* *apicibus ma-*
xima ex parte albidis. *pedes pallidi.*

Certhia.

213. CERTHIA

Gesn. av. 251. Certhia.

Aldr. orn. 1. 12. c. 44. Certhia.

Fonst. orn. t. 42. Certhia.

Will. orn. 100. t. 23. Certhia.

Raj. av. 47. n. 5. Certhia.

Alb. orn. 3. p. 24. t. 25. Certhia.

Bell. ic. 98. a. Certhias, Certhius, Reptatrix.

Suecis Krypare.

Habitat in arborum truncis.

DESCR. *Rostrum* tenuæ, arcuatæ, compressum. *Corpus,* dorsum, cauda supra grisea; maculis nigricantibus albidisque, subtus albicans. *Cauda* longa, rigida, angusta, cuneiformis, rectricibus acutis, cinereo-fuscis. *exteriori* marginé pallidiori. *urhopygium* flavescens. *unguis posticus* longicudine digiti & longissimus. *Remiges fuscae* 4-14. *macula* in media transversa albida. *Remiges* 23 fessim breviores. *Lingua* cartilaginea, acuminata, arcuata. *Nares* semitecta absq[ue] vibrizis.

Motacilla.

214. MOTACILLA pectoris nigro.

Bell. ic. 88, b. Motacilla, Culicilega, Susurada.

Gesn. av. 618. *Motacilla*, quam noſtri *albam* cognoscimus.

Zool. orn. 120. t. 43. Motacilla alba. (minant.)

Anon. angl. 127. Water wagtail.

Will. orn. 171, t. 42. *Motacilla alba*.

Rai av. 75, n. I. Motacilla alba.

Alb. orn. L. p. 47; t. 47. *Motacilla alba*.

Alb. orn. I. p. 47. t. 47. *Motacilla alba*.
Suecias Årla, *Sådesårla*, *Sudermannis Isspiärna*. *Ostro-
botniensishus Wåsträckja*.

Habitat ubique; ova 6 alba maculis fuscis confertis.

Habitat ubique. ova 6 alba inacutis rureis concisis.
DESCR. Caput nigrum a vertice ad nucham. Frons, latera capitis, gula
alba. Collium subrufus a gula ad sternum macula magna nigra tegitur. Dor-
sum cinctum. Pectus & venter albida cum cinerei mixtura. Alæ fuscæ, qua-
rum 1-5 longiores integræ, at 6-14 fere æquales obtuse emarginatae. 15
que longior & 16 margine anteriore albæ. Rectrices æquales fuscæ; 1 2
dimidiato albæ oblique versus apicem; 3 4 5 fuscæ immaculatae; 6 angusti-
or acutior (margine exteriore longitudinaliter albo in quibusdam.) 7 bie
& pedes nigri, ungue postico maximo. Rostrum tenue, nigrum; in xii lis
subæqualibus, superiore utrinque emarginata. nares oblonge nudæ. Lin-
gua sagittata membranacea apice plurimis fetulis lacero.

215. MOTACILLA pectore abdomineque flavo; rectricibus duabus exterioribus dimidiato oblique albis.

Gesn. av. 618. Motacilla flava.

Aldr. orn. l. 17, c. 24. Motacilla flava.

Will. orn. 172, t. 68. Motacilla flava.

Rai av. 75, n. 2. Motacilla flava.

Merr. pin. 178. Motacilla flava, rostro longiusculo
nigricante.

Alb. orn. z. v. ♂4, t. 58, f. 1, 2. Motacilla flava.

No. 6n. 2. p. 14. 2.)
Sudermannis Sådesårla.

Habitat passim apud nos in sepibus. nidificat inter segetes; ova 5 maculis & lineolis fuscis.

Gula, pectus, abdomen a rostro ad caudam subtus saturate flava.
Caput supra canum cum viridi mixtura. urrhopygium viride. linea alba a
rostro per oculos ducta. alæ fuscæ. Remiges 1 - 5 longiores, acutiores, sen-
sim breviores; 6-14 æquales, obtusaæ, breviores, emarginataæ, at 15 simi-
lis magnitudine & figura 5:ta, sed 16 longitudine 1:mae margine anteri-
ore alba. Rectrices æquales fusco-nigricantes, quarum 1-2 dimidiato ob-
lique versu apicem albæ; sed 3 vix apicee antrorsum albicans; reliqua 4
5 6 immaculatae nigro-fuscæ. Rostrum subulatum nigrum. Lingua in qua-
tuot vel quinque seras divisa, acuminata. Pedes fuscæ, ungue postico re-
liquis omnibus duplo longiore.

216. MOTACILLA pectore albo, corpore nigro.

Gesn. av. 609. Merula aquatica s. Miliaria.

Fonst. orn. t. 53. Merula aquatica.

Will. orn. 104. t. 24. Merula aquatica.

Raj. av. 66. n. 7. Merula aquatica.

Alb. orn. 2. p. 36. t. 39. Merula aquatica.

Suecis Watnflare.

Habitat apud nos per integrum annum, hyeme ad voragines fluviorum & cataractas degens, ubi flu- enta descendit, infectis vicitans, adscenditque dexteritate summa licet fissipes.

DESCR. *Corpus nigrum: Caput & collum picea: reliquum corpus ni- grum: a tergo pallido undulatum, singula enim penna infra apicem ni- grum exalbida est. a rostro ad sternum avis nivea. Remiges nigrae apice vix manifeste albæ. Rectrices æquales, breves. Tibiaæ antice albidæ. Rostrum nigrum. Cauda bifurca. nares nudæ, squamula testæ.*

217. MOTACILLA dorso cano, fronte alba, oculorum regionibus nigris.

Will. orn. 168. t. 41. f. 4. Oenanthe s. Vitiflora?

Fonst. av. 123. t. 45. f. 13. Oenanthe aristoteli & plinio.

Raj. av. 75. n. 1. Oenanthe s. Vitiflora.

Alb. orn. 1. p. 53. t. 57. Oenanthe.

Suecis Stenfiquetta.

(scis rariss.)

Habitat inter lapides. ova 6 cærulescentia punctis fu- DESCR. magnitudo Fringillæ Chlorei; os, vibrixa, pedes, ungues, fau- nigra. Cinerea s. cana sunt caput, dorsum, versus urrhopygium tamen vi- rescens. abdomen album. Frons albicat. a rostro per oculos ad aures linea lata nigra; supra oculos (in mare) macula alba. Gula & collum subtus albo levissime flavescens. Remiges omnes fuscæ, immaculatae. Rectrices a medio apicem versus fuscæ, basin versus albæ; albedo tamen nigredine longior; at rectrices 6, 7 (intermediæ) longiore nigredine quam albedine gaudent. urrhopygium utrinque album.

vidimus hujus varietatem alis atris, remigibus secundariis apice albis.

218. MOTACILLA nigricans, superciliis albis, macula alarum alba, gula flavescente.

Aldr. orn. 735. Muscicapa tertia.

Bellon. av. . . . Rubetra.

Raj. av. 76. n. 4. Oenanthe nostra tertia.

Will. orn. 169. t. 41. f. 5. Muscicapa nostra tertia.

DESCR. *Rostrum nigrum. Caput fuscum; linea a naribus per oculos alba, sub qua nigra fascia. gula alba. Collum & Pectus subtus dilute ferruginea. abdomen album. Dorsum & urrhopygium constat pennis fuscis marginæ gri- feis. in aliis macula magna alba extrorsum nigra. remiges fuscæ; primores*

1-8 margine postico & basi albæ. *Rectrices* fuscæ a medio basin versus albae, exceptis duabus intermediis omnino fuscis. magnitudo Passeris domestici. *rectrix* extima exteriore margine fere usque ad apicem alba est.
OBS. Raj. av. 76. *Oenanthe secunda nostra* s. *Rubecola* vix ab hac specie differt.

219. MOTACILLA pectore abdomineque pallido, rectricibus extrorsum albis, dorso undulato.

Alb. orn. 3. p. 50. t. 54. Femina *œnanthes* s. *vitifloræ*.
Habitat in sylvis apricis.

DESCR. *Caput & collum* cinereum maculis parvis pallidis adspersum. *Dorsum* cinereo-griseum nigro undulatum. *pectus & abdomen* pallida. alæ clausæ ferruginea maxima ex parte sunt. *Remiges primariae* nigrae apicibus obsolete ferrugineis; *secundariae* margine anteriore & apice ferruginea. *Rectrices* a medio apicem versus nigrae, ipsis apicibus obsoletæ ferrugineis; harum remigum par intermedium magis nigrum quam album. *Pedes & rostrum* nigra. an specie diversa ab *œnanthe* 217?

220. MOTACILLA pectore cæruleo macula flavescente albedine cincta.

Rudb. piæt. Avis Carolina mas.

Gesn. av. 796. Wegflecklin.

Aldr. orn. 749. Phoenicuro similis ornithologo.

Will. orn. 160. Rutilus 3. Wegflecklin.

Raj. av. 78. Rutilus wegflecklin.

β *Gesn. av. 796.* Wydengyckerlin.

Rudb. piæt. Avis Carolina fæmina.

Habitat Tornoæ & alibi in Westrobotnia & Lapponia in salicetis & alnetis.

DESCR. MAS. Magnitudo Fringillæ Ligurini. *Caput, dorsum, Cauda* cinerea. macula ad canthum oculi majorem alba parva. a rostro ad sternum usque macula cærulea ovata, extremitate angustiore gulam respiciente: margo macula hujus undique undulatus est; ad sterni initium terminatur macula luteo-fusca; in macula medio macula rotunda, luteo-fusca, albo cincta. *venter & pectus* albican, sub ano lutescit. *pedes* cinerei.

FÆMINA antecedenti mari similis, sed dilutior, infuper macula non ad canthum oculi, sed loco superciliorum oblonga. a gula ad sternum cinerea, sed in hujus medio alba macula; infra hanc ad sternum velut fusco cinereo nebulosa.

221. MOTACILLA ruffo - cinerea, genuum annulis cineris.

Gesn. av. 592. Luscinia.

Aldr. orn. 1. 18. c. 2. Luscinia.

Jonst. orn. t. 45. Luscinia.

Will. orn. 161. t. 41. Luscinia s. *Philomela*.

Raj. av. 78. n. 2. Luscinia s. *Philomela*.

Alb. orn. 3. p. 49. t. 53. Luscinia.

Suecic Näcktergahl.

Habitat in nemoribus Ölandiæ, Gotlandiæ, Scaniæ,
Swartfjölandet, Fullerön, Upsaliæ, Sigtunæ & alibi.

Tanta vox? tam parvo in corpore? tantus spiritus?

Spiritu prius deficiente quam cantu, *Plin.*

DESCR. *Color* supra testaceo-fuscus, qui color magis rufescit in alis, ad-
huc magis in cauda. *Gula, pectus, abdomen* cinerea. *Cauda* subtus albicans.
Femora alba; *genua* quasi annulis cinereis cincta.

OBS. *LUSCINIA MINOR*. *Aldr. orn. 754.* *Jonst. orn. t. 45.* inter Sue-
cicas aves a Rudbeckio delineatas reperitur, quam non dum observavi.

222. MOTACILLA testaceo-fusca, subtus pallide testa-
cea, capite maculato.

Schænobænus. D. Leche.

Habitat inter Scirpos Scaniæ.

DESCR. Magnirudo Reguli. *Iris* nigro-fusca. *Pedes* subfuscæ. *digitus* in-
terior intermedio adnexus. *Tibiae* 17 incisuris. *Cauda* integra. *Color dorsi,*
Capitis, urrhopygii testaceo-fuscus, sed maculatus in dorso & præsertim ca-
pite. *Gula, abdomen, Femora, Cauda* subtus pallide testacea. *Cauda* fusca.
Alæ fusca margine exteriore testacea.

223. MOTACILLA supra griseofusca, tectricibus ala-
rum apice albis; pectore cæruleo-fulvo-cinereo.

Suecic Järnsparf.

Habitat in arundinetis, præsertim Septembri obvius;
in caveis egregie cantillat tempore vernali & cur-
rit admodum agilis vicitans seminibus cannabinis.

DESCR. *Caput & Dorsum* maculis nigricantibus acutis adspersa, quarum
macule minores & confertiores in capite & collo, quam dorso. *oculi* pur-
purascentes. in *gula & pectore* supta oculos & aures color cæruleo-cinereus.
Remiges fuscae latere exteriore ferrugineæ; in secundariis macula ob-
longa albicans ad lateris exterioris apice in. *Rectrices* fuscae margine testa-
ceo. *urrhopygium* testaceo-cinereum. *Color* sub cauda albus maculis a-
cutis fuscis.

224. MOTACILLA gula nigra, abdomine rufo, capite
dorsoque cano.

Raj. av. 78. n. 5. Ruticilla.

Will. orn. 159. Ruticilla, Phænicurus Græc.

Alb. orn. 1. p. 48. t. 50. Ruticilla.

Suecic Rödtjtjert.

Habitat in arboribus frondiferis, nidificans in cavis
arborum & parietum, egregie cantillans.

DESCR. *Pectus, urrhopygium, Cauda* rufa. *Caput, collum, dorsum* cinerea.
frons

frons alba. Gula & maxillæ sub oculis nigra. Rertrices duæ intermediae fuscae. Fauina capite & collo cinerea, pectore magis pallida. abdomen album, remiges fuscae.

225. MOTACILLA remigibus cinereis; rectricibus rubris, intermediis duabus cinereis.

Habitat in pratorum arboribus. ova 9 viridi-cærulea.
DESCR. Caput supra canum. Dorsum, Alæ, Remiges cinereæ. Gula, thorax, abdomen, urhypygium, retriæ rufa s. ferruginea. Rectrices duæ intermediae cinereæ margine medio exteriore parum rufescentes. Pedes nigri. macula nulla sub gula aut in sincipite; nec supercilia alba, an praecedentis fæmina?

226. MOTACILLA grisea, gula pectoreque fulvis.

Alb. orn. I. p. 49. t. 51. Rubeculus.

Will. orn. 160. t. 38. Rubecula s. Erithacus.

Raj. av. 78. n. 3. Rubecula s. Erithacus.

Suecis Rotgel.

Habitat in arboribus frondiferis ad paludes, optime cantillans.

DESCR. A rostro ad sternum luteo-rufa: Dorsum, Alæ & Cauda grisea: venter albicans. unguis posticus longior. Remiges & Reæ cinereo-fuscae. rectrices (remigum posteriorum) sex apice maculis ferrugineis. Cauda æqualis. Rostrum & Pedes fusci.

227. MOTACILLA cinerea; remigibus nigricantibus; rectricibus rufis: intermedio pari nigro extrorsum rufescente.

Habitat in arboribus foliosis.

DESCR. Pectus minime rufum: gula cum capite concolor. Cauda rufa. Corpus supra cinereum cum capite, collo, dorso. Pectus ad latera subluteum. abdomen albicans. Remiges nigricantes. Reæ æquales, ferrugineo-rufæ, excepto pari intermedio nigricante, latere exteriore rufo. Pedes & rostrum nigra.

228. MOTACILLA supra cinerea, infra alba; rectrice prima longitudinaliter dimidiato-alba, secunda apice alba.

Suecis Skogsknætter, Mefar.

Habitat in sylvis & nemoribus.

DESCR. Caput, collum, dorsum, alæ, urhypygium, canda (verbo tota avis supra) cinerea. Gula, collum, abdomen, pectus, canda subtus (i. e. tota avis subtus) alba. Remiges cinereo-fuscae. Reæ cinereo-fuscae, sed extrema dimidiato-alba secundum totam longitudinalinem a latere exteriore. Reæ secunda apice alba, reliquæ immaculatæ. vix Regulo 236 major.

229. MOTACILLA testacea, subtus subcinerea, pileo obscuro.

Aldr. orn. l. 17. t. 36. Atricapilla s. Ficedula.

Jonst. av. t. 45. Atricapilla s. Ficedula.

Will. orn. 162. t. 41. Atricapilla s. Ficedula.

Raj. av. 79. n. 8. Atricapilla s. Ficedula.

Habitat præsertim in Scania.

DESCR. *MAS* vertice nigricat; *dorsum* testaceum. *subtus* cinereus.

FÆMINA vertice luteo rufescit; corpore totq; etiam luteo rufescit; *subtus* dilute albicat.

230. MOTACILLA remigibus nigricantibus : extimo dimidiato extrorsum albo ; macula alarum alba.

Jonst. av. t. 45. f. ult. Ficedula s. Atricapilla alia.

Habitat in Scaniæ fageti. *D. Leche.*

MAS a fæmina colore differt, marem depingit Jonstonus.

MAS supra capite, dorso, alis, cauda, rostro, pedibus niger. Infra gula, collum, thorax, abdomen alba. macula magna in medio alarum alba ex remige ultimo & duabus rectricibus exteriore latere albis. Supra rostrum macula parva alba. rectrix extimas latere exteriore albo.

FÆMINA fusco-grisea est ubi mas niger ; pectus antice subgriseum. macula nulla frontis.

231. MOTACILLA subfuscata, subtus alba, pectore cinerreo maculata.

Will. orn. 163. Ficedula quarta.

Raj. av. 81. n. 12. Ficedula.

List. apic. 125. Ficedula.

Charl. onom. 81. t. 81. Ficedula.

Alb. orn. 3. p. 25. t. 26. Ficedula cannabina.

Habitat in hortis & cultis rarius.

DESCR. Color supra totus e fusco castaneus. subtus alba aut albo-cinereascens.

232. MOTACILLA grisea, alis nigro cinereoque undulatis.

Gesn. av. 651. Passer troglodytes.

Aldr. orn. l. 17. c. 4. Passer troglodytes Bellonii.

Will. orn. 164. t. 42. Passer troglodytes.

Raj. av. 80. Passer troglodytes.

Habitat rario apud nos ; nidificat in terra & sepiibus.

DESCR. Avis supra castanei coloris; subtus pallidior. *abdomen* lineolis transversis fuscis undulatum, *Cauda* integra, *alæ* cinereo-nigricantes nigro undulatae.

233. MOTACILLA supra fusca, subtus exalbida; macula pone oculos grisea.

Gesn. av. 370. Curruga.

Jonst. av. Hippolais s. Curruga.

Aldr. orn. l. 17. c. 34. Hippolais s. Curruga.

Will. orn. 157. Curruga Eliolæ.

Raj. av. 79. n. 6. Curruga.

Suecis Kruka.

Habitat præsertim in terra argillosa, ova ponens cinerea maculis ferrugineis.

234. MOTACILLA virescente cinerea, artubus fuscis, subtus flavescentes, abdomine albido.

Raj. av. 79. n. 7. Ficedula septima aldrovandi.

Habitat in arboribus.

DESCR. forte præcedentis est Fæmina. *Corpus* supra cinereum. subtus cinereo-albicans. *Gula* alba, alæ clausæ supra ferruginea. *Remiges* margine exteriore ferruginea sunt. *Rectrices* coæquales vel exteriores paulo breviores, fusca omnes, sed 1:ma extrorsum pallida, 2:da apice pallida; reliqua vix manifeste pallida.

In altera auctorum, quæ forte mas est, color cinereus magis e cinereo flavescentes.

235. MOTACILLA remigibus secundariis exteriore margine flavis, medio nigris.

Gesn. av. 643. Parus sylvaticus.

Aldr. orn. l. 17. c. 1. Regulus.

Jonst. orn. t. 42. Passerculus troglodytes.

Will. orn. 163. t. 41. Regulus cristatus.

Raj. av. 79. n. 9. Regulus cristatus.

Alb. orn. 1. p. 51. t. 53. Regulus cristatus.

Suecis Kongsfogel.

Habitat in arboribus non infrequens minima avis inter nostrates.

DESCR. *Corpus* supra griseo-vires, subtus dilutius. *Remiges* fuscæ 1 2 3 4 5 margine exteriore vix flavescentes, reliqua 6-16 in marginis exterioris medio nigra, a medio extrorsum flavo-virescentes. *Reiniges* omnes posteriori margine albescunt, & harum 12-16 etiam apice. *Rostrum* subulatum, nigrum. *Lingua* lacera. *unguis* posticus major. *MAS* macula magna verticis flava, in medio fulva, lateribus nigra.

236. MOTACILLA cinereo-virescentes, subtus flavescentes, superciliis luteis.

Aldr. orn. l. 17. c. 2. Regulus alias non cristatus.

Will. orn. 164. t. 42. Regulus non cristatus.

Raj. av. 80. n. 10. Regulus non cristatus.

Alb. orn. 2. p. 55. t. 59. Regulus non cristatus.

Habitat in salicetis; ova ♂ alba rubris maculis.

DESCR. *Corpus* fuscō-cinereo-virescens. linea sublutea a naribus supra oculos ad occiput. *corpus* subtus albo lutescens. *Remigum* testrices inferiores e viridi flavescentes. *Remiges* fuscæ margine virescente, *Rectrices* similes remigibus. *Will.*

237. MOTACILLA dorso cinereo-virescente, remigibus fuscis: septimo, octavo, nono apicibus albis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. avicula, quam sub hac specie intellectam volo, sequenti gaudet colore. *Rostrum* tenue, flavescens, supra magis obscurum. *nares* ovato-oblongæ: vibræ setis utrinque tribus nigris. *Caput*, *collum*, *dorsum*, *urhopygium* & *alarum* testrices cinerea levissime in viride transuentia, ad flexuram alæ, praesertim subtus, viridi flavescens color saturatior quam in reliquo corpore. *Gula*, *pectus*, *abdomen* alba, sed collum subtus parum viridi flavescit. *Pedes* fuscō-pallidi uti rostrum. *Rectrices* fuscæ & *Cauda*, forcipata. *Remiges* itidem fuscæ, sed penna 7 8 9 summis apicibus vix manifeste albæ. *Lingua* setis duabus instructa. faux flava. Supra oculos a rostri basi summa lineola pallide flavescens utrinque. Facies adeoque Ligurini, sed duplo minor. inquietissima est in arboribus & semper salit huc illucque.

Parus.

238. PARUS capite nigro, temporibus albis, nucha lutea.

Gesn. av. 640. Parus major.

Bell. ic. 95. a. Parus major.

Aldr. orn. l. 17. c. 13. Parus major.

Merr. pin. 178. Parus major.

Will. orn. 174. Fringillago s. parus major.

Raj. av. 73. n. 3. Fringillago s. parus major.

Alb. orn. 1. p. 44. t. 46. Fringillago s. Parus major.

Suecic Talg-oxe.

Habitat inter alnos.

DESCR. *Corpus* nigrum, splendens. Tempora infra oculos alba. *mentum* nigrum, quæ nigredo jungitur subtus temporibus macula capitinis. macula gulae appendicem nigrum versus pectus & ventrem recta demittit. *nucha* lutea. scapularum regio luteo-viridis. *Pectus* & *venter* flava, *alæ* & *canda*, incana. *Remiges* nigricantes, margine exteriore pallidiore, excepta prima. Linea alba transversalis obliqua per alam decurrit. *Rectrix* i longitudina-liter extrorsum alba, at sexta utrinque cærulescens, reliquæ longitudina-liter extrorsum cærulescentes, introrsum nigricantes.

239. PARUS capite cristato.

Gesn. av. 642. f. med. Parus cristatus.

Aldr. orn. . . . Parus cristatus.

Will. orn. 175. t. 43. Parus cristatus.

Raj. av. 74. n. 6. Parus cristatus.

Alb. orn. 2. p. 53. t. 57. f. 2. Parus cristatus.

Suecic Tofsmysla, Tofstita.

DESCR. *Dorsum* fusco-cinereum. *ala* & *cauda* nigro-cinerea. *venter* albus. *plumis introrsum* nigris. *caput* vertice pennis longioribus & surrectioribus gaudet; estque *caput* colore mixto ex albo & nigro, *plumæ* enim nigrae sunt apicibus albis: *cristæ* *plumæ* reliquis majores. *pone oculos* *nigredo*. *gula* *macula magna nigra*. *collare* *nigrum*. *Pedes* *cærulei*.

240. PARUS remigibus cærulecentibus: prima margine exteriore alba, vertice cæruleo.

Bell. ic. 96. a. Parus cæruleus.

Gesn. av. 641. Parus cæruleus.

Merr. pin. 178. Parus cæruleus minor.

Will. orn. 175. Parus cæruleus.

Aldr. orn. l. 17. c. 17. Parus cæruleus.

Suecic Blâmees.

DESCR. *Frons* alba. *vertex* cæruleus. *tempora* alba. *linea a rostro per oculos* *versus nucham* coit in maculam cærulecentem, quæ *collum* ambit, & *gula* maculam nigricantem constituit. *Pectus* & *latera* *flavescens*. *Abdomen* *pone albicans*. *rectrices* *alarum* cærulecentes apicibus albis. *remiges* nigricantes, *margine exteriore* cærulecentes, quarum 1, 1 *margine exteriore* albae. *collum supra albicans*. *dorsum* *virescens*. *pedes nigri*.

241. PARUS capite nigro: vertice albo, dorso cinereo, pectore albo.

Gesn. av. 641. Parus ater.

Aldr. orn. l. 17. c. 19. Parus ater.

Merr. pin. 178. Parus ater s. carbonarius.

Will. orn. 175. t. 43. Parus ater.

Raj. av. 73. n. 2. Parus ater.

Habitat in alnetis.

DESCR. *Caput a rostro ad nucham nigrum*, *ad verticem album*. *sternæ regio nigra*. *Pectus* & *abdomen* *albida*. *Dorsum* & *urhopygium* *cinerea*. *Remiges* 17 *fuscae*, *margine interiore* *albae*. *Rectrices* 12 *fuscae*. *Pedes* *cærulecentes*.

242. PARUS capite nigro, temporibus albis, dorso cinereo.

Gesu. av. 642. Parus palustris.

Aldr. orn. . . . Parus palustris.

AVES. PASSERES.

Will. orn. 175. t. 43. Parus palustris.

Raj. av. 73. n. 3. Parus palustris.

Alb. orn. 3. p. 54. t. 58.

Suecic Entita, Tomlinge.

Habitat in juniperetis.

DESCR. *Caput a rostro ad nucham supra oculos nigrum. tempora infra oculos alba. Corpus supra cinereum, subtus candido-cinereum, plumæ tamen omnes nigrae, apicibus solum colorem exhibentes visibilem. Remiges nigricantes. Rectrices & tectrices dorso concolores. Rostrum nigrum. Pedes plumbei. Rectrix I, I margine exteriore alba,*

243. PARUS vertice albo, cauda corpore longiore.

Gesn. av. 642. (non fig.) Parus caudatus.

Aldr. orn. l. 17. c. 15. Parus caudatus s. monticula.

Merr. pin. 178. Parus caudatus.

Gesn. av. 642. f. infim. Parus caudatus.

Will. orn. 176. t. 43. Parus caudatus,

Raj. av. 74. n. 8. Parus caudatus.

Alb. orn. 2. p. 53. t. 57. f. 1. Parus caudatus.

Suecic Ahltita.

Habitat in alnetis.

DESCR. *Caput levissime hirsutum una cum pectore album. Venter incarnatus. Cauda longa nigra. Alæ e cæruleo, nigro & albo variegatae: flexura inter collum & dorsum nigra. Dorsum fuscum maculis nigris. Avis pulcherrima.*

*Avis in Scania a D. Lecheo visa & depicta minus pulchra erat, cæruleo colore omni defititura. Caput, gula, pectus albicantia. nucha nigra. dorsi color æneo-nigricans. Abdomen æneo-pallidum. Remiges omnes nigricantes, at 12 -- 19 margine exteriore albae, que tamen albedo in 18 maxime lata. Rectrices nigrae, sed 1 2 3 latere exteriore albae. an *Parus beardmanicus*. Alb. orn. 1. p. 46. t. 48?*

Hirundo.

244. HIRUNDO rectricibus, excepto pari intimo, alba macula notatis.

Gesn. av. 548. Hirundo domestica.

Ald. orn. l. 17. c. 6. Hirundo domestica.

Jonst. orn. 115. t. 42. Hirundo.

Merr. pin. 177. Hirundo.

Will. orn. 155. t. 39. Hirundo domestica.

Raj. av. 71. n. 1. Hirundo domestica.

Alb. orn. 1. p. 43. t. 45. Hirundo domestica.

Suecic Ladu - Swala.

Habitat in domibus intra tectum.

DESCR.

DESCR. MAS. *Corpus supra nigro-cæruleum nitidum. Venter, pectus, tectrices alarum inferiores alba. Frons & gula brunnea. Collum subtus cæruleuscens. Remiges nigrae, veræ 1-9 sensim longiores quo apici propiores; at secundariae quo corpori propiores eo longiores, haemarginatae sunt. Cauda nigra, bifurca. Rectrices 12 extimis longissimis; singula rectrice inacula alba notata, excepto pari intimo seu sexto. Rostrum minimum, depresso. Faux ampla, flava. Nares ovatae, nudæ. Lingua bifida, acuta. Pedes nudi.*

245. HIRUNDO dorso nigro cærulecente, rectricibus immaculatis.

Gesn. av. 564. Hirundo sylvestris.

Aldr. orn. l. 17. c. 7. Hirundo agrestis f. rustica Plinio dicta.

Merr. pin. 178. Hirundo agrestis f. rustica plinii.

Fonst. orn. 117. Hirundo agrestis.

Will. orn. 155. Hirundo agrestis plinii f. rustica.

Raj. av. 71. n. 2. Hirundo rustica f. sylvestris,

It. Oeland. 41. Hirundo dorso nigro-cærulecente,

Alb. orn. 2. p. 52. t. 56. f. A. Hirundo agrestis.

Suecic Hus - iwala.

Habitat sub margine tecti e summo pariete extra domum.

DESCR. *Rostrum nigrum, breve, depresso. nares nudæ. Corpus supra nigrum, sed caput & dorsum supra nigro-cæruleuscens. inter oculos & rostrum atra. Remiges fuscae, primores acutæ, secundariae vero emarginatae. Rectrices 12 fuscae, exteriores sensim longiores. urrhopygium, gula, pectus, venter, tectrices inferiores rectricum alba. Pedes alba lana vestiti. Lingua marginata.*

246. HIRUNDO nigra tota, gula albicante.

Bell. ic. 100. a. Apus, Cypselus minor.

Gesn. av. 166. Apus.

Aldr. orn. l. 17. c. 19. Apus.

Fonst. orn. 119. t. 42. Apus.

Merr. pin. 178. Hirundo apus.

Will. orn. 156. t. 39. Hirundo apus.

Raj. av. 72. n. 4. Hirundo apus.

Alb. orn. 2. p. 51. t. 55. Hirundo apus.

Suecic Ring - swala.

Habitat in turribus, templis, arcibus, nec non in sylvis cavisque arborum. Cretenses pueri aciculam hami instar incurvataam per medium Cicadam figunt,

gunt, extreum filum manu tenentes; Cicada sic transfixa nihilo minus in aëre volitat, quam conspiciens Hirundo, impetu in eam ruit & devorat cum acicula, qua retentus capitur. sic & Ispida Bell. obs. 16.

247. HIRUNDO cinerea, gula abdomineque albis.

Gesn. av. 656. Hirundo riparia s. Drepanis.

Aldr. orn. l. 17. c. 8. Drepanis s. riparia.

Fonst. orn. t. 42. Hirundo riparia.

Merr. pin. 178. Hirundo riparia.

Will. orn. 156. t. 39. Hirundo riparia.

Raj. av. 71. n. 3. Hirundo riparia.

Alb. orn. 2. p. 52. t. 96. f. B. Hirundo riparia.

Suecis Strand - Swala, Back - Swala.

Habitat sub terra in abruptis littoribus vel arenosis præcipitiis, ubi fodit cavitates horizontales profundas.

DESCR. Tota cum Remigibus & Rectricibus cinerea. Gula & venter alba.

248. HIRUNDO cauda integra, ore setis ciliato.

Bell. ic. 28. a. Strix, Caprimulgus, Fur nocturnus.

Gesn. av. 242. Caprimulgus Ægothelus.

Fonst. orn. 53. t. 20. Caprimulgus.

Will. orn. 70. t. 14. Caprimulgus.

Raj. av. 26. n. 1. Caprimulgus.

Albin. ornith. i. p. 10. t. 10. Caprimulgus.

Suecis Nattskräfwa, Nattskiärra. Suecis Ostrobotnienibus Kiärrgylta.

Habitat ubique in Suecia, nocte sola exit, proditur facile susurro continuo.

DESCR. Magnitudo Cuculi. Corpus supra canum, ex nigro, albo & fusco tenuissime undulatum mixtis maculatum; huic colori maculae parvae longitudinales nigrae adspersae. Abdomen pallide testaceum undulis crassioribus nigris; pectus iisdem undulis, sed minoribus. Caput ratione corporis magnum. Aures amplæ. Rostrum tenuie, depresso-planum, modice inflexum, nigrum. Pedes parvi, hirsuti; digito intermedio duplo longiore. Cauda longa, integra. Rectrices 10. Pennæ omnes laxæ, molles, æquales. unguis intermedius interiori margine squamis pectinatis notatur. Singularia in hac Ave: Myxtaces in margine maxillæ superioris ex 8 radiis s. setis exstantibus rigidis, quo facilius phalænis & insectis victaret. Fauax amplissima, decies rostri hifatu amplior, ut in congeneribus. Nares prominentes cylindro elevato. Lingua minima, acutissima, integrerrima, palato adfixa. Cranium pellucidum. Capite magno, auri-

auribus magnis, licet non extantibus, oculis magnis commune huic cum reliquis nocturnis avibus; ungue intermedio squamato.
MAS gaudet macula magna alba fere in medio Remigis 2 & 3, quibus fæmina caret & apices Rectricum 1 & 2 apice albæ sunt in mare.

Procellaria.

249. PROCELLARIA. *Aet. stockb. 1745. p. 93.*

Alb. orn. 3. p. 87. t. 92. Petrel.

Dampier voyag. 3. p. 97. Petrel.

Suecis Stormwåders fogelen.

Habitat in mari, undas currens, instante procel-
la proram puppemque navium petens, unde præsa-
gia nautarum de instante tempestate, quam avicu-
læ evitare conantur.

DESCR. *magnitudo Hirundinis f. Motacillæ, totas niger, in dorso magis saturate, in pectore & abdomine magis obscure, sed testrices rectricum infra & supra sunt albæ apicibus nigris, hinc urrhopygium album est. Rectrices 12 æquales nigræ alis breviores, obtusæ. Remiges primores acutiores. Testrices alarum 2:di ordinis apice parum albent. Pédes nigri palmati; femoribus seminudis. Pollex nullus, sed unguis intimus sessilis. digitæ tres membrana nigra connexi palmati, quorum intimus brevior duobus constans articulis; extimus longior interiore, constans quatuor articulis; intermedius paulo longior exteriore, sed 3 articulis constans. ungues cinerei nigri, fere æquales. Rostrum nigrum, te-
nue, compressum, molliusculum, apice nigrum. maxilla superior apice adunca, acuta, inferiore non longior. nares in medio rostri, gibbae prominulæ (ut in hirundine); narium foraminibus tenuissima membrana distin-
ctis. ergo character generis Procellariæ. Rostrum tenue compressum; ma-
xillæ æqualibus: superiore apice adunco. nares prominentes; cylindro fe-
raminibus membranula separatis.*

Classis III.

AMPHIBIA.

I. REPTILIA.

Rana.

250. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis, pollice longiore.

Aldr. ovip. 89. Rana.

Raj. quadr. 247. Rana aquatica.

Bell. aquat. 54. Rana.

Charl. onom. 24. Rana temporaria.

Schonef. ichthb. 59. Rana.

Bradl. nat. 21. f. 1. Rana.

Gesn. ovip. 46. Rana aquatica sive innoxia.

Jonst. quadr. 130. Rana aquatica.

It. æl. 154. Rana temporaria.

Suecis Groda. Smolandis Frö. Ostrobothnienibus Kläffsa.
Habitat ubique in aquis & fossis vere, excepta ferme Lapponia.

DESCR. manus tetradactylæ, digito 2 & 4 breviori. Plantæ hexadactylæ semipalnatæ, digito 1 & 5 longiore. dorsum planum, distinctum, lateribus utrinque linea pallida elevata ab apice rostri per palpebram superiorem, versus caudam. Tempora nigra. maxilla superior alba ad marginem. Corpus cæterum totum livido-cinereum lituris nigris notatum; femora pallida lituris nigris transversis.

251. RANA abdomine fulvo.

Habitat in Scania.

OBS. Cantat uti Cuculus. *J. Leche.*

252. RANA viridis.

Charl. onom. 24. Ranunculus viridis.

Jonst. quadr. 133. Ranunculus viridis.

Raj. quadr. 251. Rana arborea s. Ranunculus viridis.

Aldr. ovip. 434. Rana viridis.

Gesn. ovip. 60. Ranunculus viridis s. Dryopetes.

Habitat in Scania. *J. Leche.*

253. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis palmatis: pollice breviore.

Raj. quadr. 252. Bufo s. Rubeta,

Rond. aquat. 2. p. 221. Bufo.

Charl. onom. 24. Bufo.

Bradl. nat. 1. t. 21. f. 2. Bufo.

Fonst. quadr. 131. Bufo.

It. oel. 142. Bufo.

Suecic Padda. Smolandis Tåffa.

Habitat in locis umbrosis, montosis, aetea aut cuncta foetida praesertim luxuriantibus, noctu exiens.

DESCR. Manus tetradactyle, fissæ, digitis subæqualibus. Palmæ hexadactyle, palmatæ, digito primo & ultimo brevissimo. Corpus nigrum, verrucis hispidum. ad aures vesicula quasi inflata. gula flava. abdomen ventricosum, pallidum, maculis nigris adspersum, uti & ipsa femora fusca.

Lacerta.

254. LACERTA pedibus inermibus, manibus tetradactylis, palmis pentadactylis, corpore livido, linea dorsali fusca dupli.

Raj. quadr. 264. Lacertus vulgaris.

Petiv. mus. 19. n. 116. Lacerta vulgaris velox.

Habitat in sylvis.

OBS. pallide livida est, a capite utrinque secundum dorsum linea fusca excurrit ab domen flavescent, interdum nigris maculis punctatum. cauda teretiuscula, longitudine corporis. unguis in pedibus nulli.

255. LACERTA viridis.

Raj. quadr. 264. Lacertus viridis.

Habitat in pratis Scaniæ & alibi.

OBS. Vidi quondam in Lapponia lulensi ad templum Jockmook Lacertam parvam dorso stellulis pulcherrime pictam, sed fugitivis modo oculis, cum manus nostras evaserit; haec omnino distincta species erat, sed non sufficienter examinabatur.

256. LACERTA pedibus inermibus fissis, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda ancipiti.

Raj. quadr. 273. Salamandra aquatica.

Pet. mus. 18. n. 111. Lacerta aquatica major mas s. verrucis albis adspersis membranula ferrata in dorso extante.

Lacerta aquatica major, fæmina, s. verrucis albis adspersis, dorso plano. Wurff-

Wurffbain. salamandrol. 52. t. 2. f. 3. 3. Salamandra aquatica.

Charl. onom. 26. Salamandra aquatica.

Seb. thes. 1. p. 141. t. 89. f. 4. 5. Lacerta americana.

Dalekarlis Skrot-abborre five Skratt-abborre.

Habitat in fossis, piscinis & aquis stagnantibus.

DESCR. Corpus fuscum. abdomen fusco-maculatum, albicatis five croceum. Rostrum obtusum. Cauda compressa, anceps, acie perpendiculari. dorsum & cauda dentata in mare. genitalia utrisque prominula. gula maris lituris nigrioribus adspersa. Pedes 4 5 fissi, lateralibus brevioribus: horum digitii in plantis (in mare) margine membranaceo laterali instruuntur.

257. LACERTA pedibus inermibus fissis, manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda teretiuscula.

Pet. mus. 18. n. 113. Lacerta aquatica minor mas f. lœvis lituris nigris adspersa.

Lacerta aquatica minor fæmina, f.

lœvis flavescens.

Gefn. ovip. 31. Lacertus aquaticus.

Habitat cum antecedente.

II. SERPENTIA.

Anguis.

258. ANGUIS squamis abdominalis caudæque CXXX.

Raj. quadr. 289. Cæcilia, Typhinus Græcis.

Charl. onom. 31. Cæcilia Typhlos.

Gefn. serp. 60. Cæcilia Typhlos Græcis.

Aldr. serp. 243. Cæcilia.

Merr. pin. 208. Typhlos Cæcilia.

Pet. mus. 17. n. 10. Cæcilia anglica cinerea squamis parvis mollibus compactis.

Suecis Ormflå, Koppar-orm.

Habitat satis frequens in Suecia

259. ANGUIS scutis abdominalibus CLXXVII, squamis caudæ LXXXV. *Amph. Gyllenb.*

Raj. quadr. 334. Natrix torquata.

Gefn. serp. 43. Anguis.

Aldr. serp. 287. Natrix torquata.

Charl. onom. 33. Natrix torquata.

Merr. pin. 204. Anguis Coluber.

Pet.

Pet. mus. 17. n. 101. *Anguis vulgaris fuscus*, collo flavecente, ventre albis maculis distincto.

It. gottl. 226. *Serpens.*

It. oel. 6. 154. *Coluber.*

Suecias Tomt-orm. *Scanis Snok.* *Smolandis Ring-orm.*

DESCR. *Corpus* nigrum. *Latera ventris notata albis maculis seu squamis ventralibus ad latera albis. gula alba. aurium regio flavescens. tempora alba lineis nigris transversis. dentes duplii ordine, aequales. Dorsi squamae stria in medio elevata notata (variat color: aliis squamæ dorsi cinerea apice hinc inde nigricante; aliis squamæ omnes nigrae sunt.) Nares non prominent. Aiiiis aurium regio convexa, nigricans, macula magna alba. venter niger, nitens.*

260. ANGUIS scutis abdominalibus **CXLIV**, squamis caudæ **XXXIX.** *Amph. gyllenb.*

Gesn. serp. 124. *Vipera.*

Aldr. serp. 108. *Vipera.*

Bell. itin. clus. 123. *Vipera.*

Raj. quadr. 285. *Vipera.*

Charl. onom. 30. *Vipera.*

Pet. mus. 17. n. 103. *Vipera anglica fusca*, dorso linea undulata nigricante conspicua.

Act. upf. 1736. p. 11. n. 4. *Anguis cinerea*, macula dorsi fusca longitudinali dentata.

It. oel. 23. *Vipera.*

Suecias Hugg-orm.

Habitat in Suecia frequens, mortu venenatissimo interdum lethalis.

DESCR. *Corpus* cinereum. *Dorsum longitudinaliter tegitur macula linearis fusca utrinque dentata; ad latera hujus macula cæruleofuscens singulo denticulo dorsalis lineæ interjecta est. venter purpurascens cum puncto nigro ad apicem singulæ squamæ. Gula pallida. Labium superius secundum marginem album est. oculorum iris flammea, pupilla nigra. angulus acutus cæruleus maculam longitudinalem dorsi a capite distinguit.*

261. ANGUIS parvus rufescens à sping dietus.

Habitat in Smolandia Salicetis rarius, non dum nobis visus.

OBS. De hujus dira pernicie stupenda narrant Smolandi: dicunt eum reperiri præsternit inter frutices Salicis; quodque vulnera omnino lethalia producat cum intumescencia corporis hostienda: dieunt anguem parvum esse, nec spithami longitudinis; esse deinceps rufi seu ferruginei coloris omnino a Cæcilia diversum.

Classis IV.

PISCES.

I. PLAGIURI

Catodon.

262. CATODON fistula in cervice. *Art. gen. 79. syn. 108.*
Clus. exot. l. 6. c. 17. Cete.
Willug. ichth. 41. Cete clusio descriptum.
*Raj. pif. 11. Cete Pot-walfisch batavis maris accus-
lis dictum.*
Habitat in mari norwegico.

Monodon.

263. MONODON. *Art. gen. 78. syn. 108.*
Charl. onom. 168. Monoceros unicornu marinum.
Schonef. ichth. 28. Balænæ decimum genus Nahrwal.
Will. ichth. 42. Monoceros piscis.
Raj. Pisc. 11. Monoceros piscis de genere cetaceo.
Dal. pharm. 413. Monoceros unicornu.
Habitat in mari atlantico.

OBS. Non datur in natura quadrupes monoceros. Fabula desumpta est ab hujus piscis dente, quem veteres crediderant Quadrupedis alterum cornu.

Balæna.

264. BALÆNA fistula in medio capite, dorso caudam
 versus acuminato. *Art. gen. 76. syn. 106. spec. 106.*
Gesn. aqu. 114. Balæna vulgo dicta.
Aldr. cet. 688. Balæna vulgi.
Jonst. pifc. 152. Balæna vulgaris.
*Rond. pifc. 1. p. 475. Balæna vulgo dicta s. Muscu-
 lus.*
Charl. onom. 46. Balæna vulgaris.
Schonef. ichth. 24. Balæna bellonii.

Will.

Willug. ichth. 35. Balæna bellonii.

Raj. pisc. 6. Balæna vulgaris edentula, dorso non pinnato.

Dal. pharm. 414. Balæna.

Suecis Grönlands walfisk.

Habitat in mari atlantico victitans Medusis.

265. BALÆNA fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso. *Art. gen. 77. syn. 107.*

Raj. pisc. 9. 10. Balæna edentula, corpore strictiore, dorso pinnato.

Will. ichth. 41. Physteter.

Rond. ichth. 485. Physteter.

Gesn. aquat. 723. 851. Physalis bellua f. Physteter.

Aldr. cet. 689. Physteter.

Jonst. pisc. 216. Physteter.

Charl. pisc. 167. Physteter f. Physalus.

Suecis Finn-fisk.

Habitat in mari norwegico & editur ab incolis, sapit fere ut sturio, qui quotidie ab incolis edebatur, dum per Finmarkiam summe septentrionalem Norvegiae peregrinabar.

Delphinus.

266. DELPHINUS corpore subconiformi, dorso lato, rostro subacuto. *Art. gen. 75. syn. 104.*

Bellon. aqu. 9. Delphinus.

Gesn. aqu. 319. Delphinus.

Aldr. cet. 703. Delphinus prior.

Jonst. pisc. 47. Delphinus.

Charl. pisc. 168. Delphinus.

Will. ichth. 28. Delphinus antiquorum.

Raj. pisc. 12. Delphinus antiquorum.

Dal. pharm. 413. Delphinus.

Suecis Marswin, Tumblare.

Habitat ubique in mari vulgaris, sed a nostris non capitur.

267. DELPHINUS rostro sursum repando, dentibus lati ferratis. *Art. gen. 76. syn. 106.*

Gesn. aqu. 635. Orca.

Aldr. cet. 698. Orca.

Jonst. pisc. 217. Orca.

Rond. pisc. 483. Orca.

Schonef. ichth. 53. Orca.

Charl. onom. 168. Orca.

Will. ichth. 40. Orca.

Raj. pisc. 10. Orca.

Suecic. Lopare.

Habitat in mari occidentali.

OBS. Sunt procul dubio longe plures hujus ordinis Pisces in mari occidentali & septentrionali, quorum notitia nos fugit, cum raro capiantur, & mortui a solo vulgo observentur & negligantur.

II. CHONDROPTERYGII.

Raja.

268. RAJA aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine transversa in ventre. *Art. gen. 71. syn. 99. spec. 103.*

Rond. pisc. 353. Raja clavata.

Salv. aquat. 149. Raja.

Gesn. aqu. 795. Raja clavata.

Aldr. pisc. 460. Raja clavata rondeletii.

Jonst. pisc. t. 11. f. 2. Raja clavata.

Charl. pisc. 130. Raja clavata.

Schonef. ichth. 57. Raja.

Bell. aqu. 80. Raja.

Will. ichth. 74. Raja clavata.

Raj. pisc. 26. Raja clavata.

Dal. pharm. 411. Raja.

Suecic. Racka.

Habitat ubique in mari occidentali.

Squalus.

269. SQUALUS pinna ani nulla, ambitu corporis subrotundo. *Art. gen. 66. syn. 94. spec. 102.*

Rond. pisc. 1. p. 373. Galeus achantias.

Salv. aquat. 135. t. 136. Mustelus spinax.

Gesn.

- Gesn. aquat.* 607. *Galeus acanthias.*
Aldr. pisc. 399. *Galeus acanthias f. spinax.*
Fonst. pisc. 27. t. 8. f. 5. *Galeus acanthias.*
Charl. pisc. 128. *Galeus acanthias.*
Schonef. icht. 29. *Canis marinus aut Galeus.*
Bell. aquat. 69. *Mustelus spinax.*
Will. ichth. 56. *Galeus acanthias f. spinax.*
Raj. pisc. 21. *Galeus acanthias f. spinax.*
Suecis Haj.
 Habitat in mari occidentali.

270. **SQUALUS** rostro longo cuspidato osseo piano u-
trinque dentato. *Art. gen.* 66. *syn.* 93.

- Rond. pisc.* 1. p. 487. *Pristis.*
Gesn. aquat. 930. *Serra marina.*
Aldr. cet. 693. *Pristis f. Serra.*
Clus. exot. *Pristis f. Serra piscis.*
Charl. pisc. 168. *Pristis serra.*
Olear. mus. 41. t. 25. f. 1. *Pristis f. Serra.*
Will. ichth. 61. *Pristis f. Serra piscis.*
Raj. pisc. 23. *Pristis f. Serra piscis.*
Clus. exot. 136. *Pristis f. Serra.*
Suecis Sågfisk.
 Habitat in mari occidentali.

Acipenser.

271. **ACIPENSER** corpore tuberculis spinosis aspero.

Art. gen. 65. *syn.* 91.

- Rond. pisc.* 1. p. 410. *Acipenser.*
Gesn. aqu. 2. *Acipenser.*
Aldr. pisc. 517. 526. *Sturio.*
Fonst. pisc. 106. t. 23. f. 89. *Sturio.*
Schonef. ichtb. 9. *Acipenser.*
Charl. pisc. 152. *Sturio.*
Salv. aquat. 113. t. 102. *Sturio f. Silurus.*
Will. ichth. 239. *Sturio.*
Raj. pisc. 112. *Sturio.*
Suecis Stör.

Habitat in mari tam orientali quam occidentali.

272. ACIPENSER ordinibus quinque longitudinalibus squamarum ossicularum; intermedio ossiculis quindecim.

Klein miss. 4. p. 13. t. 1. & forte *Sturio* alter gedenensis ejusdem.

Suecic Sterlett.

Habitat in lacu Mælero, quem Potentissimus Rex Sueciæ FRIDERICUS I. ex Russia allatum in hoc lacu plantari curavit.

Ordo, ordines ossiculorum in eute 5 sunt, sed medius tantum ordo, qui 15 circiter ossiculis constat, angulosus est; cuius alinum singula squamae et phippium forma refert, per medium dorsum secundum totam longitudinalinem in processum tenuem & secantem affigens, posterius aduncu fine terminata. Lateralia ossicula ut & ventralia rhomboidea & fere plana sunt. quilibet ordo laterum 60 prope ossicula continet, ventralium singuli 10 & 11. *J. G. Gmelin.*

Petromyzon.

273. PETROMYZON pinna dorsali secunda angulata.

Art. gen. 64. syn. 89. spec. 99. Petromyzon unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores, majores.

Rond. pisc. 2. p. 202. Lampetra parva & fluviatilis.

Salv. aqu. 63. Lampetra minor.

Gesn. aqu. 598. 706. Lampetra parva & fluviatilis.

Aldr. pisc. 581. Lampetra fluviatilis gesneri.

Charl. pisc. 159. Lampetra fluviatilis.

Schonef. ichth. 41. Lampetra fluviatilis.

Fonst. pisc. t. 28. f. 10. Lampetra fluviatilis.

Will. ichth. 104. Lampetra parva & fluviatilis.

Mars. danub. 4. p. 2. t. 1. f. 1. Lampetra fluviatilis.

Suecic Nein-öga. Westrobotnienssbus; Nätting.

Habitat in flaviis Norlandiæ, præsertim Westrobotniæ & Ostrobotniæ.

274. PETROMYZON pinna dorsali secunda linearis, labio oris superiore pone lobato.

Art. gen. 64. syn. 90. Petromyzon corpore annulo, appendicibus utrinque duabus in margine oris.

Will.

Will. ichth. 107. *Lampetra cæca* f. *oculis carens*.

Raj. pisc. 36. *Lampetra cæca* f. *oculis carens*.

Suecis Lin-åhl.

Habitat in fluvio Dahlelfwen, copiose intra Dahlekariam, sæpe obvius intra Linum, quod aqua maceratur, sæpe inter branchias Gadi 291.

OBS. Crasfitie vix Lumbreicium superat, longitudine vix ac ne vix Spithami. *pinna dorsi posterior* nullo modo in angulum dilatatur ut in præcedenti, sed modice convexa est. ad *os nulli cirrhi*, sed *labia utrinque dependent* pene in laciniam f. lobum dilatata. Striis infinitis notatur.

III. BRANCHIOSTEGI.

Cyclopterus.

275. CYCLOPTERUS. *Art. gen. 62. syn. 87.*

Gesn. paral. 1284. *Lampus anglorum*.

Aldr. pisc. 479. *Lampus anglorum*.

Fonst. pisc. 42. t. 13. f. 1. *Lampus anglorum*.

Charl. pisc. 131. *Lampus anglorum*,

Schonef. ichth. 41. *Lepus marinus nostras, orbis species*.

Will. ichth. 208. *Lampus anglorum*.

Raj. pisc. 77. *Lampus anglorum*.

It. öland. 110. *Cyclopterus* f. *Lampus*.

Suecis Sjurygg - Fisk.

Habitat in mari Bothnico frequens satis.

OBS. Pulvis contra Tertianam vulgo adhibetur.

IV. ACANTHOPTERYGII.

Gasterosteus.

276. GASTEROSTEUS aculeis in dorso tribus. *Art.*

gen. 52. syn. 80. spec. 26.

Rond. pisc. 2. p. 206. *Pisciculi aculeati* prius genus.

Gesn. pisc. 8. *Pisciculus aculeatus* : primum genus.

Aldr. ichth. 628. *Pungitius piscis*.

Fonst. pisc. 146. t. 28. f. *dextr.* *Pungitius alberti*.

Will. ichth. 341. *Pisciculus aculeatus*.

Raj. pisc. 145. *Pisciculus aculeatus*.

Suecic Spigg. i. n. 200. p. 12. Art. 277.
Habitat in lacubus Uplanae.

277. GASTEROSTEUS aculeis in dorso decem. *Art.*
gen. 52. *syn.* 80. *spec.* 97.

Rond. pisc. 2. p. 206. Pisciculi aculeati alterum genus.

Gesn. pisc. 8. Pisciculi aculeati alterum genus.

Aldr. ichth. 628. Alterum genus Pungitii.

Fonst. pisc. t. 22. f. sinist. alterum genus Pungitii.

Will. ichth. 342. Piscis aculeatus minor.

Raj. pisc. 145. Pisciculus aculeatus minor.

Suecic Benunge.

Habitat ubique in rivulis Uplandie, Lapponiae, Dalecarliae, Olandiae &c.

Cottus.

278. COTTUS verrucis capitis quatuor osseis.

Cottus scaber, tuberibus quatuor corniformibus in medio capite. *Art. gen.* 48. *spec.* 84.

Suecic Hornsimpa.

Habitat circa Alandiam & alibi in mari Baltico & Bothnico.

279. COTTUS alepidotus glaber, capite diachantho.

Art. gen. 48. *syn.* 76. *spec.* 82.

Rondel. pisc. 2. p. 202. Cottus.

Gesn. pisc. 401. Cottus fluviatilis capitatus.

Aldr. ichth. 613. Cottus fluviatilis s. capitatus.

Fonst. pisc. t. 29. f. 11. Gobius capitatus.

Charl. onom. 157. Gobio capitatus.

Will. ichth. 137. t. H. 3. f. 3. (opt.) Gobio fluviatilis capitatus.

Raj. pisc. 76. Gobius fluviatilis.

Suecic Sten-Simpa. Fahlunensibus Slagg-Simpa.

Habitat in mari Baltico & Fahlunæ in rivulis.

DESCR. Pisois Slagg-Simpa qui Fahlunaæ frequens vix differt ab hac specie; est enim pisiculo Fahlunensi Corpus duos digitos longum cinereum fasciis variis fuscis. Pinna dorsal prior radiis 7; posterior 18; pectorales 14; ventrales 4; anæ 13; canæ 10.

280. **COTTUS alepidotus**, capite polyacanthon: maxilla superiore paullo longiore. *Art. gen. 49. syn. 77. spec. 86.*
Aldr. ichth. 201. Scorpænæ bellonii similis.
Jonst. pisc. t. 18. f. 12. Scorpænæ bellonii similis.
t. 47. f. 4. 5. *Scorpius marinus.*
Schonef. ichth. 67. *Scorpio marinus I.* *Scorpio nostras.*
Will. ichth. 138. Scorpænæ bellonii similis.
Raj. pisc. 145. Scorpænæ bellonii similis.
Suecic Röt - Simpa, Skrabba, Skiåkryta, Ulka.
 Habitat in mari occidentali frequens.

Trigla.

281. **TRIGLA** capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinnas pectorales. *Art. gen. 24. syn. 73.*
Salv. pisc. 194. *Corvus.*
Aldr. ichth. 136. *Hirundo aldrovandi prior.*
Jonst. pisc. t. 17. f. 8. *Hirundo.*
Will. ichth. 280. *Hirundo.*
Raj. pisc. 88. *Hirundo.*
Suecic Knorrhane. Scanis Knoding.
 Habitat in mari occidentali.

DESCR. Capitum quadratum cinereum punctis scabris varie striatum.
Lobium superius emarginatum, superne glabrum, utrinque tribus aculeis armatum; anticus horum longior.
Orbita oculorum superne deliquescentes. *Iris* cæsi coloris.
Cirrhi intra pinnas ventrales & pectorales tres, truncati; æquales, articulati, inferioribus brevioribus; cum a corpore removentur, incurvantur.
Abdomen argenteum
Dorsum cinereum. Latera infra lineam longitudinalem maculis parvis albocantibus & obsolete rubescientibus adspersum. supra lineam vero punctis l. in maculis albis virescentibus. *Linea lateralis* punctis ossulis prominentibus exasperata albida.
Membrana branchiostega 7. radiis.
Vesica natatoria antice biloba.
Captus in abdoinine murmurat, moribundus tremit.

Trachinus.

282. **TRACHINUS** maxilla inferiore longiore: cirrhis destituta. *Art. gen. 42. syn. 70.*
Salv. pisc. 71. *Draco marinus I.* *Draco s. Araneus piscis.*
Rond. pisc. 301. *Draco marinus s. Araneus.*
Gesn. pisc. 77. *Draco s. Araneus plinii.*
Aldr. ichth. 258. *Araneus aldrovandi alter.* *Scho-*

- Schonef. ichth. 16.* Araneus vel *Draco marinus*.
Charl. onom. 146. *Draco*.
Act. haffn. 3. p. 154. *Piscis Fösing*.
Will. ichth. 288. *Draco s. Araneus plinii*.
Raj. pise. 91. *Draco s. Araneus plinii*.
Suecic Färsing, Fiässing. .
Habitat in mari occidentali..
OBS. Pinnae dorsalis mucrones punctura venenata iedunt.

283. TRACHINUS maxilla superiore longiore, pinna dorsali priori altissima.

- Gron. Act. upsal. 1740. p. 121. t. 8.* *Cottus officulò*
 pinnae dorsalis primo longitudine corporis.
Pet. gaz. t. 22. f. 2. *Lyra harvicensis*, pinna dor-
 sali longissima, maculis cæruleoscentibus.
Habitat in Freto Oresund, ad Borsebæck, ubi cap-
 tus rarissimus piscis 1743.
OBS. De genere nil certi constat, quamdui nec hujus, nec prioris mein-
 bra branchiostega descripta.

Perca.

284. PERCA pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis
 sedecim.

- Art. gen. 39. syn. 66. spec. 74.* *Perca lineis utrinque*
 sex nigris, pinnis ventralibus rubris.
Rond. pise. 2. p. 196. *Perca fluviatilis*.
Salv. pise. 226. f. 224. *Perca fluviatilis*.
Gesn. pise. 698. *Perca fluviatilis*.
Jonft. pise. 146. t. 28. L. 29. f. 8. *Perca major*.
Schonef. ichth. 55. *Perca major*.
Charl. onom. 161. *Perca major*.
Aldr. ichth. 622. *Perca fluviatilis major*.
Suecic Abborre.
Habitat in mari, lacubus, flaviis vulgatissimus piscis.
 in stagnis Fahlunæ hujus singularis *varietas* est,
 quæ spina recurva & corpore omnino gibbo fre-
 quens reperitur.

285. PERCA pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis
 viginti tribus.

Art.

Art. gen. 39. syn. 62. spec. 76. *Perca pallide maculosa,*
duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus.

Gesn. paralip. 28. 1288. *Lucio-Perca.*

Aldr. ichth. 667. *Schilus s. Nagemulus germanorum.*

Jonst. pisc. 174. t. 30. f. 15. *Schilus.*

Schonef. ichth. 43. *Lucioperca.*

Charlet. onom. 164. *Schilus. Nagemulus.*

Will. ichth. 293. *Lucioperca.*

Raj. pisc. 98. *Lucio-Perca.*

Mars. danub. 4. p. 9. t. 22. f. 2. *Lucioperca.*

Suecic. Giōs.

Habitat in lacubus majoribus *Uplandiae, Westmanniae, Sudermanniae &c.*

286. PERCA pinnis dorsalibus coadunatis radiis viginti septem: aculeatis quindecim.

Art. gen. 40. syn. 68. spec. 77. *Perca dorso monopterygio, capite cavernoso.*

Gesn. pisc. 191. 226. *Cernua fluviatilis.*

Aldr. ichth. 624. *Perca fluviatilis minor.*

Jonst. pisc. t. 28. f. *Perca fluviatilis minor.*

Charl. onom. 161. 158. *Perca minor, quibusdam Cernua.*

Schon. ichth. 56. *Perca minor, Porcus, Procellus, Cernua nonnullorum.*

Will. ichth. 334. *Cernua fluviatilis.*

Raj. pisc. 144. *Cernua fluviatilis.*

Suecic. Giers. *Fahlunensibus Snorgers.*

Habitat in lacubus passim per Sueciam.

Scomber.

287. SCOMBER radiis pectoralium viginti, dorsaliū duodecim.

Art. gen. 30. syn. 48. spec. 68. *Scomber pinnulis quinque in extremo dorso, spina brevi ad anum.*

Rond. pisc. 234. *Scomber.*

Gesn. pisc. 341. 1012. *Scomber.*

Aldr. ichth. 270. *Scomber,*

Jonst.

Fonst. pisc. 92. *t.* 21. *f.* 9. 11. Scomber.

Salv. pisc. 241. *t.* 239. Scombrus.

Schonef. ichth. 66. Scomber.

Charl. onom. 147. Scomber, Scombrus.

Will. ichth. 181. Scomber.

Raj. pisc. 58. Scomber.

Suecis Makrill.

Habitat in mari occidentali copiose.

OBS. Viscus in abdomen multis infinitisque appendieibus fasciculatis gaudet uti Gadus.

Xiphias.

288. XIPHIAS. *Art. gen.* 30. *syn.* 47.

Rond. pisc. 251. Xiphias.

Gesn. pisc. 379. *f.* 1049. Xiphias f. Gladius piscis.

Aldr. ichth. 332. Gladius.

Fonst. pisc. l. 4. *f.* 2. Xiphias f. Gladius.

Salv. pisc. 127. *t.* 126. Gladius.

Charl. onom. 124. Xiphias.

Schonef. ichth. 35. Gladius 1. Xiphias.

Olear. mus. 40. *t.* 24. *f.* 3. Gladius.

Will. ichth. 161. Xiphias piscis, latinis Gladius.

Raj. pisc. 52. Xiphias piscis, latinis Gladius.

Suecis Swerd-fisk.

Habitat in mari Baltico rarior.

V. MALACOPTERYGII.

Ophidion.

289. OPHIDION cirrhis carens. *Art. gen.* 25. *syn.* 42.

Act. stockh. 1744. *p.* 129.

Schonef. ichth. 53. Ophidion flavum & imberbe.

Will. ichth. 113. *Raj. pisc.* 39. Ophidion alterum flavum & imbelli.

Habitat in mari Baltico & Oceano, saepe intra ostrearum testas repertum.

OBS. Facies Muræna. Membrana branch. 5. Pinna dorsi radiis 79 a capite ad caudam extensa, maculis aliquot nigris in margine albidis, æquali spatio remotis, aculeatis. Pector. II. ventr. nullæ. Ani 41. caudæ circiter 18 vel 20. Pector referri ad Blennios, ad finis speciei maculis decem.

Muræ-

Muræna.

290. MURÆNA unicolor, maxilla longiore, Art. gen.

24. syn. 39. spec. 66.

Rond. pisc. 2. p. 198. Anguilla.

Salv. pisc. 66. Anguilla.

Gesn. pisc. 40. Anguilla.

Aldr. ichth. 544. Anguilla.

Jonst. pisc. 114. t. 24. f. 7. Anguilla.

Schonef. ichth. 14. Anguilla.

Charl. onom. 153. Anguilla.

Will. ichth. 109. Anguilla.

Raj. pisc. 37. Anguilla.

Marf. danub. 4. p. 4. t. 1. f. 3. Anguilla.

Suecic Ahl.

Habitat ubique in lacubus & fluviis.

Gadus.

291. GADUS dorso monopterygio, cirrhis maxillæ superioris duobus, inferioris quatuor.

Art. gen. 82. syn. 110. spec. 107. Silurus cirrhis quatuor in mento.

Rond. pisc. 2. p. 180. Silurus.

Salv. pisc. 210. Glanis s. piscis barbatus.

Gesn. pisc. 867. 872. 1047. Silurus.

Aldr. ichth. 569. Glanis.

Jonst. pisc. t. 27. f. 8. Glanis.

Marf. danub. 4. p. 7. t. 2. Silurus 1. Glanis.

Schonef. 69. Silurus.

Will. ichth. 128. Silurus.

Raj. pisc. 70. Silurus.

Suecic Mahl.

Habitat in lacubus Smolandiae & Sudermanniae, rarus piscis & maximus.

OBS. Piscem vivum ipse non vidi, ex facie multa cum frequenti habet, hinc eum ad Gadus retuli, donec examen & propria autopsia in vivo admittatur.

292. GADUS dorso dipterygio, ore cirrato, maxillis æqualibus. Art. gen. 22. syn. 38.

Art.

Art. spec. 107. Silurus cirro unico in mento.

Rond. pisc. 2. p. 164. Lota.

Gesn. pisc. 599. Lota Gallis dicta. Stinsia f. Botarissa.

Aldr. ichth. 648. Lota rondeletii.

577. Mustela fluviatilis & lacustris.

Jonst. pisc. 146. t. 28. f. 6. Mustela fluviatilis & lacustris.

168. *t. 29. f. 10.* Lota gallorum.

Salv. pisc. 213. Triscus. Bottatriæ.

Schonef. ichth. 49. Mustela fluviatilis.

Charl. onom. 159. Mustela fluviatilis.

Will. ichth. 125. Mustela fluviatilis. Lota.

Raj. pisc. 67. Mustela fluviatilis.

68. Lota.

Suecis Lake. Smolandis Åhlkussa.

Habitat in Lacubus Dalekarliæ (Silian) ubi maximus & præstantissimus, nec non in aliis lacubus majoribus.

OBS. Quem Sueci Lake vocant major & sapidior est illo minore Smolandis Åhlkussa, adeoque ab hac specie distinguitur, quo jure nescio.

293. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, colore variò, maxilla superiore longiore, cauda æquali. *Art. gen. 28. syn. 35. spec. 63.*

Jonst. pisc. t. 46. f. 4. Asellus varius.

Schonef. ichth. 19. Asellus varius & striatus.

Will. ichth. 172. Asellus varius & striatus.

Raj. pisc. 57. Asellus varius & striatus.

Suecis Torsk. It. öl. 87.

Habitat ubique in mari & Baltico & occidentali, circa Gotlandiam & Oelandiam copiose.

DESCR. Dorsum cinereum maculis griseis; abdomen album punctis minimis nigris..

Pinna dorsi I. radiis 14. II. 19.

anni I. radiis 20. II. 16.

ventralis 6, pectoralis 7 radiis.

Sub apice mandibulae inferioris cirrus lumbrieiformis subulatus mollis.

294. GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxilla superiore longiore. *Art. gen. 19. syn. 34. spec. 62.*

Gesn.

Gesn. pisc. 85. 99. Secunda afellorum Species, Merlanas.

Aldr. ichth. 287. *Asellus minor alter.*

Jonst. pisc. t. 2. f. 3. *Asellus mollis.*

Schonef. ichth. 17. *Asellus candidus primus.*

Charl. onom. 121. *Asellus minor & mollis.*

Will. ichth. 170. *Asellus mollis major s. albus.*

Suecis Hwitling, Widding.

Habitat in mari Norwegico.

295. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, cauda subæquali: radio primo spinoso. Art. syn. 35.

Rond. pisc. 280. *Molua.*

Gesn. pisc. 88. 102. *Molua vel Morrhua altera minor.*

Aldr. ichth. 289. *Morrhua s. Molua altera.*

Jonst. pisc. t. 2. f. 1. *Molua, Morrhua.*

Schonef. ichth. 18. *Asellus major.*

Charl. onom. 121. *Asellus major.*

Will. ichth. 165. *Asellus major vulgaris, belgis Cabliau.*

Raj. pisc. 53. *Asellus major vulgaris.*

Suecis Cabbliæ.

Habitat in mari occidentali.

296. GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, dorso virescente.

Schonef. ichth. *Asellus virescens.*

Raj. pisc. 53. n. 2. *Asellus virescens.*

Norwegis Sey.

Habitat in mari atlantico copiosissime, ut ipsum hamum absque sagina arripiat avidissimus.

DESCR. Piscis magnitudine Percæ, glaber, dorso nigro virescente, totus alius albo-argenteus mollis & pinguis, squamæ minutissimæ. Pinna dorsi prima radiis 13, secunda 20, tertia 19, ani prima 24, secunda 20, ventrales 5, pectorales 17.

297. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante, maxilla superiore longiore, cauda subbifida. Art. gen. 20. syn. 36.

Art. spec. 64. *Gadus cirratus albicans, maxilla superiore longiore, cauda subbifida.* Charl.

Charl. onom. 121. *Callaris*, *Galerida*.

Gesn. pisc. 86. *Eglefinus tertia* *afsellorum* species.

Aldr. ichth. 282. *Afsellus major*.

Schonef. ichth. *Afsellus minor*.

Will. ictb. 170. *Onos* f. *afinus antiquorum*.

Raj. pisc. 55. *Onos* f. *afinus antiquorum*.

Suecis Kolja.

Habitat in mari occidentali.

Pleuronectes.

298. PLEURONECTES oculis a sinistra, corpore aspero. *Art. gen.* 18, *syn.* 32.

Will. ichth. 94. *Rhombus maximus* asper non squamosus.

Raj. pisc. 31. *Rhombus maximus* asper non squamosus.

It. gotl. 208. *Butta*.

Suecis Butta.

Habitat in mari Baltico.

DESCR. Oculi a latere sinistro: cutis supra aspera cinerea immaculata, membrana branchiostega radiis VII. (non vero VI.) *Pinna dorsi* 64, *ani* 48, *ventrales* 6, *Pectorales* u radiis constant, *cauda* vero 16.

299. PLEURONECTES oblongus, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis. - *Art. gen.* 18, *syn.* 32.

Rond. pisc. 320. *Buglossus*.

Gesn. pisc. 666, 785. *Buglossus vel Solea*.

Aldr. ichth. 235. *Buglossa vel Solea*.

Jonst. pisc. 82. *Solea*.

Charl. onom. 145. *Solea*.

Schonef. ichth. 63. *Solea vel Buglossus*.

Will. ichth. 100. *Buglossus seu Solea*.

Raj. pisc. 33. *Buglossus sive Solea*.

Suecis Tunga, *Sola*.

Habitat in mari occidentali.

300. PLEURONECTES oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis. *Art. gen.* 17, *syn.* 31.

Art.

Art. spec. 39. *Pleuronectes linea laterali aspera, spinulis ad radices pinnarum a latere oculato.*

Rond. pisc. 319. *Passeris tertia species.*

Gesn. pisc. 666. 782. 788. *Passeris tertia species.*

Charl. onom. 145. *Passer niger.*

Will. ichth. 98. *Passer fluviatilis vulgo Flesus.*

Raj. pisc. 32. *Passer fluviatilis vulgo Flesus.*

Suecic Flundra. *Babuſiensibus* Slättskådda.

Habitat in mari occidentali.

301. **PLEURONECTES** utrinque glaber, tuberculis sex a dextra capitis. *Art. spec.* 57.

Art. gen. 17. *syn.* 30. *Pleuronectes oculis & tuberculis sex a dextra capitis, lateribus glabris, spina ad anum.*

Rond. pisc. 316. Plateſſa.

Gesn. pisc. 664. 670. Plateſſa.

Aldr. ichth. 243. Passer lævis.

Fonſt. pisc. t. 22. Passer lævis.

Schonef. ichth. 61. Plateſſa.

Charl. onom. 49. Plateſſa lævis.

Will. ichth. 96. Plateſſa.

Raj. pisc. 31. Plateſſa.

Suecic Skålla.

Habitat in mari occidentali.

302. **PLEURONECTES** oculis a dextris, totus glaber,

Art. gen. 17. *syn.* 31.

Rond. pisc. 325. Hippoglossus.

Gesn. pisc. 667. 787. Hippoglossus.

Aldr. ichth. 238. Hippoglossus ab aldrovando observatus.

Charl. onom. 146. Passer britannicus.

Schonef. ichth. 62. Passerum genus majus.

Will. ichth. 99. Hippoglossus.

Raj. pisc. 33. Hippoglossus.

Suecic Hålg-flundra.

Habitat in mari.

OBS. vidimus in Gotlandia præter hos, duas alias, ni fallor, species: (vide It. *got. land.* 186) oculis sinistris radiis dors. 59. pector. 12. ventr. 6. ani 38. caudæ 16.
 oculis dextris 57. 9. 6. 39. 16.
 Prior major immaculata seabra posterior maculis ferrugineis: utraque vul-
 gatissima ibi, vix pro distincta specie habenda.

Ammodytes.

303. AMMODYTES. *Art. gen. 16. syn. 29. spec. 55.*

Salv. pisc. 70. t. 69. Piscis Sandilz dictus.

Gesn. paral. 3. Ammodytes piscis.

Aldr. ichth. 252. Sandilz anglorum.

Jonst. pisc. t. 21. f. 1. Sandilz anglorum.

Schonef. ichth. 76. Tobianus.

Charl. onom. 146. Anguilla de arena.

Will. ichth. 113. Ammodytes gesneri.

Raj. pisc. 38. Ammodytes gesneri.

It. œl. jun. 8.

Suecic Tobis.

Habitat in mari *Baltico*, ad australem *Oelandiæ* angu-
 lum copiose, & in *Scania* ad urbem Cimbrishamn.

OBS. Numeravimus plures radios in pinnis, quam ichthyologus, sc. *dors.*
 60. *pector.* 15. *ani* 32. *caudæ* 14.

Esox.

304. ESOX rostro plagioplateo. *Art. gen. 14. syn. 26. spec. 53.*

Rond. pisc. 2. p. 188. Lucius.

Salv. pisc. 94. Lucius.

Gesn. pisc. 500. Lucius.

Aldr. ichth. 630. Lucius.

Jonst. pisc. t. 29. f. 1. Lucius.

Schonef. ichth. 44. Lucius.

Charl. onom. 162. Lucius.

Will. ichth. 236. Lucius.

Raj. pisc. 12. Lucius.

Marf. danub. 4. p. 63. t. 22. f. 1. Lucius.

Suecic Giædda.

Habitat ubique in lacubus & fluviis, præsertim co-
 piose in Lapponieis.

305. ESOX rostro cuspidato gracili subtereti spithamali,

Art. gen. 14. syn. 27.

Rond.

Rond. pisc. 227. *Acus prima species.*

Salv. pisc. 68. *Acus pisces.*

Gesn. pisc. 9. *Acus prima species.*

Aldr. ichth. 106. *Acus vulgaris s. oppiani.*

Charl. onom. 136. *Acus.*

Schonef. ichth. 11. *Acus prima species.*

Will. ichth. 231. *Acus vulgaris s. oppiani.*

Raj. pisc. 109. *Acus vulgaris s. oppiani.*

Suecic Nåbbgiådda. Bahusiensibus Horngiåll.

Habitat in mari occidentali frequens.

DESCR. Caput quadratum, superne viride, lateribusque argenteis glabris. Oculi albi, pupilla nigra. Nares magnæ papilla referitæ. Os subulatum capite ipso longius; maxilla inferior longior, sed apice carneo. Dentes in margine utriusque maxillæ; pauci in medio palato secundum areolam longitudinalem minimam. Membrana branchiostega oscululis 12. nona vero 14. Corpus subteres, parum compressum, flexible, superne viride, sub linea laterali argenteum.

Pinnae pectorales ad basin capitis, radiis 13, articulatis ramosisque excepta prima indivisa.

Pinnae ventrales remotissimæ a capite, radiis 7, quorum primus longior indivisus.

Pinna ani longa, falcata, interrupta, radiis 20: quorum tres primi indivisi, horum primus minimus, secundus inaxius.

Pinna dorſi exacte opposita pinnae ani, ejusdemque figuræ & longitudinis, interrupta & falcata, radiis 16: primo minimo indiviso, secundo tertioque maximo.

Lineæ laterales in medio laterum, obsoletæ: Lineæ ventrales tres, quarum laterales duæ oppositæ a gula tendunt ad exteriorem marginem pinnarum ventralium versus caudam; intermedia vero a gula recta versus anum.

Maxilla utraque mobilis, superior mediate cartilagine, quo cranio annexa est, exferens utrinque extra oris finum prominentiam osleam, quæ recipitur a finu capiti insculpto.

Dentes subulati, distantes, ad oris interioris marginem majores; denticuli acerosi, minimi vix conspicui, sparsi citra ordinem maxillæ adnascentur.

Lingua glabra. Cranium pellucidum. Vertebræ 79. Ossa viridia.

Salmo.

306. SALMO rostro infra inferiorem maxillam saepe prominente. Art. gen. 11. syn. 22. spec. 48.

Rond. pisc. 2. p. 167. *Salmo.*

Salv. pisc. 100. *Salmo.*

Gesn. pisc. 824. *Salmo.*

Aldr. ichth. 483. *Salmo vulgaris.*

Fonst. pisc. 106. t. 23. f. 1. *Salmo.*

Schonef. ichth. 64. *Salmo nobilis.*

Charl. onom. 150. *Salmo.*

Will. ichth. 189. Salmo.

Raj. pisc. 63. Salmo.

Suecic Lax.

Habitat in flaviis maximis totius Sueciæ, quos adscendit ova depositurus; & quidem hoc in australioribus Provinciis maturius, at in borealibus serius, in his uti Tornoæ & Kemi seu ad apicem maris Botnici copiosissimus est; rarius apud nos hyetnes transagit, uti in lacu Siljan Dalekarliæ, tumque facie multum mutatur.

OBS. Variat maxilla vix manifeste inflexa, & maxilla inferiore angustata, digiti instar, sursusq. inflexa intra sinum maxillæ superioris; hanc notam credidere nostri speciem distinctam indigitare, at multoties dissecui Pisces, omnes autem maxilla adunca esse mares intellexi, reliquas vero feminas.

Art. spec. 80. SALMO minor vulgari similis. Suecic Laxunge. Non inducor, ut credam hunc specie differtre a præcedenti, sed tantum ætate.

307. SALMO maculis cinereis, caudæ extremo æquali.

Art. gen. 12. syn. 23.

Will. ichth. 193. The grey i. e. cinereus aut griseus.

Raj. pisc. 63. Salmo cinereus aut griseus.

Suecic Grålax.

Habitat cum præcedente, a quo vix specie differre crediderim.

308. SALMO maculis nigris brunneo cinctis: pinna pectorali punctis sex.

Art. gen. 12. syn. 24. spec. 51. Salmo latus, maculis rubris nigrisque, cauda æquali.

Charl. onom. 155. Trutta taurina.

Will. ichth. 193. Trutta salmonata.

Raj. pisc. 63. Trutta salmonata.

Suecic Orlax, Börting.

Habitat in Dalekarliæ & Norlandiæ flaviis frequenter quam in aliis provinciis.

DESCR. Color dorsi cinereus, pinna dorsi 12 radiis, adpersa nigris punctis. pectoralis 13 cinerea: punctis 6 longitudinaliter digestis. ventralis 10 cinerea; ani 9 vel 10 etiam cinerea; cauda 20 integra vix punctata, adiposa, fusca est. Venter albus est.

Latera torius pisces, etiam capitis, maculis nigris magnitudine pisi angularis, colore brunneo cinctis adsperguntur.

Dentes maxillarum simplici ordine, lingua duplaci; in singulo 5 dentes; palatum tribus ordinibus denticulorum, quorum laterales simplices, at intermedium serie dupli alternata.

309. SALMO maxilla inferiore longiore, maculis rubris.

Art. gen. 12. syn. 23. spec. 51.

Rond. pisc. 2. p. 169. Trutta fluviatilis.

Gesn. pisc. 1002. Trutta fluviatilis rondeletii.

Aldr. ichth. 589. Trutta fluviatilis rondeletii, gesneri.

Zonst. pisc. t. 26. f. 1. Trutta fluviatilis.

Salv. pisc. 96. Salar & varius.

Charl. onom. 155. Trutta fluviatilis vulgaris.

Schonef. ichth. 77. Truta vel Trutta vulgo, Forina & Forio.

Will. ichth. 199. Trutta fluviatilis.

Raj. pisc. 65. Trutta fluviatilis.

Suecis Laxöring, Forell, Stenbit.

Habitat frequens in fluviis.

DESCR. Præcedens communiter duos pedes, hic raro pedem unum adtingit: Cauda obtusa leviter bifurca. *Pinna ani* margine anteriore nivea. *Pinnae pectorales* non punctatae. *adiposa* apice rufescit. *Dorsum* etiam maculatum est, licet obscure. *Maculae* supra lineam longitudinalis confertæ, nigræ, pallido cinctæ colore; infra hanc lineam sunt maculae purpureæ & nigræ mixtæ.

310. SALMO dorso nigro, lateribus cæruleis, ventre fulvo.

Art. gen. 13. syn. 25. spec. 52. Salmo vix pedulis, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore paullo longiore.

Gesn. pisc. 1201. Umbla minor.

Aldr. ichth. 650. Umbla minor alia.

Charl. onom. 163. Umbla minor.

Will. ichth. 196. Umbla minor.

Raj. pisc. 65. Umbla minor.

Suecis Röding. Lapponibus Raud.

Habitat in lacubus *alpium Lapponicarum* summis vulgarissimus & fere unicus piscis: quibus cibis vitam sustentet non video, cum nec vermiculis scatent aquæ hæ semper gelidæ, nec herbis.

DESCR. *Longitudo* communiter unciarum 13. *Squamæ* minutissimæ sunt. *Caput* glabrum, ovatum, obtusum. *Maxillæ* dentatæ: *Lingua* duobus ordinibus dentium, singulo hoc ordine 6 dentibus constante. *Palatum* ad latera dentatum. *Nares* parvæ duplice foramine in singulo latere, altero supra alterum, quorum inferius majus clausum. *Oculorum* iris grisea pupilla nigra. *infra oculos* in mala seu osse carnibus vestito puncta 7 excavata longitudine digesta; in eodem osse posterius puncta 3 perpendiculari ordine collocata. *membrana branchiostega* 10 ossiculis.

Pinna dorsi radiis 12: quorum 2 priores sensim longiores, tertius & quartus longissimi cum sequentibus divisi.

Color totius Piscis iupra a dorso niger est, ad latera cyaneus s. dilute cæruleus;

us: *venter* vero fulvus s. rubro-luteus; *caput & gula alba* sunt: *pinnæ ventrales* rubræ, exteriori margine albæ. puncta lutescentia secundum lineam lateralem longitudinaliter lateribus adspersa sunt. *Cauda* bifurca colore lateris.

Proprio a rostro ad basin capitis unc. $1\frac{1}{2}$; a capite ad pinnam dorsi unc. $3\frac{1}{2}$; dorsalis pinnæ basis unc. $1\frac{1}{2}$, ejusdem altitudo unc. 2; a dorsali pinna ad adiposam unc. 3; a cauda ad adiposam unc. $2\frac{1}{2}$; a cauda ad pinnam ani unc. $1\frac{1}{2}$. Caro omnium sapidissima, ruberrimo pulchro colore.

OBS. De synonymis auctorum hæreō, cum descriptiones insufficientes sint; apud nos vix nisi in Lacubus Lapponiæ alpinæ occurrit, aut in eorum fluii descendantibus interdum parce.

Osmerus.

311. OSMERUS radiis pinnæ ani septendecim, Art. gen.

10. syn. 21.

Art. spec. 45. Osmerus.

Rond. pisc. 2. p. 196. Eperlanus.

Gesn. pisc. 362. 430. Eperlanus.

Aldr. ichth. 536. Eperlanus gesneri.

Jonst. pisc. t. 24. f. 2. Eperlanus.

t. 47. f. 6. Spirinchus.

Schonef. ichth. 70. Spirinchus.

Charl. onom. 153. Eperlanus.

Will. ichth. 202. Eperlanus.

Raj. pisc. 66. Eperlanus.

Suecic Nors, Slom.

Habitat frequens in *Uplandiae* & *Dalekarliae* lacubus ut & alibi.

OBS. Duplex est varietas: alter enim *SLOM* nostris dicitur & major est, nec foetet: alter vero *NORS* nominatur, longe minor, foetidissimus, steroris instar, quo foetore implet plateas upsalientes primo vere dum rusticis urbem accedunt, ut emant hunc pisces, tumque Querqueræ regnant.

Coregonus.

312. COREGONUS maxilla superiore longiore plana, pinna dorsi ossicularum quatuordecim. Art. gen. 10,

syn. 19. spec. 37.

Gesn. pisc. 33. Albula nobilis.

Schonef. ichth. 12. Albula nobilis major s. laetus.

Jonst. pisc. t. 46. f. 1. Albula nobilis.

Raj. pisc. 60. Albula nobilis.

61. Lavaretus allobrogum.

Will.

Will. ichth. 183. *Lavaretus allobrogum.*

Suecis Sijk, Stor-Sijk.

Habitat in lacubus variis Sueciæ.

313. COREGONUS edentulus, maxilla inferiore longiore. *Art. gen. 9. syn. 13. spec. 40.*

Gesn. pisc. 34. *Albula minima.*

Aldr. icbth. 660. *Albula minima.*

Jonst. pisc. 173. t. 30. f. 7. *Albula minima.*

Charl. onom. 164. *Albula minima.*

Will. ichth. 186. *Albula minima.*

Raj. pisc. 61. *Albula minima.*

Suecis Sijklöja, Småsijk. *Dalekarlis Blikta.* *Norlandis Stint.* *Fennonibus Moiku.*

Habitat in plurimis lacubus Sueciæ; parit circa initium hyemis.

314. COREGONUS maxilla superiore longiore, pinna dorsi ossiculorum viginti trium. *Art. gen. 10. syn. 20. spec. 41.*

Rond. pisc. 2. p. 187. *Thymus.*

Salv. pisc. 81. t. 80. *Thymus s.* *Thymallus.*

Gesn. pisc. 978. *Thymallus s.* *Thymus.*

Aldr. icbth. 594. *Thymallus.*

Jonst. pisc. t. 26. f. 3. 4. 5. & 31. f. 6. *Thymallus.*

Charl. onom. 155. *Thymallus.*

Will. icbth. 187. *Thymallus.*

Raj. pisc. 62. *Thymallus.*

Mars. danub. 4. p. 75. t. 25. f. 2. *Thymallus.*

Suecis Harr.

Habitat in *Angermannia* & variis *Norlandiæ* partibus.

DESCR. *Facies Albulae, glabra. Os dentibus utrinque minutissimis, rostrum obtusum; maxillæ fere æquales. Membrana branchiofæga radiis 9.*

Pinna dorsi in medio dorsi, reliquis major, altitudine & longitudine eadem, radiis 21. mollibus, quorum quinque anteriores sensim breviores simplices, reliqui ramosi: pinna abrupta est; adiposa ut in reliquis absque radiis. Cauda bifurca ad medium: radiis multis articulatis multifidis. Pinna ani abrupta: radiis 12 dichotomis. pectorales radiis 11 dichotomis. ventrales radiis 15 multifidis.

Intestina hujus piscis coaguli vices supplent apud Lappones pro conficiendo caseo e lacte Rhenonum, coagulo cum alio non instruantur.

Clupea.

315. CLUPEA, maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens. *Art. gen. 7. syn. 14. spec. 37.*

α *Rond. pisc. 222.* Harengus.

Gesn. pisc. 408. 486. Harengus.

Aldr. ichth. 294. Harengus flandricus.

Fonst. pisc. t. 1. f. 6. Harengus.

Schonef. ichth. 36. Harengus.

Will. ichth. 219. Harengus.

Raj. pisc. 103. Harengus.

Suecic Sill.

β *Rond. pisc. 220.* Membras.

Gesn. pisc. 74. 85. Membras.

Aldr. ichth. 212. Membras rondeletii.

Fonst. pisc. t. 19. f. 14. Membras.

Charl. onom. 143. Membras.

Suecic Strömming.

Habitat in mari, quarum α Sill major plerumque, ex mari occidentali; β Strömming vero minor ex mari Botnico.

316. CLUPEA quadriuncialis, maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo. *Art. gen. 7. syn. 17. spec. 33.*

Raj. pisc. Spratti.

Suecic Hwassbuk.

Habitat in mari.

Cyprinus.

317. CYPRINUS cirrhis quatuor, ossiculo tertio pinnum dorsi anique uncinatis. *Art. gen. 4. syn. 3. spec. 25.*

Rond. pisc. 2. p. 150. Cyprinus.

Salv. pisc. 92. t. 91. Cyprinus rondeletii.

Gesn. pisc. 309. 164. Cyprinus.

Aldr. ichth. 637. Cyprinus.

Fonst. pisc. t. 29. f. 3. 4. 6. Cyprinus.

Schonef. ichth. 32. Cyprinus nobilis, Cyprianus, Carpa.

Petit. act. gall. 1733. p. 274. t. 15. Carpio.

Charl.

Charl. onom. 162. *Cyprinus.*

Will. ichth. 245. *Cyprinus.*

Raj. pisc. 115. *Cyprinus.*

Suecis Karp.

Habitat in piscinis Magnatum Sueciæ australioris, & e Germania adducti vivi venales prostant Holmiæ, cibus sapidiissimus nepotum.

318. CYPRINUS pinna ani radiis viginti septem, pinnis fuscis.

Art. gen. 6. *syn.* 4. *spec.* 22. *Cyprinus* pinnis omnibus nigrescentibus; pinna ani officulorum viginti septem.

Rond. pisc. 2. *p.* 154. *Cyprinus latus* s. *Brama.*

Gesn. pisc. 316. 317. 165. *Cyprinus latus* s. *Brama.*

Aldr. ichth. 641. *Cyprinus latus.*

Fonst. pisc. 165. *t.* 29. *f.* 5. *Cyprinus latus.*

Schonef. ichth. 33. *Cyprinus latus* vel *Brama.*

Charl. onom. 162. *Abramus*, *Cyprinus latus.*

Will. ichth. 248. *t.* 2. 10. *Cyprinus latus* s. *Brama.*

Raj. pisc. 116. *Cyprinus latus* s. *Brama.*

Suecis Braxen.

Habitat in plerisque lacubus Sueciæ, parit eo tempore, quo Juniperus mas floret farinamque effundit.

319. CYPRINUS pinna ani officulorum quindecim, maxilla inferiore longiore incurva.

Art. gen. 6. *syn.* 14. *spec.* 14. *Cyprinus* maxilla inferiore longiore cum apice elevato, pinna ani officulorum quindecim.

Suecis Asp.

Habitat in Lacu Mælero *Uplandiae*; fluvium Sahlam Upsaliæ usque adscendit primo vere.

320. CYPRINUS pinna ani officulis tredecim rubra.

Art. gen. 5. *syn.* 14. *spec.* 6. *Cyprinus* iride sublutea, pinnis ventralibus anique rubris.

Suecis Id.

Habitat in lacubus, flaviis & sinibus maris Balthici,
præsertim in *Uplandia* & *Sudermannia*.

321. CYPRINUS pinna ani ossiculis undecim, cauda integræ.

Art. gen. 4. syn. 5. spec. 27. Cyprinus mucosus totus nigrescens, extremitate caudæ æquali.

Rond. pisc. 2. p. 157. Tinca.

Salv. pisc. 90. t. 89. Tinca.

Gesn. pisc. 984. Tinca.

Aldr. ichth. 646. Tinca.

Jonst. pisc. 146. t. 29. f. 7. Tinca.

Charl. onom. 162. Phycis vel Merula fluviatilis.

Schonef. ichth. 76. Tinca.

Will. ichth. 251. Tinca.

Raj. pisc. 117. Tinca.

Suecis Sutare, Linnare, Skomakare.

Habitat in lacubus passim lutosis.

322. CYPRINUS pinna ani ossiculorum viginti, linea laterali recta.

Gesn. pisc. 222. 166. Charax.

Aldr. ichth. 644. Cyprinus latus aliis.

Jonst. pisc. 165. t. 27. f. 12. Cyprinus latus aliis.

Will. ichth. 249. Carassius simpliciter dictus.

Raj. pisc. 116. Carassius simpliciter dictus.

Suecis Ruda.

Habitat in lacubus lutosis passim per Sueciam.

323. CYPRINUS pinna ani ossiculorum quadraginta.

Art. gen. 3. syn. 12. spec. 23. Cyprinus admodum latus & tenuis, pinna ani ossiculorum quadraginta.

Rond. pisc. 2. p. 154. Ballerus.

Gesn. pisc. 24. Piscis Blicka germanorum, qui Alburnus lacustris dici potest.

Aldr. ichth. 645. Ballerus rondeletii.

Jonst. pisc. 165. t. 27. f. 7. Ballerus.

Charl. onom. 162. Ballerus aristotelis.

Schonef. ichth. 28. Ballerus.

Raj.

Raj. pifc. 117. *Ballerus.*

Suecis Blicka, Braxenpancka. *Smolandis* Braxenflicka.
Habitat in omnibus facile Sueciæ lacubus vulgatis-
simus.

324. CYPRINUS pinnæ ani radiis quatuordecim, pin-
nis omnibus rubris.

Art. gen. 3. syn. 4. spec. 9. *Cyprinus iride*, pinnis o-
mnibus caudaque rubris.

Will. ichth. 249. *Rootaug* i. e. *Erythrophthalmos*
germanis dictus, Bramis adfinis.

Raj. pifc. 116. *Rotaug.*

Suecis Sarf. *Westrobotniensibus* Isarf.

Habitat *Upsaliæ vulgaris* & *Pithoæ Westrobotniaæ*.

OBS. Puncta lineæ lateralis 60 elevata.

325. CYPRINUS pinnæ ani radiis undecim, pinnis al-
bentibus.

Art. gen. 5. Cyprinus oblongus, iride argentea, pin-
nis albentibus.

Art. syn. 5. spec. 12. *Cyprinus oblongus*, figura ru-
tili, pinna ani ossiculorum decem.

Will. ichth. 263. *Grislagine augustæ* dictus *Gobii flu-*
viatilis species: germani enim *Gobium Gresling*
vocant.

Raj. pifc. 123. *Grislagine augustæ* dictus, *Gobii flu-*
viatilis species.

Angermannis Ståm.

Habitat in *Angermannia* & *Westrobotnia*.

326. CYPRINUS pinnæ ani radiis viginti quatuor, ro-
stro nasiformi.

Art. gen. 6. syn. 14. spec. 18. *Cyprinus rostro nasifor-*
mi, dorso acuminato, pinna ani ossiculorum vi-
gi-
ti quatuor.

Suecis Wimba.

Habitat in lacu *Mælero* & amne *Upsaliensi*.

327. CYPRINUS pinnæ ani radiis triginta septem.

Art. gen. 3. syn. 13. spec. 23. *Cyprinus iride flava*, pin-
na ani ossiculorum triginta septem.

Sue-

Suecis Faren.

Habitat in Lacu Mælero, præsertim ad pontem Oere-sundsbro.

328. CYPRINUS pinnæ ani radiis viginti quinque.

Art. gen. 3. syn. 13. spec. 20. Cyprinus quincuncialis
pinna ani ossiculorum viginti quinque.

Suecis Biörcka.

Habitat in *Uplandiæ lacu Mælero.*

OBS. In specie hujus pisce numeravi radios pinnæ ani triginta quinque.

329. CYPRINUS pinnæ ani radiis duodecim rubicundis.

Art. gen. 3. syn. 10. spec. 10. Cyprinus iride pinnis-que ventris ac ani plerumque rubentibus.

Gesn. pisc. 820. Rutilus f. Rubellus fluviatilis.

Aldr. ichth. 621. Rutilus gesneri.

Fonst. pisc. 130. t. 26. Rutilus fluviatilis gesneri.

Schonef. ichth. 63. Rutilus, Rubellio & Rubiculus.

Charl. onom. 158. Rutilus f. Rubellus fluviatilis.

Will. ichth. 262. Rutilus f. Rubellus fluviatilis.

Raj. pisc. 122. Rutilus f. Rubellus fluviatilis.

Suecis Mört.

Habitat in omnibus lacubus Sueciæ omnium vulga-tissimus pisces, vulgo ova ponit dum Caltha flo-rescit.

330. CYPRINUS pinnæ ani radiis viginti.

Art. gen. 6. syn. 10. spec. 17. Cyprinus quincuncialis,
pinna ani ossiculorum viginti.

Rond. pisc. 2. p. 208. Alburnus.

Gesn. pisc. 23. Alburnus aufonii.

Aldr. ichth. 628. Alburnus aufonii.

Fonst. pisc. 146. t. 29. f. 13. Alburnus aufonii.

Schonef. ichth. 11. Albula minor.

Charl. onom. 161. Alburnus aufonii.

Will. ichth. 263. Alburnus aufonii.

Raj. pisc. 123. Alburnus aufonii.

Suecis Löja.

Habitat in Suecia omnium vulgatissimus in omni lacu.

331. CYPRINUS pinnæ ani radiis novem, iridibus rubris.

Art. gen. 4. syn. 13. spec. 30. Cyprinus biuncialis, i-ridibus rubris & pinna ani osciculorum novem.

Mars. danub. 4. p. 24. t. 9. f. 1. Cobitis fluviatilis? *Suecis Mudd, Budd, Dalekarlis Quidd, Iggle. Westrobothniensibus Glirr, Glirren, Lappis Sollensodg.* Habitat in fluviis *Dalekarliæ, Lapponiæ, Uplandiæ,* sæpius in parvis rivulis & lacubus.

OBS. an hic sit idem cum Cyprino tridactylo vario oblongo setetiusculo, pinna ani osciculorum VIII Arted?

DESCR. Facies Truttae f. Salmonis; Longitudo digiti: dorso tereti pinguisimo secundum spinam itaque concavus. Color dorsi cæstus, cum maculis fuscis ut in Perca. Iris oculorum alba cum rubedinis mixtura. Pinna dorsalis pone æquilibrium, radiis octo dichotomis, primo simplicissimo. Cauda bifurca radiis 19. pinna ani paulo pone dorsalem radiis 9. ventrales radiis 7. pectorales 11 vel 12 radiis; maxilla inferior superiore paullo brevior. os nasale pedem bovis referens, ut in toto Cyprinaceo genere; Squamae vix conspicuæ. Dum parit & coit caput variolis adspersum ut in congeneribus. Dorsum fuscum, latefa punctis omnium minutissimis nigricantibus veluti per fascias (uti Perca) pingitur.

OBS. In Dania a Magnatibus educatus fuit *Cyprinus* pinna ani dupliciti, caudæ trifurca. *Art. Stockh. 1740. p. 403. l. 1. f. 3. 4. 5. 6. 7. 8.* unde eundem habuimus & descripsimus loco allegato; vivum tamen adhuc numquam Sueci coluere. Non tamen dubitamus, quin hic Piscis, colores si spectes omnium piscium pulcherrimus, tandem e China in Sueciam introducatur, & toti Europæ fieri æque vulgaris ac Pavo, in Magnatum oblectamentum.

Cobitis.

332. COBITIS tota glabra maculosa, corpore subtereti.

Art. gen. 2. syn. 2.

Rond. pisc. 2. p. 204. Cobitis barbatula.

Gesn. pisc. 404. Cobitis fluviatilis barbatula.

Aldr. ichth. 618. Cobitis barbatula.

Jonst. pisc. t. 26. f. 22. Cobitis barbatula.

Charl. onom. 157. Cobitis barbatula.

Schonef. ichth. 31. Cobitis fluviatilis.

Will. ichth. 265. Cobitis fluviatilis barbatula.

Raj. pisc. 124. Cobitis fluviatilis barbatula.

Suecis Grönling. Germanis Grundel.

Habitat in lacu Mälaren, istuc adlatus e Germania & satus a clementissimo Rege nostro FRIEDERICO I.

333. COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum.

*Art. gen. 2. syn. 5. spec. 4.**Rond. pisc. 2. p. 204. Cobitis aculeata f. altera.**Gesn. pisc. 404. 482. Cobitis aculeata.**Aldr. ichth. 617. Cobitis aculeata rondeletii.**Jonst. pisc. t. 26. f. 21. Cobitis aculeata.**t. 46. f. 1. Tænia cornuta.**Charl. onom. 157. Cobitis aculeata.**Schonef. ichth. 74. t. 4. f. 1. Tænia cornuta.**Will. ichth. 205. Cobitis barbatula aculeata.**266. Tænia cornuta.**Raj. pisc. 124. Cobitis barbatula aculeata.**Mars. danub. 4. p. 3. t. 1. f. 2. Cobitis aculeata.**Suecic Tånglake.**Habitat in Mælero lacu.*

Syngnathus.

334. SYNGNATHUS teres, pinnis pectoralibus caudæ-
que carens. *Art. gen. 1. syn. 2. spec. 1.**Will. ichth. 160. Acus lumbriciformis aut septi-
mus.**Raj. pisc. 47. Acus lumbriciformis f. Ophidion lum-
briciforme.**Suecic Hafsnåhl.**Habitat in mari Baltico & Botnico.*335. SYNGNATHUS corpore medio heptagono, cau-
da pinnata. *Art. gen. 1. syn. 2. spec. 2.**Gesn. pisc. 1025. Typhle.**Will. ichth. 159. Acus aristotelis species altera ma-
jor.**Raj. pisc. 46. Acus aristotelis species altera major.**Suecic Kantnåhl.**Habitat in mari Baltico.*336. SYNGNATHUS corpore medio hexagono, cauda
pinnata. *Art. gen. 1. syn. 1. spec. 3.**Rond.*

Rond. pisc. 229. *Acus secunda* species f. *Acus aristotelis*.

Gesn. pisc. 9. 11. *Acus secunda* species f. *Acus aristotelis*.

Aldr. ichth. 105. *Acus aristotelis*.

Jonst. pisc. 52. t. 15. f. 14. *Acus aristotelis*.

Salv. pisc. 68. f. 2. *Piscis septimus*.

Will. ichth. 158. *Acus aristotelis* f. *Acus secunda* species.

Raj. pisc. 46. *Acus aristotelis* f. *Acus secunda* species.

Habitat in mari *Balthico*.

Classis IV.

INSECTA.

I. COLEOPTERA.

Scarabæus.

337. SCARABÆUS cornibus duobus mobilibus æquilibus apice bifurcis; introrsum ramo denticulisque instructis.

Mouff. lat. p. 148. Cervus volans.

Aldr. inf. p. 151. f. 1.

Fonst. inf. t. 14. Scarabæus 2. f. 1. 2.

Imper. alt. p. 694. Cervus volans.

Charl. onom. 46. Cervus volans platyceros.

Hoffn. inf. 1. t. 6. & 2. t. 1.

Merian. europ. gall. t. 168.

Merret. pin. p. 201. Scarabæus Cervus volans dictus.

Wagn. helv. p. 236. Scarabelaphus.

Olear. mus. p. 27. t. 16. f. 5. Taurus volans.

Worm. mus. p. 242. Scarabæus cornutus.

Dal. pharm. p. 398. Scarabæus cornutus.

*Raj. inf. p. 74. n. 2. Scarabæus maximus platyceros,
Taurus nonnullis, aliis Cervus volans.*

It. oel. 69. Scarabæus Cervus volans dictus.

Suecic Ekoxe, Hornoxe.

Habitat volans animal communiter in Quercubus.

338. SCARABÆUS maxillis lunulatis prominentibus dentatis; thorace inermi.

Raj. inf. p. 75. n. 3. Scarabæus platyceros totus niger, cornibus brevibus unicum tantum ramum e-mittentibus, corpore oblongo & velut parallelogrammo.

Habitat in pratis *Fraxino* cōsitis, in cujus ligno putrido nidificat.

DESCR.

DESCR. Magnitudo antecedentis. Os prominens maxillis duabus, lunulatis, nigtis, angulatis, prominentibus, a latere interiorē dupli denticulo armatis, qui denticuli in utraque maxilla duo s. pares, quorum unus inferior, alter superior. Thorax lēvis, convexus, niger, marginatus, absque ulla elevatis marginibus. Elytra lēvia, nigro subpurpurecentia, marginata. Pedes ferrati. Thoracis margines antici & postici villis cæsis instruti. Hinc a thoracis structura & maxillis, non prioris fēminam esse, ut rustici ferunt, constat, sed propriam speciem, licet antennæ, magnitudo, elytra, pedes, venter eadem videantur.

339. SCARABÆUS maxillis lunulatis prominentibus dentatis; thorace utrinque tridentato. *It. oel.* 152.
Habitat in *Oelandia*.

DESCR. Habet hic multa communia cum præcedente, sed non omnia. Os maxillis lunularibus acutis, ut in præcedente. Oculi teniformes. Caput, thorax, elytra, abdomen nigro-testacea, punctis minimis excavata, etiam ut in præcedenti, sed peclius magis hirsutum. Magnitudo eadem, sed terrior. Thorax utrinque tribus validis denticulis armatum. Antennæ ut in præcedentibus lateraliter lamellatis.

340. SCARABÆUS capite unicorni recurvo; thorace gibbo; abdome hirsuto.

Olear. mus. 27. t. 16. f. 4. *Scarabæus nasicornis*.
Fonst. inf. t. 15. n. 2. *Scarabæus Buceros nasicornis*.
Imper. alt. p. 694. *Scarabæus Rhinoceros* f. 1. 2. 3.
Worm. mus. p. 242. *Monoceros*.
Jacob. mus. dan. part. I. f. 5. n. 20. *Scarabæus nasicornis*.

Barthol. unic. p. 54. *Scarabæus monoceros*.
Stalpart. obs. p. 468. t. 9. f. 2. *mala*.
Hoffn. inf. t. 13. f. *antepenult.* edit. alt. 3. t. 1.
Frisch. germ. v. 3. p. 6. t. 3. f. 1. *Scarabæus nasicornis*.

Swam. bibl. t. 27. f. 1. 2.
Habitat in ligno putrido & vaporariis Hortulanorum.

341. SCARABÆUS capitis clypeo lunato, margine elevato; corniculo emarginato.

Habitat in *Scania*. *D. Leche*.
DESCR. Facies Scarabæi vulgaris stercorarii: Caput tegitur clypeo lunato, in magno, margine elevato, antice emarginato, in cuius medio *Corniculum* breve, emarginatum. Thorax gibbus, lēvis, in medio margine acuto, prominente. Elytra lēvia, singula 7 s. 8. fulcis minus profundis.

342. SCARABÆUS cylindricus; fronte unicorni; thorace antice truncato quinquedentato.

Habitat ad acidulas *Medewi*, de Geer. in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Niger, parvus, fere cylindricus: *Cornu* ex apice rostrum reflexum, antice glabrum, pone villis fulvis hirtum. *Thorax* cylindricus, crassus, supra glaber, antice excavato-truncatus, margine quinquedentato, quorum dens intermedius utrinque cavitate distinctus. *Elytra* fulcata, punctis excavatis scabra.

343. SCARABÆUS antennarum lamellis septenis æquilibus, corpore nigro, elytris maculis albis sparsis; *Charl. onom.* 46. *Fullo*.

Mouff. lat. p. 160. f. 4. *Fullo*.

Abt. n. cur. dec. 2. ann. 6. obs. 239. *Scarabæus pictus*.

Hoffn. inf. 2. t. 7.

Frisch. germ. II. p. 22. t. I. f. 1. *Scarabæus julii* albo maculatus.

Raj. inf. p. 93. n. 9. *Scarabæus Fullo plinii*.

Habitat in *Scaniæ* campis, ubi radices plantarum consumit; in *Belgii* dunis omnium frequentissimum insectum legi.

MAS antennis foliaceis oblongis, *FÆMINA* vero subrotundis.

344. SCARABÆUS corpore viridi-æneo.

Hoffn. inf. 3. t. 6. f. prior.

Baub. ballon. p. 211. f. 3. *Buprestis*.

Worm. mus. p. 342. *Scarabæus chlorochryfus*.

Merret. pin. p. 201. *Smaragdulus vel Viridulus*.

Frisch. germ. v. 12. p. 25. t. 3. f. 1. *Scarabæus arboreus viridis* f. *Scarabæus auratus dictus*.

Raj. inf. p. 76. n. 7. *Scarabæus major*, corpore breviore, alarum elytris & thoracis tegmine crista-CEO, colore viridi ferici instar splendentibus.

Smolandis *Guldsmed*.

Habitat sub terra, radicibus plantarum, & ubi plantæ congestæ in hortis; alatus delectatur *Pæonia* floribus.

345. SCARABÆUS testaceus; thorace villoso; abdominis incisuris lateralibus albis; cauda inflexa.

Aldr. inf. p. 454. t. superior. f. 2.

Mouff. lat. p. 160. f. 2. *Scarabæus arboreus vulgaris*.

Hoffn.

Hoffn. inf. t. I. f. II.

Merian. lat. v. I. p. 2. f. 4.

Gæd. belg. v. I p. 178. f. 78.

List. gæd. p. 265. f. III.

loqu. p. 379. n. I. Scarabæus maximus rufus, ur-
rhopygio deorsum inflexo.

mut. t. 18. f. 16.

Alb. inf. t. 60.

Leuwenh. arc. 1695. v. I. p. 14. f. 14. Molitor.

Pet. gaz. p. 29. t. 19. f. 2. Scarabæus arboreus ma-
jor castaneus.

Raj. inf. p. 104. n. I. Scarabæus arboreus vulgaris
major.

Frisch. germ. 4. p. 20. t. 14. Scarabæus julii s. vi-
tis.

Habitat in Scaniâ; ubi Eruca radices frumenti, vo-

latile sepium arborumque, præsertim Fagi folia
consumit.

DESCR. Inter majores habendus est hic Scarabæus; cui caput, thorax &
elytra testacei coloris sunt. Thorax villosus; elytra singula 4 striis elevatis
glabriusculis. Anus acuminatus deorsum flexus. Abdomen fuscum ad late-
ra subtus macula acuta in singula incisura alba. Oris labium superius ob-
tusum.

346. SCARABÆUS testaceus; thorace villoso; elytris
luteo-pallidis: lineis tribus albis longitudinalibus.

Mouff. lat. p. 160. f. 3. Scarabæus lanuginosus arbo-
reus alteri adfinis;

List. mut. t. 18. f. 17.

loqu. p. 380. n. 2. Scarabæus alter ex flavo ci-
nereus.

It. gotl. 245. Allenborre.

Pet. gaz. p. 36. t. 22. f. 9. Scarabæus pectinatus mi-
nor villosus.

Frisch. germ. 9. p. 30. t. 15. f. 3. Scarabæus junii s.
solstitialis.

Suecic Allenborre.

Habitat frequens circa vesperam æstate in Roslagia,
Oelandia, Gotlandia. &c.

DESCR. Totus testaceus: Oculi nigri: Antennæ lamellatae: Pettus & Abdomen
biserrata: Elytra glabriora, pallidiora lineis albis tribus longitudinalibus.

347. SCARABÆUS clypeo marginato; elytris nigris,
fasciis duabus transversis rubris.

*Mouff. lat. p. 149. lin. 7. f. 3. ordine perpendic. & app.
tab. ult. Cantharus tertius.*

Imper. alt. 692. t. 2. f. 2. Cantharis fasciata.

Lift. mut. 117. f. 5.

*loqu. p. 381. n. 2. Scarabæus majusculus niger,
duabus luteis fasciis undulatis transversim ductis
supra alarum thecas.*

Blank. belg. p. 168. t. 14. f. 1.

*Frisch. germ. 12. p. 28. t. 2. f. 2. Scarabæus mo-
ichi odore.*

Raj. inf. p. 106. Scarabæus fœtidus i aldrovandi.

Habitat æstate in floribus.

348. SCARABÆUS niger hirsutie flavus; elytris fasciis
duabus luteis coadunatis.

Mouff. lat. p. 161. f. 6.

Habitat in floribus præcedente frequentior.

*DESCR. Præcedente minor: Caput & Thorax nigricantia pilis densis ere-
ctis griseis, uti & Abdomen & Pedes. Elytra pallide grisea fasciis tribus
nigris, quarum intermedia in medio angustior, interrupta, reliquis latio-
ribus coadunatis & futuras elytrarum perreprantibus. OBS. interdum ely-
tra glabra absque lineola ista intermedia interrupta.*

349. SCARABÆUS ater; dorso glabro; elytris fulcatis;
capitis clypeo rhomboide centro prominulo.

Mouff. lat. p. 151. Pilularius.

Baub. ballon. p. 212. f. ult.

Wagn. helv. p. 233. Scarabæus pilularius.

Lift. mut. t. 17. f. 4.

*loqu. p. 380. n. 4. Scarabæus magnus ex purpu-
ra niger, tibiis omnium pedum ferratis.*

*Raj. inf. 90. n. 7. Scarabæus major niger vulgatissi-
mus, antennis globosis, elytris lævibus.*

*Raj. inf. p. 74. n. 1. Scarabæus magnus niger vulga-
tissimus, antennis articulatis.*

*Frisch. germ. v. 4. p. 13. t. 6. Scarabæus stercorarius
niger major.*

Merr. pin. p. 201. Scarabæus stercorarius vel fimarius.

Suecis

Suecis Torndyfwel. *Smolandis* Torbagge.

Habitat in stercore & eloacis vespera præsertim volitans.

DESCR. Niger est a tergo & glaber; subtus ad femora villosum. *Clypeo* munitum rhomboide, obtuso, medio elevato, ac si esset testudinis squama. *Antennæ* clavatae, capitulo trifolio; caule rubicundo, bulbo f. infimo articulo piloso. *Thorax* levis, non punctatus, in medio versus posteriora fulco-excavatus. *Elytra* atra striis plurimis; subtus est totum animalculum atro cærulescens; in femorum primorum antica parte macula magna ferruginea villosa. *Os* duabus depresso maxillis, adspersis hirsutie ferruginea.

350. SCARABÆUS cærulescens; dorso clytrisque glabris levissimisque, capitis clypeo rhomboide centro prominulo.

It. æl. 41. Scarabæus magnus vulgatissimus, antennis articulatis.

Habitat cum præcedente in stercore.

DESCR. loco & facie adeo similis præcedenti, ut facile sola ætate differre crederetur, differt tamen a præcedenti.

1. quod paulo minor.
2. Elytris non fulcatis.
3. colore cyaneo f. cæruleo nitido.
4. tempore solo vernali.
5. antennis totaliter ni gris, nec femoribus macula ferruginea.

351. SCARABÆUS capite thoraceque cæruleo piloso; elytris griseis; pedibus nigris.

Att. upf. 1736. p. 16. n. 3. Scarabæus medius, capite collarique cæruleo, pedibus nigris, elytris pallidis striatis.

Habitat in viis publicis inter animalium stercore, sed rarus admodum apud nos, at in *Nordenage*, *OstFriesia* insula, quondam copiosissimum vidimus.

352. SCARABÆUS ovatus ater glaber.

Att. upf. 1736. p. 16. n. 4. Scarabæus parvus oblongus ater, elytris striatis.

Habitat in sylvis.

DESCR. Corpus præcedenti majus, totum atrum, glabrum, lave, minus nitidum: *Elytra* oblonga, concolorata, striata sed vix conspicue. *Antennæ* lamellatae; *Alæ* fuscæ.

353. SCARABÆUS capite thoraceque nigro glabro; elytris griseis; pedibus pallidis. *It. æl. 41.*

Raj. inf. p. 106. Scarabæus pilularis 10.

Act. upf. 1736. p. 16. n. 6. Scarabæus parvus niger,
elytris cinereis.

Habitat cum præcedentibus in stercore primo vere,
ubique in viis publicis.

DESCR. Magnitudo feminis Oryzae. Caput nigrum, clypearium, subrotundum. Thorax niger, marginatus: lateribus pallidis. Elytra grisea ne-
ven striis singula notata. Pedes griseo-pallidi.

354. SCARABÆUS capite thoraceque atro opaco; ely-
tris cinereis nigro-nebulosis. *It. æl. 41.*

Raj. inf. p. 106. Scarabæus pilularis 9. willugb.

Act. upf. 1736. p. 16. n. 2. Scarabæus parvus, capi-
te collarique nigro, elytris nebulosis.

Lift. mut. t. 18. f. 18.

Habitat cum præcedentibus, sed rarer, sub sterco-
re primo vere.

355. SCARABÆUS capite thoraceque nigro; antennis
elytrisque rubris.

Frisch. germ. 4. p. 35. t. 19. f. 3. Scarabæus equi-
nus medius, coleoptris rubris, collari nigro.

Act. upf. 1736. p. 16. n. 5. Scarabæus parvus niger,
elytris antennisque rubris.

Habitat cum præcedentibus.

356. SCARABÆUS ater; antennis pallidis.

Habitat in stercore.

DESCR. Est e parvis, liet non e minimis. *Totus ater, glaber: capitis cly-
peo obtuso. Antennæ summo apice præsertim rufæ, alias fusco-pallidæ;
Pedes extimis articulis rufo-pallidi. Elytra striata, nigra, pone obtusa s.
inflexa. Ala longæ.*

357. SCARABÆUS piceus.

Habitat in aqua & intra aquam cum Hydrocantharis
frequens.

DESCR. Magnitudo feminis Oryzae majoris. Color totius niger minus satu-
rate, subtus vero totus fuscus. in singulo Elytro striae 10 minutissime.

358. SCARABÆUS ater; elytris pone ferrugineis; pedi-
bus rufis.

Habitat in fungis & plantis putridis.

DESCR. Magnitudo feminis milii; totus ater, levis. Elytra striis excavatis,
pone versus marginem rufescens. Pedes & femora obscure rufa.

359. SCARABÆUS nigro-cærulescens.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Magnitudine pulicem vix adtingit, *supra* totus nigro-cærulescens; *subtus* totus ater.

Dermestes.

360. DERMESTES niger, elytris antice cinereis.

Gœd. belg. 2. p. 145. f. 4. Dermestes.

Lift. gœd. p. 276. f. 114.

Blank. belg. p. 95. t. 11. f. K, L, M.

Raj. inf. p. 107. n. 4. Scarabæus antennis clavatis, clavis in angulos divisus, quartus.

Frisch. germ. 5. p. 25. t. 9. Scarabæus lardi parvus, fascia transversali elytrorum nigro-fuscorum albida.

Suecis Ænger.

Habitat in cadaveribus, carnibus, lardo; dilacerat avium exuvias ornithologis inimicum animal.

361. DERMESTES niger; elytris fascia duplice alba undulata.

Habitat *Upsaliae* rarius.

DESCR. Magnitudo, figura, facies præcedentis, sed elytra duplice linea transversa alba & undulata notata, quarum altera ab altera valde remota.

362. DERMESTES niger; coleoptris punctis albis binis.

Frisch. germ. v. 5. p. 22. t. 8.

Att. upf. 1736. p. 117. n. 11. Dermester niger, elytris puncto albo.

Suecis Mahl.

Habitat in carnibus, vestimentis, cibis, parietibus.

DESCR. Corpus ovatum, atrum: punctum album in singulo Elytro, ut clavis elytris duo puncta alba in dorso appareant. Sunt tamen, si probe adspicias, adhuc 5 alia puncta alba, scilicet unum ad scutum dorsale, unum utrinque ubi pectus adnectitur elytris, & unum lineare in singulo elytro versus ejus basin, quæ quinque puncta minima sunt, & in quibusdam plane absunt, excepto puncto scuti. Venter, pedes & antennæ clavatae, omnia atra. Tarsus, terrefactus, aut ubi periculum videt, contrahit pedes & caput.

363. DERMESTES niger, coleoptris punctis rubris binis.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 12. *Dermestes niger*, elytris puncto rubro.

Habitat in *Lardo* similibusque.

364. DERMESTES niger; coleoptris punctis rubris quaternis.

Frisch. germ. 9. p. 36. t. 19. *Scarabæus parvus luteo maculatus erucæ lanigeræ.*

Habitat in arboribus, reperitur etiam in fenestris.

DESCR. *Corpus oblongum, nigrum rotum, in singulo Elytro puncta duo longitudinalia, cubica s. quadrata, rubra, ita ut conniventibus elytris quatuor hæc puncta in figuram quadratam disposita sint.*

365. DERMESTES laevis niger cinereo - nebulosus; scutello luteo.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 9. *Dermestes oblongus, elytris murinis vix striatis.*

Frisch. germ. 4. p. 34. t. 18. *Scarabæus erucæ pinguis nigrae glabrae.*

Habitat in *cadaveribus, carnibus & lignis putridis.*

DESCR. *Corpus oblongum, convexum, murini coloris, cinereum s. potius nigrum incano- maculatum, lave, non striatum. Superficies (lente visa) hirsuta. Scutellum dorsi flavescens. Pedes & abdomen subitus alba. Antennæ compressæ, perfoliatæ. Caput non retrahit, sed pedatore prominet incurvato capite. Datur alia duplo major, magis nigricans: an Fæmina? complicat pedes miro artificio; complicatus ovatus est.*

366. DERMESTES testaceus pilosus; elytris striatis retufis præmorio-dentatis. *It. æl. 26. 195.*

Raj. inf. p. 100. n. 10. *Scarabæus antennis clavatis x.*

Act. upf. 1736. p. 17. n. 6. *Dermestes pubescens, elytris apice erosis.*

Habitat in truncis *Pini*, inter corticem & lignum, ubi labyrinthos format & characteres, pulveremque s. farinam producit.

OBS. Antennæ clavatae nec perfoliatæ, nec fissiles sed apice ovato solido comppresso.

367. DERMESTES testaceus glaber; elytris pone villosis obtusis.

Habitat in *cadaveribus*, edit etiam infecta.

DESCR. *Corpus teres, magnitudine pediculi majoris, rotum testaceum, glabrum; Elytra versus apicem pilis longis adspersa.*

368. DERMESTES niger; elytris griseis margine nigris.

Act. upsi. 1736. p. 17. n. 7. Dermestes cylindraceus; collari crasso subhirsuto; elytris testaceis.

Habitat in varia *Supeilectili* & in domibus.

DESCR. *Corpus* parvum, cylindraceum. *Pectus* crassum, subrotundum, nigrum, subhirsutum. *Elytra* oblonga, apice obtusa, testacea, margine circum circa nigra. *Alæ* fusco-albæ. *Abdomen* & *pedes* nigri. *Antennæ* rufescentes; clausis Elytris evidentur *Coleoptera* grisea, futura nigra, marginibus lateribus versus ventrem nigris. *regio ani supra elytra nigra.* *Magnitudo* majoris pediculi. *Tactus* sc contrahit, nec se se mouet.

369. DERMESTES niger; elytris griseis.

Habitat passim inter quisquillas.

DESCR. Totum corpus non superat pulicem. *facies* omnino Scarabæi, sed antennæ horizontaliter perfoliatæ. totum *corpus* alis, thorace, capite, antennis atrum, glabrum. sola *Elytra* castanei coloris sunt.

370. DERMESTES niger oblongus; abdomine acuto.

Act. upsi. 1736. p. 16. n. 7. Scarabæus minimus ater florilegus.

Raj. inf. p. 108. Scarabæus antennis clavatis, clavis in annulos divisis.

Habitat copiose in floribus, facile volitans, agile currens.

DESCR. *Corpus* oblongo-ovatum, atrum, magnitudine majoris pediculi. *Abdomen* planum, apice acuminatum. *Antennæ* clavatae (an foliaceæ?) *Alæ* albæ.

371. DERMESTES ater; pectore elytrisque subnigris; pedibus rufis.

Habitat in *Brassica subputrida*, per hyemen in cellulis servata.

DESCR. *Corpus* ovatum, pediculo duplo majus, agile. *Caput* atrum. *Pectus* & *elytra* e rubicundo nigra; *elytra* secundum marginem dorsalem parum prominent, ubi conjunguntur; *femora* & *pedes* nigro-rubri. *pectus* non teres: sed fere marginatum cassidæ; oum Chrysomelis in multis conuenit.

372. DERMESTES ater; pedibus rufis.

Habitat in aquis inter Lemnas.

DESCR. Magnitudo dupla pediculi. *Caput*, *thorax*, *Elytra* singula 9 striis, punctata, margine laterali prominulo. *Pedes* & *antennarum basis* rufo- ferruginea. *thorax* convexus, non vero teres.

373. DERMESTES nigro-cæruleus.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo seminis Oryzæ, totus *supra* cæruleus, *subtus* nigritans. *thorax* pilosus.

374. DERMESTES nigro-fuscus; elytris punctatis nitidis. *D. Geer.*

Habitat in lignis.

DESCR. Magnitudo pediculi majoris, cylindricus, fere glaber. *Elytra* variant fuso & nigro colore; pone non truncatus.

375. DERMESTES oblongus, glaber, testaceus; oculis nigris.

Habitat in *stercore equino*, primo vere frequens.

DESCR. Corpus magnitudine pediculi, glabrum, lave, testaceum exceptis oculis atris. *Antennæ* clavatae, perfoliatæ.

376. DERMESTES fuscus, thorace subtestaceo.

Habitat in *Scania*. *D. Leche.*

DESCR. Magnitudo fere pediculi. Corpus totum fuscum. *Antennæ* clavatae, perfoliatæ. *thorax* & *elytrorum* basis obscure testacea.

Cassida.

377. CASSIDA viridis, ovata, laevis; clypeo caput tene gente integro. *It. æl.* 153.

Aet. upf. 1736. p. 17. n. 1. *Cassida viridis*, corpore nigro.

Volkam. hesperid. v. 1. p. 166. f. 4. bona.

Raj. inf. p. 107. n. 5. *Scarabæus* antennis clavatis, clavis in annulos divisis.

Reaum. gall. v. 3. t. 18. f. omnes.

Blank. belg. 89. t. 11. f. F. *Testudo viridis.*

Gæd. belg. 1. p. 94. t. 43. *Testudo viridis,*

Lift. gæd. 286. t. 116.

Merian. eur. t. 115.

Frisch. germ. 13. p. 35. t. 29. *Coccionella clypeata* viridis.

Habitat in hortis in *Lycopo*, *Mentha* & aliis, ubi larva tecta incedit proprio stercore.

DESCR. Corpus ovale, superne convexum, inferne planum: convexa superficies constat elytris & clypeo viridiibus, levibus & æqualibus, ac si ex unica constarent crista, futura lambdoidea divisa. Abdomen totum nigrum & caput totum sub clypeo reconditum; antennæ filiformi-clavatae, pallide, superne fusce. Pedes pallidi. Elytra ad latera marginem prominulum exferunt & cum clypeo simul totum corpus tegunt, ut ne vestigium corporis.

378. CASSIDA nebulosa, pallida, ovalis; clypeo caput tegente integro.

Gæd. belg. I. p. 96. t. 44.

Lift. gæd. 287. t. 117.

mut. t. 17. f. 10.

Raj. inf. p. 88. n. 13. Scarabæus minor, sordide fulvus, punctis & maculis aliquot nigris temere sparsis notatus.

Habitat in hortis inter plantas oleraceas. e. g. *mellifera*.
DESCR. admodum similis est praecedenti, ut forte solo sexu differat; Est enim dimidio minor, colore pallidus, punctis inaequalibus nigris adspersus & inde nebulosus uti testudo. *Clypeus* lunam refert, antice minime emarginatus, totus laevis, nec maculatus, sed pallidus: *Elytra* vero punctis excavatis striata, striis curvis & flexuosis: *Corpus* nigrum, totum clypeo & elytris absconditum. *Antennæ* nigrae, filiformi-clavatae, margo coleopterorum, in hac, prominet ut in praecedenti.

379. CASSIDA atra; elytris striis quinque punctisque elevatis.

Aet. upf. 1736. p. 17. n. 3. Dermestes niger, punctis elevatis; collari cæsio.

Raj. inf. p. 90. n. 9. Scarabæus inter cadavera frequens depresso parum canaliculatus undique niger.

Habitat in casis *Lapporum*, & in *cadaveribus* ubique.

DESCR. *Corpus* ovale, parum oblongum; *Caput* ante clypeum insertum. *Clypeus* convexus, latus, antice truncatus, margine prominulus, superficie in aliis glabra atra; in aliis pubescere lanugine cælia & punctis prominulis duris tuberculata. *Elytra* striis quinque, elevatis, longitudinalibus (numeratis inclusive striis lateralibus, sine quibus striæ modo tres), inter singulas ordo longitudinalis punctorum elevatorum. *Alæ* nigricantes, ut & totum *Corpus* atrum (excepto in quibusdam cæsio clypeo aut capite), opacum, minimeque nitidum. *Antennæ* clavatae: articulo ultimo subrotundo, penultimo lenticulari, antepenultimo conico verticali. *Larva* glabra, ovato-oblonga, constans incisuris duodecim excepto capite & cauda, tota atra est; caput parvum. Deveniat apud Lappones eorum pelles & carnes, cumque iis habitat communiter in stragulis. consumit cum *Blatta* 2:da *Lapporum* pisces dum exsiccantur, brevi tempore, saepe omnes. apud nos circa cadavera frequens.

380. CASSIDA atra; elytris lineis tribus elevatis; antennis antice testaceis.

Frisch. germ. 6. p. 12. t. 5. Scarabæus campestris.

Habitat Aboæ, communicata a D. Starck, & Lundini a D. Leche.

DESCR. Tota nigra. in singulo Elytro striæ tres longitudinalis, elevatae, quarum extima major. antennarum tres extimi articuli ferruginei.

381. CASSIDA atra; elytris striis decem elevatis, punctis excavatis striatis.

Habitat interdum in plantarum acervis.

DESCR. Antecedenti similiima est, sed minor, angustior, tota atra, glabra. antennarum clypeique structura ut in praecedenti. Elytra singula striis elevatis decem, quas singulas punctorum excavatorum ordo distinguit.

382. CASSIDA nigra; elytris striis quinque utrinque dentatis; clypeo emarginato.

Act. upf. 1736. p. 17. Cassida nigra, clypeo emarginato, elytris punctatis.

Habitat communiter in sabulo & terra sicca.

DESCR. Corpus nigrum, minime nitidum, sed fere cinereo-sordidum. Caput maxima ex parte sub clypeo latet: antennæ clavatae: clypeus antice emarginatus: Elytra gaudent striis quinque (inclusive cum marginalibus,) elevatis, obsolete versus latera dentatissimis, punctata enim non sunt, sed quasi tuberculata s. punctata elevata striis adnata.

383. CASSIDA nigra, elytris striis quinque utrinque laevibus; clypeo emarginato.

Habitat in Drottningholm. B. Kallenberg.

DESCR. Convenit omnino cum praecedenti in omnibus, differt tantum striis Elytrorum laevibus, elevatis, acutis, minime dentatis. reliqua ut in praecedenti omnia.

384. CASSIDA nigra; antennis setaceis; corpore teretiusculo.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 5. Dermestes corpore oblongo, elytris striatis, capite clypeato.

Habitat in domibus, ubi vestimenta consumit. Mimum animal: cum quis hoc tangat, contrahit caput & pedes, ut caput clypeo muniatur, nec appareat; pedes lepide inflectit, ut femora quasi truncata conspiciantur; in hac ecstasi diutius commoratur, nec vi aut ulla tortura ad fugam vel motum minimæ fibrillæ adigi potest; neque aqua, neque igne, neque corrosivis spiritibus, nec ulla re irritari possunt nervi, quin hæc omnia perferat, licet moriatur. Solis tamen radios minus fert.

DESCR. Insectum teres, oblongum, atrum, opacum. Antennæ omnino setaceæ (non ut in cæteris clavatae). Elytra oblonga, flexilia, punctis minutissimis, excavatis, octo striarum. Clypeus subrotundus, magis latus quam longus, superne inæqualis margine cruciato prominulo: ad angulos thoracis posticos s. laterales sepe punctum villis flavum. Abdomen nigrum est, certo tamen ad lumen situ albus omnino adparet.

385. CASSIDA nigra; elytris lineis tribus elevatis, lævibus, spatio interjecto punctato; clypeo antice integro.

Habitat in sylvis.

DESCR. Clypeus parum convexus, antice minime truncatus, sed rotundatus; in singulo Elytro striae tres, æquales, elevatae, minime dentatae, præter marginis striam, quæ major prominet. Totum animal supra minutissimis excavatis punctis adspersum, atrum, depresso.

386. CASSIDA nigra; clypeo ferrugineo; elytris linea elevata.

Habitat Upsaliae.

DESCR. Reliquis sumillima, tota atra, sed clypeus antice truncatus, ferrugineus, pilis luteis. Elytra atra, in singulo stria unica, elevata, acuta, semel interrupta.

387. CASSIDA ferruginea; elytris punctis excavatis, striisque elevatis alternis. de Geer.

Habitat in Roslagia.

DESCR. Glabra, mediæ magnitudinis; margo thoracis & coleoptrorum pallidior.

Coccinella.

388. COCCINELLA coleoptris rubris: punctis duobus nigris.

Merian. europ. 3. p. 58. t. 35. f. infima.

Lift. loqu. p. 383. n. 8. Scarabæus alter niger exiguus, pennarum crustis miniatulis, in quibus mediis duas tantum maculæ nigræ.

Raj. inf. p. 86. n. 2. Scarabæus hæmisphæricus minor; elytris e flavo rubentibus, singulis maculis s. punctis nigris media parte notatis.

Petiv. gaz. p. 34. t. 21. f. 4. Coccionella anglica bimaculata s. minor rubra.

Bradl. natur. t. 27. f. 4.

Frisch. germ. 9. p. 33. t. 16. f. 4. Coccinella secundæ magnitudinis, punctis coleoptrorum duobus.

Habitat in Alno, ubi aphides devorat Larva.

DESCR. Abdomen, antennæ, pedes & omnia terram spectantia nigra. Thorax niger macula laterali alba. puncta duo alba minima ad basin Thoracis & totidem similia ad antennarum insertionem, Elytra rubra puncto, in utriusque medio, nigro.

389. COCCINELLA coleoptris rubris: lineis punctisque albis longitudinalibus.

It.

It. oeland. 148. *Coccionella coleoptris rubris: lineis quatuor albis longitudinalibus.*

Habitat in sepibus Oelandiae.

DESCR. Reliquis omnibus, hujus generis, nostris paullò major. *Elytra & thorax rubra, latera thoracis utrinque alba.* singulum *Elytron* notaçur duabus lineolis longitudinalibus albis, quarum interior puncto albido aucta est, vel, in medio interrupta, duobus punctis oblongis constans.

390. **COCCINELLA** coleoptris rubris: lineis quinque nigris transversis.

Raj. inf. 87. n. 9. Scarabæus hemisphæricus minor, elytris ex albo liventibus: lineolis nigris in medio dorso pictis.

Habitat in Lapponiæ desertis.

DESCR. Thorax niger lateribus albis: puncta duo alba ad antennarum exortum. *Elytra* rubra lineis tribus transversis latiusculis obtusis nigris, quarum quæ pectori proxima ambo elytra conjungit; duæ autem reliquæ posteriores ad marginem interiorem elytorum non extenduntur, hinc abruptæ in medio dorso.

391. **COCCINELLA** coleoptris rubris: punctis septem *Hollar. inf. t. 7. f. 8.* (nigris).

Alb. inf. t. 61. f. C.

Gæd. belg. 2. p. 58. t. 18.

*Lift. gæd. p. 268. f. 112.
mut. t. 17. f. 2.*

Mer. europ. 2. p. 24. t. 11.

Petiv. gaz. p. 33. t. 21. f. 3. Cochinella anglica vul-
gatissima f. rubra, septem nigris maculis punctata.

Raj. inf. 86. n. 1. Scarabæus subrotundus f. he-
misphæricus rubens major vulgatissimus.

Frisch. germ. 4. p. 1. t. 1. f. 4. Coccionella major.

Suecic Åkerhöns, Nyckelpiga, Jungfru Mariæ Höna.
Habitat in sepibus & agris vulgatissima, aphides de-
vastans.

DESCR. Caput nigrum: fronte punctis duobus albis.

Thorax niger, utrinque ad latera albus.

Elytra rubra, in singulo puncta tria nigra æqualiter remota; at ad basin e-
lytrorum punctum utraque elytra conjungens nigrum antice album.

Antennæ minimæ, clavatae. Animal subtus atrum.

Larva cinerea: maculis nigris & albis adspersa.

Puppa lutea, maculis nigris & quasi deusta, anō adfixa.

392. **COCCINELLA** coleoptris rubris: punctis quinque nigris. *Habi-*

Habitat in agris inter segetes.

DESCR. Facies & omnia eadem cum præcedenti; sed magnitudo minor, & in singulo elytro (excepta macula bateos nigro-alba,) duo puncta (non tria), quorum quod in medio majus, quod versus apicem minus: Species diversa est a præcedente, licet thorax & omnia simillima.

- 393. COCCINELLA coleoptris flavis: maculis quatuor rotundis, tribus oblongis. *De Geer.***

Habitat in sylvis.

DESCR. Oblonga: macula intermedia prima communis utrisque elytris; duæ aliæ transversæ longiusculæ.

- 394. COCCINELLA coleoptris rubris: punctis undecim nigris.**

Act. upsi. 1736. p. 18. n. 2. *Coccinella punctis undecim.*

Habitat in sepibus.

DESCR. Inter minimas hujus generis species hæc est. Puncta in singulo elytro quinque parva, sextum majus est sese extendens ad utrumque elytron. *Thorax* niger punctis duobus albis.

- 395. COCCINELLA coleoptris rubris: punctis tredecim nigris.**

Act. upsi. 1736. p. 18. n. 3. *Coccinella punctis duodecim.*

Habitat in sepibus.

DESCR. Corpus magnitudine inter maximas & minimas medium. *Thorax* niger lateribus utrinque albis cum puncto nigro. *Elytra* rubra: puncta in singulis sex nigra, quorum duo in medio elytri tere contigua; unicum punctum nigrum ad basin elytri connectit utramque crustam, adeoque impar est.

- 396. COCCINELLA coleoptris flavis: punctis quatuordecim nigris: quibusdam connatis.**

Habitat in Scania. *D. Leche.*

DESCR. est inter parvas sui generis. *Elytra* flava, quorum in singulo Puncta duo paria oblonga, distincta sutura longitudinali nigra, cum qua una in singuli elytri medio, connata quadrangularis, dein alia connata cum opposita in formam trianguli: punctum terminatrix elytri etiam adnexum suturæ longitudinali. *Thorax* a tergo postice testus macula magna nigra anterius tetraloba.

- 397. COCCINELLA coleoptris rubris: punctis quatuordecim albis.**

Lift. logu. 383. n. 10. *Scarabæus subrufus*, cui in humeris binæ maculæ, inque singulis alarum thecis septem maculæ albæ sunt.

Act.

Act. upf. 1736. p. 18. n. 5. Coccionella punctis quatuordecim.

Habitat in nemoribus & hortis.

DESCR. Magnitudo ad medias accedit. Thorax ruber lineola alba longitudinali in medio, et macula utrinque alba. Elytron singulum notatur VII punctis, eo ordine a thorace versus caudam numerando puncta, ut 1, 3, ½, 1.

398. COCCINELLA coleoptris rubris : punctis quindecim nigris.

Habitat in Horto academico rarius.

DESCR. Est inter majusculas sui generis. Caput nigrum. Thorax niger, utrinque albus, puncto nigro, ut in plerisque; in singulo Elytro anterius punctum 1, dein 3, iterum tria, postice nullum. his duplicatis (in binis scil. elytris) faciunt 14, adde unicum nigrum utrinque elytron tangens ad basin elytrorum. Abdomen & pedes nigri. in aliis ad apicem in singulo elytro lineola longitudinalis nigra.

399. COCCINELLA coleoptris rubris : punctis sedecim albis.

Habitat in *Lapponia Lulensi sylvatica*.

DESCR. Magnitudo & facies proxime praecedentis. Thorax ruber, puncto utrinque albo, absque ulla linea intermedia. Elytron singulum rubrum notatum punctis octo, a thorace numerando 2, 3, 2, 1.

400. COCCINELLA coleoptris rubris : punctis viginti ti albis.

Habitat in arvis.

DESCR. Magnitudine & facie cum praecedentibus duabus convenit. Thorax ruber ad marginem lateralem utrinque lineola arcuata alba notatus, inter has lineolas a tergo duo puncta alba minora superiora, & duo alba alia inferiora scil. elytris propiora pauloque majora: in singulo Elytro, quod rubrum est, puncta decem sunt alba, quorum duo in medio fere contigua.

401. COCCINELLA coleoptris flavis : punctis viginti duobus nigris.

Habitat in sepibus.

DESCR. Inter species minores numerari potest. Elytra singula flava punctis novem nigris distantibus, praeter duo vix conspicua obsoleta. Thorax notatur maculis septem, quarum infima reliquis major, duas autem primas, ad antennas, minimae. Subtus inspecta observatur margo coleoptorum prominens cum puncto nigro in medio utrinque. Abdomen, ut in reliquis, nigrum est.

402. COCCINELLA coleoptris rubris : punctis viginti quatuor nigris, quibusdam connexis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR.

DESCR. Inter minimas nostras numeranda. In singulo *Elytro* puncta duo distincta; dñe 4. quorum intermedia coalita; tum 3, coalita omnia, hinc quasi fascia; demum 2 puncta minora distincta.

403. COCCINELLA coleopteris rubris; punctis plurimis nigris, quibusdam connexis sutura longitudinali nigra.

Raj. inf. 87. n. 15. Scarabæus hemisphæricus flavus, maculis nigris variæ figuræ depictus.

Lift. loqu. 383. n. 9. Scarabæus luteus, nigris maculis distinctus.

Frisch. germ. 9. p. 34. t. 17. f. 6.

Habitat in arboribus.

DESCR. Thorax antice tuber, pone niger. Elytra rubra, maculis s. punctis plutinis (16.) quadratis, atris, connatis inter se cum margine interiorie coleopterorum nigro. differt iraque patinis a sequente. *LARVA* hujus hispida est.

404. COCCINELLA coleopteris flavescentibus, punctis plurimis nigris, omnibus connexis sutura longitudinali nigra.

Frisch. germ. 9. t. 17. f. 4. 5.

Habitat in sepibus.

DESCR. Præcedenti magnitudine & facie simillima, sed thorax, qui niger, ad latera majoribus albis maculis, & antice macula majori alba, & in medio versus elytron albus, includens inaculam duobus tribusque punctis nigris horatam. Elytra singula rubra notantur cruce, cujus radix (versus caudam) emarginato-bifida; maculae hic fere nullæ distinctæ, sed unnes in cruce in hanc coalitæ.

405. COCCINELLA coleopteris nigris; punctis viginti duobus albidis.

Habitat in Scania & Smolandia.

DESCR. Mediocris: Elytra singula undecim punctis flavescenti-albis.

406. COCCINELLA coleopteris nigris; punctis quatuordecim rubris.

Habitat in sepibus.

DESCR. Est inter minores species numeranda. Elytra nigra cum tribus paribus punctorum rubrorum & ultimo adhuc impati. Thorax nigricat cum puncto utrinque rubro.

407. COCCINELLA coleopteris nigris: punctis sex rubris.

Raj. inf. p. 87, n. 4. Scarabæus hemisphæricus minor,

nor, elytris nigris (*non* deleatur) rubris maculis
pictis.

Habitat in arboribus sat rara.

DESCR. Thorax totus niger. Elytra atta, nitida, singula tribus punctis sanguineis, quorum quod thoraci proximum majus est; ultimum punctum versus ipsum apicem elytri situm, at intermedium proprius margini interiori, quam extriori collocatum, varietatem absque tertia macula apud D. de Geer vidi.

408. COCCINELLA coleopteris nigris; punctis quatuor rubris.

Habitat in *Urtica* majore, *Rubo*; aliusque.

DESCR. Inter minores est, ovata, nitida, atra. Caput atrum. Thorax ater cum pari punctorum excavatorum a tergo. Elytra nigra, singula juxta basin ad marginem exteriorem macula minore rubra cum puncto ferrugineo, & alia minore, in medio elytri, versus marginem interiorem, idem rubra.

409. COCCINELLA coleopteris nigris; punctis duobus rubris.

Frisch. germ. 9. p. 34. t. 16. f. 6. Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsalibus.

Habitat in *Sorbo*, mense septembri, Fahlunæ.

DESCR. Est magnitudine mediocris, antecedenti similissima, ambitu ferre orbiculata, tota nigra, nitida, margine prominulo. Thorax absque maculis. Elytron singulum in medio fert maculam s. punctum latum sanguinem. Abdomen inferius rufescit, alias tota subtus nigra. Tergum sub elytris etiam sanguineum. PUPPA hispida est.

410. COCCINELLA atra glabra; elytris abdomine brevioribus margine inflexis.

Act. upf. 1736. n. 10. Dermestes subrotundus ater nitidus; elytris brevibus.

Habitat in terra, arena, stercore equino passim.

DESCR. Corpus quadratum, atrum, nitidum, glaberrimum. Elytra abdomine breviora, parum truncata, glaberrima, integerrima; striis aliquot vix manifestis. Thorax laevis, non striatus, sed linea excavata ambiante notatus. Caput omnium minimum, quod terrefacta totum intra thoracem retrahit, ac si decoillata esset, nec, ut caput exstret, ullo tormento adigitur. Os forcipatum dentibus duobus acutis. Antennæ clavatae, integræ. Posteriora abdominis truncata, glabra, elytris paulo longiora, obtusissima. facies recedit a reliquis & convenit cum Dermeste vel Scarabeo.

411. COCCINELLA villosa, coleopterorum margine infexo, thoracis macula baseos utrinque alba.

Habitat cum præcedenti.

DESCR.

DESCR. Sequenti adeo similis est, ut pro eadem facile haberri queat, licet triplo minot. Tota nigra est ex punctis vix conspicuis, fuscis & albis nebulosa facta, thorax utrinque verius basin maculam albam fert, & duo puncta alba majora in medio elytrorum, in singulo unicum; subtus tota albicat. Thorax, caput & antennae nigra.

412. **COCCINELLA** villosa, coleopterorum margine inflexo, futuris rubris.

Raj. ins. p. 85. n. 37. Scarabæus patvus, corpore subrotundo, collo oblongo, alarum elytris nigris binis punctis albicantibus notatis.

Act. upf. 1736. p. 18. n. 3. Gyrinus nigricans major.
Habitat frequens in *Scrophularia* 520,

DESCR. Raji descriptio optima est. Abdomen album. Corpus ovatum. Thorax latus, convexus. Elytra nigricantia, albedine adspersa. Sutura elytrorum tam inter se, quam illa cum thorace, rubra. Antennæ clavatae, integræ, nec fissæ. Hæc & precedens a reliquis facie tota recedunt, cum quasi hisfusæ sint, nec margine elytrorum conspicuo aut reflexo notentur.

Chrysomela.

413. **CHRYSOMELA** atra; punctis excavatis contiguis.

Habitat in *Tanaceto* 666. in insula Gotlandiæ versus austrum *Heligholmen* dicta, copiose, ut & ad fodinas lapideas *Burswiken*, tarde admiodum incedens.

DESCR. Est e majoribus hujus generis. Tota atta, minime nitida. thorax & Elytra punctis minutissimis confertissimis excavata. Elytra satis flexilia, mollia & obtusa sunt. Antennæ undecim articulis. Margo elytrorum prominens.

414. **CHRYSOMELA** nigra glabra; antennarum basi subflava.

Habitat in *Roslagia*. de Geer. in *Scania*. D. Leche.

DESCR. media, punctis nec contiguis, nec striatis in elytris. color dein patum ad cæruleum vergit.

415. **CHRYSOMELA** nigro-purpurea, punctis excavatis striata.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Attelabus cærulæus nitidus oblongiusculus, subtus niger.

Habitat in *Betula*, cuius foliis pascitur. Larva degit sub foliis Betulæ, cuius inferior superficies ab ea consumitur, relictis nervis vel vasis foliorum crassioribus durioribusque, nec

non epidermide seu superficie folii superiore cœlum spectante, hocce dum nutritur pabulo Abdomen s. caudam multoties adtollit & erigit. Consumta sic foliorum pulpa, maculam pallidam exsuccam ostendit folium; hincque autumno vel Augusto Betulæ folia sæpe maculantur. Ova plumbæ, globosa, numerosa, juxta se invicem collocata, nitida sæpe reperiuntur in inferiore foliorum superficie.

DESCR. Insectum atro-cæruleum ad purpuram vergens, seu proptie violaceum floris violæ martiæ omnino colore; solus venter, pedes & antennæ nigra. *Caput & thorax* punctis excavatis minutissimis inordinatis fere contiguis adspersa; at *Elytra* striis vix oculis percipiendis, ex punctorum excavatorum minutissimorum serie, notantur, quibus, ut & parvitate a sequenti differt.

LARVA satis similis facie est Coccinellarum Erucis; incisuræ singulæ in medio, verrucarum ordine transversali instruæ, quæ verrucæ apice pilosæ sunt & humorem excernentes. Abdomen pallidius est, etiam verrucosum. Larva degit sub foliis Betulæ.

416. **CHYSOMELA** nigro-purpurea, punctis excavatis adspersa.

Frisch. germ. v. 7. p. 13. t. 8. **Scarabæus alni cærulus.**

Habitat in *Alno* frequens vere, cujus folia consumit.

DESCR. Antecedenti Betulæ Chrysomelæ adeo similis est, ut ovum ovo, modo major, & elytris quidem punctis excavatis, sed sparsis, nec uti Betulinæ in strias longitudinaliter digestis. *Caput & thorax* subtus, uti & pedes & antennæ, nigra sunt. Color violæ martiæ odoratæ.

417. **CHYSOMELA** nigro-purpurea; thorace utrinque luteo: puncto nigro.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 5. **Chrysomela violaceonigra, collari margine rubro.**

Habitat in *Salice.*

DESCR. Magnitudine & facie Chrysomelæ alni simillima; color omnino idem. *Elytra* punctis minutissimis excavatis adspersa; quæ puncta vaga, nec striatum digesta sunt. *Thorax* latus & glaber est, ad latera ruber, in medio longitudinaliter violaceus, uti elytra, aut paullo magis nigricans in medio. *Caput, pedes, Abdomen* nigra. Punctam nigrum, in medio coloris lutei ad thoracis latera.

418. **CHYSOMELA** viridis nitida; thorace æquali; elytris punctis excavatis contiguis; pone dehiscentibus.

Act.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 2. Chrysomela viridis nitida.Habitat in *Salice*.

DESCR. Insectum sericeo-viride, punctis, si lente observentur, contiguis, seque invicem tangentibus, excavatis; versus anum obtusum est animal; elytra pone dehiscent. Thorax æqualis minus punctatus, antennæ & pedes nigricantes; sequenti dimidio minor.

419. CHYSOMELA viridi - cærulea.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 1. Chrysomela viridi-cærulea
nitida.

Habitat copiose in pratis & agrorum marginibus primo vere juxta urbem *Hernosand* Angermanniae, ubi eandem mense majo 1732 legi.

DESCR. Est animal e majoribus hujus generis, admodum convexum. Totum e viridi & cæruleo colore sericeum s. auratum. Elytra margine parum prominent & punctis minutissimis excavatis distincta, nec contiguis (ut in antecedentij adspersa, admodum convexa sunt hæc elytra, & proin subtrus magis concava. Antennæ & pedes virides. Abdomen viride.

420. CHYSOMELA viridis nitida; thorace antice excavato. *de Geer.*Habitat in *Roslagia*.

DESCR. Tota nitida. Thorace antice non æqualiter truncato, sed sinu excavato.

421. CHYSOMELA viridis nitida; thorace antice æquali; elytris pone contiguis. *de Geer.*Habitat in *Roslagia*.

DESCR. Minor est præcedenti & teretior.

422. CHYSOMELA obscure testacea. *Act. upf. 1736.**p. 17. n. 3.* *CHYSOMELA obscurata*
Habitat in *ligno putrido* primo vere.

DESCR. Inter majores generis species numeranda est. Color totius corporis, elytorum, thoracis, antennarum, abdominis & pedum unicus idemque obscure testaceus, s. castaneus; sed omnium simillimus est semini Staphyleæ s. Staphylodendri, nec novi aliud hujus singularis coloris, a quo similitudinem defunam Antennarum extimus articulus ovatus est, reliqui breviores. Elytra punctis minutissimis inordinatis excavatis adspersa. Thorax utrinque margine crassiæculo notatus, & utrinque macula depresso. Corpus ovatum. oculi soli nigri. Antennæ & Pedes magis rubent. plantæ pedum subtrus albae.

423. CHYSOMELA pallido-grisea.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Color griseus s. testaceus toto corpore; præcedenti simillima, sed paullo minor; plantæ pedum subtrus exalbescentes: oculi nigri; præcipua nota, qua a præcedenti differt, (præterquam colore longe pallidiore) conficit

sistit in singulis elytris punctis per 9 ordines longitudinaliter digestis, cum in praecedente puncta sparsa, nec per strias distributa,

424. CHRYSOMELA nigra; thorace elytrisque griseis.

Act. upf. 1736, p. 19. n. 6. Attelabus subrotundus griseus.

Habitat in *Lilio.*

DESCR. Thorax & Elytra grisea, mollia, flexilia, pellucida, punctis minutissimis confertissimis excavatis adspersa. Caput nigrum, ut & antennae, pedes & ipsum corpus. magnitudine reliquis plerisque cedit.

425. CHRYSOMELA rubra, thorace cylindraceo utrinque impresso.

Blank. belg. 91. t. 11. f. 7.

Mer. eur. 71.

Reaum. gall. 3. t. 17. f. 1. 2.

Habitat in *Lilio, Convallaria* 273, cuius larva tecta legitur proprio stercore.

DESCR. Inter mediocres magnitudine est collocanda. Rubra sunt Thorax, elytra, caput superne, pedes. Nigra vero antennae, oculi, pedum genicula, abdomen, scutellum, caput subitus, ut & thorax subruber. Thorax elytris longe angustior, teres, sed ad utrumque latu[m] cavitate impressa notatus. Elytra punctis minutissimis excavatis striata sunt. *VARIAT* capite & pedibus nigris.

426. CHRYSOMELA ænei coloris.

Habitat in *Salice* frequens.

DESCR. Hæc mediocris magnitudinis, tota e rubro ænea s. ænei politi coloris.

427. CHRYSOMELA viridi - ænea: elytris rubicundis.

de Geer.

Habitat in nemoribus *Rostlagiæ*, de Geer. in *Scania*.

D. Leche.

DESCR. Media. Caput & thorax pulchre nitent, elytra rubro-testacea apice bus immaulatis.

428. CHRYSOMELA nigro-cærulea, elytris rubris apice nigris.

It. æl. 38. Chrysomela thorace viridi cæruleo, elytris rubris apice nigris.

Habitat in *Populo*, cuius folia consumit, primo vere frequens, unde foliorum sceleta quasi ex retibus facta, foliis vasis constantia.

DESCR. Inter maximas hujus generis hæc est. Elytra rubra, punctis mi-

nutissimis excavatis adspersa. apex elytrorum minimam maculam nigram habet. Thorax glaber, viridi-nigroque cæruleus, ut & scutellum & abdomen, & Caput & pedes. antennæ magis nigricantes. margo thoracis linea impressa distinctus. margo elytrorum inflexus corpus arête ambiens. ala & dorsum nigricantes. variat elytris rubris & flavis, forte sexu?

Antennæ Chrysomelæ hujus non lamellatae sunt, uti à Listero descriptæ, sed ut in reliquis *ix* articulis filiformes, infimo majori.

LARVA taeta dimitit oleosum quoddam flavescens, fœtidissimaque est, ut nullo modo ferri queat.

429. CHYSOMELA thorace elytrisque rubris.

Habitat in *Salice* foliis hirsutis 811.

DESCR. Corpus totum nigrum, uti caput, antennæ, abdomen, pectus subitus, pedes; at thorax ruber est cum duebus punctis fuscis juxta elytra, & elytra ipsa rebra; in singulo elytro 9 ordines punctorum minutissimum vixque conspicuorum.

LARVA nigra est, & valde rugosa.

PUPPA vero flava.

430. CHYSOMELA thorace rubro cylindraceo punctis duobus nigris; coleopteris flavis cruce nigra,

Frisch. germ. I. p. 27. t. 6. Scarabæus cruciatus, ex cruci Asparagi.

Habitat in *Asparagi* 272 ramis, quos consumit Larva, apud nos etiannum rarissima, Hamburgi autem vulgatissima, Asparagum devastans, e Russia cum eo adlata, ut ab Hortulanis creditur.

DESCR. Est præcedentibus & minor & longe angustior. Caput nigro-cæruleum. Antennæ nigrae. Thorax angustus, cylindraceus, punctis duobus nigris a tergo. Elytra oblonga, flava, versus marginem exteriorem secundum totam longitudinem fulva. macula cruciformis cærulea tegit coleoptera, cuius truncus incumbit margini elytri utriusque interioris secundum totam longitudinem; at rami breves sunt, nec marginem exteriorem elytrorum adtingunt; ad basin elytri macula oblonga cærulea, quæ non conjungitur cum cruce; versus apicem elytri punctum cæruleum rotundatum, quod sepe adnascitur basi crucis.

LARVA nigro-fusca glabra.

431. CHYSOMELA thorace viridi; coleopteris rubris, cruce cærulea.

Act. upf. 1736. p. 17. n. 4. Chrysomela viridi-aurea rubro variegata.

Habitat in *Lapponia Umensi.*

DESCR. Figura & facie ad Chrysomelam Populi quodammodo accedit. Caput & thorax colore æneo-viridi, antennæ nigrae, congeneribus simillimæ; pedes nigri maxima ex parte. Elytra autem maxime singularia & pulcherrima; colore dilute rubra, fasciis æneo-cæruleis picta, ita ut macula ad basin elytri subrotunda, nec connexa cum reliquis, nisi cum thorace. Margo interior elytrorum secundum longitudinem æneo-cæruleus, in medio

medio elytri fascia linearis transversa, utrinque margine repanda, conicit cum macula longitudinali, secundum marginem interiorem excurrente, crucem. Inter ramos hujus crucis & apicem elytrorum, seu pone fasciam intermediam est arcus fere circularis, reliquis maculis cōcolor, cuius alterum crus innascitur macula longitudinali ad marginem interiorem elytrorum, altero cruce libete anumque respiciente. Caput, thorax & elytra punctis minutissimis excavatis inordinatis adspersa sunt.

432. CHRYSOMELA oblonga nigra; coleopteris rubris, maculis quatuor nigris.

Habitat in sylvis *Lößstadiensibus*, de Geer; in *Upsaliensisibus*, E. Ekelund.

DESCR. Major reliquis omnibus, teretior, oblongior; in singulo *Elytro* puncta majora duo, quorum prius magis ovatum, posterius majus transversum. *Antennae* fere pectinate, *Thorax* brevis.

433. CHRYSOMELA oblonga fusca; elytris littera S albo.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. *Thorax* griseus albidis pilis: *Elytra* griseo-fusca cum macula alba, utrinque acuta, rhombaea, in medio futuræ; mox macula trigona, a pice posteriora spectante; tum fascia transversa, & ultimo macula in medio futuræ. omnes haec maculae albæ. Magnitudo totius est seminis Carvi.

434. CHRYSOMELA elytris fuscis pone lividis.

Habitat in *Scania*.

DESCR. Magnitudine pulicem vix superat, corpus nigrum, thorax & elytra fusca, sed elytra pone magis pallida & livida.

435. CHRYSOMELA livida; oculis nigris, de Geer.

Habitat in *Pado* foliis annuis 396.

DESCR. parva: tota pallida s. livida.

436. CHRYSOMELA supra rufa; thoracis punctis nigris duobus, elytrorum pluribus. de Geer.

Habitat in *Populo*.

DESCR. Mediae Magnitudinis. *Corpus* nigricans: puncta nigra in *Elytris* singulis 3 vel plura.

437. CHRYSOMELA supra nigro-aenea; margine coleopterorum luteo.

Raj. inf. 99. Scarabæus antennis clavatis tertius.

Habitat in *Ostrogothia*, de Geer. in *Scania*. J. Leche. *Upsaliæ* in *Ranunculo echinato* 470. Nos.

DESCR. Mediae magnitudinis: margo exterior elytrorum & Thoracis flavescens; thorax & caput nigro-aenea; subr. tota atra. *corpus* oblongum est. pedes nigri.

438. CHRYSOMELA nigro-aenæa, elytrorum lineis duabus luteis.

Habitat Upsaliæ. *P. Kalm.*

DESCR. oblonga admodum est, tota supra nigro-aenea, thoracis margine laterali flavo & singula elytra in medio & margine exteriore linea longitudinali flava. tibiæ & femorum interior pars flava; antennæ clavatae.

439. CHRYSOMELA thorace nigro; coleopteris rubris; cruce nigra.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Necydalis collaris nigro; elytris testaceis, fascia nigra.

Habitat -

DESCR. Est inter medias numeranda. Corpore angusto & oblongo. Antennæ; Caput, thorax, abdomen nigra. Alæ albae. antennæ angustiores quam in reliquis. Thorax punctis scaber. Elytra dilute rubra striis octo vel pluribus, punctis minutissimis exarata. basis & apex elytrorum nigra; fascia transversa nigra margine inaequali in medio elytra ambit. sutura elytrorum (seu margo interior) nigra, conficiens cum fascia transversali intermedia crucem,

440. CHRYSOMELA cæruleo-viridis, thorace femoribusque ruffis.

Act. upf. 1736. p. 19. Attelabus subrotundus cæruleo-nigricans; collaris testaceo.

Habitat frequens ruri, nidificat in gallis Salicis.

DESCR. Inter minores est hæc numeranda. Caput & Elytra nitida, viridi-cærulea, punctis sparsis excavatis. Thorax minor viridi-ruber seu testaceo-ruber, crassus, convexus; Antennæ nigrae, subclavatae. Femora rufa: palma nigra.

OBS. Differt hæc in paucis a Carabo capite elytrisque cæruleis, thorace rubro, quod hæc brevior sit; quod collare non cordatum, ut in Carabo; quod antennæ subclavatae, nec, ut in Carabo filiformes; & denique quod insinua internodia antennæ in hac nigra sint, in Carabo aurea isto testacea seu rubra. Abdomen a tergo flavum, subitus nigro-cæruleo-scens.

441. CHRYSOMELA dilute testacea hemiptera.

Habitat in floribus maxima saepe in copia.

DESCR. Magnitudo pediculi. Corpus oblongum, laxe, Antennæ parum clavatae. Elytra non striata & truncata, abdominis duobus articulis breviora.

442. CHRYSOMELA testacea oblonga; elytris acuminatis.

Habitat in arboribus.

DESCR. Est inter omnia Coleoptera minima, utpote quæ pediculo quadruplo minor. Tota testacea, antennæ filiformes, minus capitatae quam in præce-

præcedenti. *Elytra* dein non obtusa, sed acuminata caudam tegunt; thorax marginatus fere, ut in *Carabis*.

443. CHRYSOMELA fusca; capite nigricante.
Habitat in *feneſtris* vere.

DESCR. Corpus totum pulice minus est, oblongum, nec obtusis elytris; pedes pallidiores ipso corpore. color corporis totus e nigro castaneus, excepto capite nigricante.

444. CHRYSOMELA coleopteris fascis, margine flavo-pallidis. de Geer.

Habitat in foliis *Nymphææ* 426. 427; circa 24 Junii in copula frequenter observatur, præsertim in fluvio Upsaliensi, ignavum maxime & tardum animalculum.

DESCR. Est mediæ magnitudinis. Caput fuscum: thorax subflavus, inæqualis. Elytra planiuscula nigra, opaca, punctis excavata; margine laterali & postico (non vero versus suturam) flavo. Pedes flavi. antennæ nigro & flavo alternatae, corpore dimidio breviores. alæ fuscæ, venis nigris. Abdomen a tergo flavescens linea transversa, nigra, lata, in singulo segmento, at latere terram spectante nigrum.
LARVA nigra est, glabra, subitus flava.

Curculio.

445. CURCULIO fuscus, oblongus; elytris rectis acuminatis.

Aet. upf. 1736. p. 16. n. 1. Curculio acuminatus, longus, fuscus.

Habitat *Fablunæ*.

DESCR. Est maximus inter Svecanos nostros. rostrum longum, teres. thorax punctis excavatis. Elytra minus, quam in reliquis, gibba, recta, in apicem seu angulum acutum definentia, oblonga, singula striis decem longitudinalibus exarata & simul excavato-punctata; haec striæ coēunt per paria ante apicem in singulo elytro. Totum Corpus atrum, villis conspicuis cinereis testum, hinc totum cinereum. Antennæ magnæ, infuso articulo longissimo, rufescente.

446. CURCULIO subfuscus; elytris fasciis nebulosofestaceis.

It. ad. 26. Curculio subfuscus, elytris fasciis duabus festaceis.

Lift. loqu. p. 393. n. 29. Scarabæus majusculus scaber e leucophæo nigroque varius.

Pet. gaz. p. 14. t. 8. f. 6. Curculio norweticus niger, signaturis flavelcentibus adspersus. Habi-

Habitat in *Serratula* 662 (quæ *Carduus* in avena) frequentissimus apud nos in agris; tarde incedit, arcte apprehendit, tenaciter adhaeret, ore frustra cutem mordere tentat captivus.

DESCR. Versus unum valde gibbum est abdomen a tergo. Animalculum totum e griseo nigrum; totum corpus, rostrum, thorax, elytra & pedes punctis minutissimis contiguis excavatis. Signaturæ aliquæ testaceæ in thorace ex villis tenuissimis, similes etiam in formam fasciarum duarum transversarum linearium, quarum quæ thoraci propior ad suturam elytrorum interrupta est; antennarum apices flavescunt.

LARVA rete subglobosum in foliis texit, intra quod mutatur.

447. CURCULIO griseus; macula ferruginea elytrum.

Habitantem reperi in *Salice*.

DESCR. Est præcedenti similis, sed dimidio minor, totus griseus e cano & griseo mixto: antennæ nigrae. Rostrum thorace fere longius. thorax griseus, a tergo in medio pari punctorum alborum & vix conspicuorum. Elytra e cano & griseo mixta intime, cum macula magna ferruginea in anguli elytri medio. Scutellum seu apex thoracis albus est.

448. CURCULIO albo nigroque varius; proboscide planiusculo carinato thoracis longitudine. de Geer.

Frisch germ. II. p. 32. t. 23. f. 3. Curculio brevi-rostris.

Habitat in *Roslagia*.

DESCR. Facies præcedentis, sed color ex niveo & nigro varie mixtus.

449. CURCULIO æneo-fuscus; rostro thorace breviore.

Act. upsi. 1736. p. 16. n. 2. Curculio acuminatus oblongiusculus æneo-fuscus.

Lift. logu. p. 394. n. 31. Scarabæus majusculus e. nigro rufescens. an?

Habitat apud nos sat frequens.

DESCR. Rostrum depresso, capite ipso fere brevius. Caput & thorax punctis minutissimis inæqualia. Elytra oblonga, striis septem profunde excavata, interjectis striis (fere elevatis) crenatis. Capiti, thoraci & elytris, (quæ omnia nigra) infidet pilus vix conspicuus aureo-igneus. Pedes & antennæ rufescentes, infimo articulo longissimo. Femina marito duplo major.

450. CURCULIO rostro thorace breviore; corpore griseo; thorace tribus striis pallidioribus.

Habitat in hortis & pratis frequens.

DESCR. Pediculo duplo major. Corpus totum griseum. antennarum inflatum

mus articulus rufescens, *thorax* lateribus & dorso niger, intra quam nigredinem color griseus striarum instar ducitur, unica linea in tergo, & dein unica in utroque latere, hinc *thorax* quasi fuscus lineis tribus longitudinalibus pallidis s. cinereis exaratus; *oculi nigri*; *elytra* cinerea, singula striis & exarata, *rostrum* breve, extra antennas brevissimum & fere nullum.

- 451. CURCULIO** ater; proboscide thoracis longitudine. de Geer.

Habitat in *Roflagia*.

DESCR. Mediae magnitudinis; punctis excavatis striatus.

- 452. CURCULIO** cinereus oblongus; elytris obtusifusculis.

Lift. loqu. p. 394. n. 30. Scarabæus fuscus, lanugine incanus.

Habitat frequens in herbidis.

DESCR. Est præcedentibus paulo minor, oblongus, ater, sed tenuissimis pilis undique adspersus, hinc cinereus ad nigredinem vergens. *Elytra* oblonga, non acuta, ut in prima specie, striis ad summum oculo punctato-concavis. *Pedes* elytris concolores. *antennæ* versus basin rufescunt, infimo articulo longissimo.

- 453. CURCULIO** cinereus, oblongus; pedibus rufis.

Habitat

DESCR. Antecedenti adeo similis figura, magnitudine & colore, ut pro eodem haberi possit, sed pedes, tibiae & femora testaceo-rubra nuda, nec ullis villis cinereis adspersa; *ungulæ* s. duas squamæ, in omnibus pedibus ad exorum unguium, sole nigrae sunt. *antennarum* infimus articulus longissimus. an præcedentis fæmina?

- 454. CURCULIO** griseus nigro-nebulosus oblongus; pedibus antennisque subfuscis.

Habitat in Rumice 292 293, folia consumens subtus, unde foliorum maculæ & vitia; delitescit sub foliis & ibi nidum figit reticulare flavum, intra quod mutatur.

DESCR. Mediae magnitudinis; *Rostrum* fere longitudine thoracis; *Coleoptera* subacuminata; denticulus nullus in femore anteriore, licet crassiore.

LARVA supra fusca: subtus flava, demis tribus primis segmentis corporis,

- 455. CURCULIO** viridis opacus; pedibus antennisque magis fuscis.

Habitat

DESCR. Mediae magnitudinis, non nitens, striatus; color dilute viridis antennæ rufescentes.

456. CURCULIO cæruleo-viridis nitens; antennis atris.

Pet. gaz. p. 77. n. 6. Curculio parvus splendide viridis. (figura Petiveri nobis deest)?

Frisch. germ. 12. p. 17. t. 8. Scarabæus nasicornis purpureo-auratus.

Habitat Fahlunæ in Betulis.

DESCR. Est e mediæ magnitudinis speciebus hic Curculio. *Totus capite, thorace, rostro, elytris; abdoinine, pedibus cæruleo-viridi-inauratus seu sericeo nitidissimus. versus posteriora admodum obtusus. Totum corpus punctis minutissimis excavatis perfusum. oculi & antennæ solæ nigrae; humum infimus articulus reliquis nullo modo longior est, ut in reliquis, clavatae tamen sunt antennæ, ut in congeneribus.* Hic minime salit.

457. CURCULIO purpureus nitens. de Geer.

Pet. gaz. 35. t. 22. f. 5. Curculio miniatus minimus.

Lift. loqu. 394 Scarabæus ex toto coccineus.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Minor precedenti; rostrum longissimum.

458. CURCULIO femoribus anticis denticulo notatis; corpore griseo-nebuloso.

Frisch. germ. 1. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arboreis.

Habitat in floribus arborum.

DESCR. Pediculo paullo major. Totis nebulosus s. griseo-cinereus, fascia duplice transversa supra elytra, quarum antica ad angulum rectum, in medio, ad juncturas futurarum, pone coit, & alia fascia fusca posterior magis transversa, ad apicem Thoracis a tergo punctum album. *antennæ pedesque subfuscæ: in femoris primi paris latere interiore versus apicem denticulus robustus, qua nota manifeste differt ab aliis.*

459. CURCULIO femoribus omnibus denticulo notatis; corpore viridi oblongo. de Geer.

Habitat in Urtica.

DESCR. Media magnitudinis. corpore oblongo: Rostro thoracis longitudo coleopteris pone acutiusculis.

460. CURCULIO subglobosus, punctis duobus nigris futuræ longitudinalis coleopterorum; thorace ex-albido.

Reaum. gall. v. 3. t. 2. f. 12.

Act. upf. 1736. p. 16. n. 5. Curculio globosus, proboscide reflexa.

Lift.

Lip. loqu. 395. Scarabætus exiguus cinereus, duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus.

Habitat in *Scrophulariæ* 520 pericarpiis immaturis, nido globosum inflatum testaceum inter capsulas, capsulis similem, e vesica testacea formans; nec non in variis speciebus *Scrophulariæ*, licet rarius in reliquis.

DESCR. Rostrum nigricans, thorace longius, quod terrefactus sub ventrem maxime inflectit. Thorax exalbidus, pilis cinereis vestitus, cuncta maculis duabus atris a tergo. Elytra glabra, sulcata, cinereo-testaceæ singula striis quinque, interjacentibus lineis elevatis nigris, albis punctis; in medio dorso, clavis elytris, inque ipsa futura, punctum atrum cum puncto albo adnexo a parte postica; pone hunc punctum aliud punctum nigrum in ipsa futura coleopterorum versus anum albedine cinctum. antennarum infimus articulus longus. Pedes nigri: planta ferruginea. LARVA livida, gelatina tota oblinita limacis instar; capite nigro.

461. CURCULIO subglobosus fusco-nebulosus: macula cordata alba in medio dorso.

Att. upf. 1736. p. 16. n. 7. Curculio minimus, cinereus, subrotundus, obtusus.

Habitat etiam sœpe in *Scrophularia* 520.

DESCR. Est magnitudine seminis Sinapis albi: totus e nigro & fusco mediis, scaber, stiatius, vellere cinereo raro adipersus, ad suturas elytrorum juxta thoracem in medio dorso macula alba, ex lineulis in singulo elytro eodem in loco alba. antennarum infimus articulus longus: sœpe ante maculam cordatam albam observatur punctum nigrum: sœpe etiam versus caudam propius macula alba.

462. CURCULIO rufo-testaceus oblongus: thorace elytrorum fere longitudine.

Raj. inf. 88. Scarabæus parvus sordide s. obscure fulvus, proboscide longa deorsum arcuata.

Habitat in *Segetum* seminibus, quibus vescitur.

DESCR. Totus omnibus partibus concolor, rufo-testaceus, corpus admodum oblongum est, & quod in hac specie singulare est, thorax valde longus & magnus, ut fere longitudinem elytrorum (non tamen omnino) adtingat. Thorax punctis excavatis adipersus; & Elytra striis excavata, magnitudo pediculi.

463. CURCULIO piceus, ab domine ovato.

Habitat in *Tetradynamiis* frequens.

464. CURCULIO piceus; elytris oblongis: femoribus clavatis.

Habitat in *Framenti* seminibus, quæ devastat.

DESCR.

DESCR. Magnitudine majoris pediculi, cylindricus, oblongus, rufo-niger s. piceus; *elytris* striatis; *thorace* oblongo cum capite longitudine corporis: *femora* omnia clavata cum pedibus obscure ferruginea.

465. CURCULIO ater; coleopteris oblongiusculis opacis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Pulice duplo maior. *totus* ater, *elytris* punctis striatis opacis, nec ullo modo nitidiusculis.

466. CURCULIO ater; coleopteris nitidiusculis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Pulice dimidio minor. *totus* ater, sed *elytra* punctis striata, nitidiuscula; praecedenti quadruplo minor. *abdomen* cum *elytris* ovatum.

467. CURCULIO ater; elytris nigro-cærulescentibus.

Habitat in sepibus.

DESCR. Magnitudo pulicis. *Caput*, *thorax* & *pedes* atra, punctis minimis excavatis adpersa. *Elytra* violacea s. e nigro cærulescentia, punctorum excavatorum striis exarata. Non salit.

468. CURCULIO nigro-cærulescens.

Habitat in sepibus.

DESCR. Magnitudo pulicis. *Caput*, *thorax*, *femora* nigro-cærulescentia, sed *Elytra* magis saturata, punctorum excavatorum striis exarata. Non salit. praecedenti simillimus, sed paullo major. Corpus (exceptis *elytris*) non ut in praecedenti atrum. an iuxta vel etatis discrimen?

469. CURCULIO ater, femoribus exalbidis.

Habitat - - -

DESCR. antecedenti magnitudine ac figura simillimus, sed *Elytra* attra striata, minime cærulescentia. *femora*, saepe & *tibiae*, pallida s. ex albo flavo; *antennæ* nigrae, infimo articulo pallido, vix reliquis longiore. *Caput* & *thorax* punctis excavatis.

470. CURCULIO cinereus; elytris macula nigra; tibiis pallide flavis.

Habitat in *Salice*.

DESCR. Nec haec species pediculum magnitudine superat. *Caput* & *rostrum* atrum, glabrum. *thorax* niger villis cinereis vestitus. *Elytra* singula nigra, striata, villis cinereis vestita, singula in medio macula nigra notata. *femora* nigra. *Tibiae* & *pedes* pallide flavi. *antennæ* flavæ, articulo infimo cæteris non longiore.

471. CURCULIO cinereus; pedibus rufis.

Habitat in terra exarida.

DESCR. Magnitudo pulicis: *totus* cinereus; *elytra* striata, lateribus punctis prominulis scabra. *pedes* patrum rufescunt.

472. CURCULIO cinereus, fasciis longitudinalibus dilutioribus.

Habitat infer glaream.

DESCR. Magnitudine pediculum superat: totus omnibus partibus obscure cineretis: linea longitudinalis dilute cinerea a rostro ad elytra dueitur in medio dorso, elytra tamen non tangit. Linea alia cinereo exalbida ab oculo per latus thoracis & elytrotum recta ad anum utrinque tendit; subitus totum animal dilutius cinereum est. oculi nigri. antennae cinereæ, capitate, infimo articulo longo; ad basin antennatum in capite lineola atra. rostrum breve, non multum productum.

473. CURCULIO lividus; coleopteris maculis quatuor obscuris. de Geer.

Habitat intra folia Alni.

DESCR. Saltatrix. magnitudo pediculi: maculae in singulo elytro duæ.

474. CURCULIO sanguineus. de Geer.

Leuw. arc. 1687. aug. 6. p. 83. f. i.

Habitat in frumento.

DESCR. Pediculo paullo major.

475. CURCULIO niger; elytris in medio rufescensibus.

Att. upf. 1736. p. 16. n. 6. Curculio minimus fuscus, lateribus rufescensibus.

Habitat in floribus.

DESCR. Magnitudo Pulicis. Totus niget vel ex cinereo nigricans, præsterim thorace, qui villis cinerascentibus manifeste adsperrgitur. Elytra striata, nigra, sed maxima ex parte rufa, excepta parte thoraci & futura longitudinali adjacente, que nigra: hinc clausis elytris latera insecti rufa conspicuntur. Femora nigra, sed Tibiae flavæ. Antennæ nigro-fuscae, infimo articulo non majore.

476. CURCULIO niger; elytris rubris; capite pone elongato. It. ael. 153.

Att. upf. 1736. p. 19. n. 4. Necydalis rubra, capite minimo nigro.

Habitat Upsaliæ & alibi non infrequens.

DESCR. Singularis est haec Species, nec facie ad reliquias accedens. Caput enim, quod totum nigrum & atrum, excoriata vulpis caput refert, caret enim rostro elongato, sed brevissimo gaudet, cui antennæ nigrae innatae, articulo infimo reliquis non longiore: Caput pone elongatum, nec thoraci immersum, ut in reliquis. Thorax antice ater est, uti caput; pone vero ruber, ut elytra. Elytra saturate rubra, oblonga, punctis excavatis striata; femora nigra: Scutellum dorsi attum est.

477. CURCULIO niger; elytris nigris: fascia duplice alba, basi rubris. Jonst.

Fonst. *inf.* *t.* 15. *Scarabæus minor* 69 *s.* *ultimus.*

Hoffn. *inf.* *t.* 16. *f.* 13.

Lift. *mut.* *t.* 31. *f.* 1.

Raj. *inf.* *p.* 103. *n.* 29. *Cantharis XXIX.*

Habitat ubique sat frequens, currit celerrime inter omnes Curculiones.

DESCR. Nescio quam similitudinem habet cum Formica, quamvis in nulla re cum Formicis convenient; mili tamen semper se sifit ad normam & formam Formicæ. Caput nigrum est, thoraci immersum, depresso, absque ulla proboscide, ut in congeneribus. Antennæ clavatae ori fere insidentes, nigrae, absque instino articulo elongato. Thorax rufus est & scaber, margine caput spectante nigro. Elytra oblonga, obtusa, planiuscula, nigra, punctis elevatis scabra; sunt hæc basi rubra, fascia transversali linearis alba duplice; quarum thoraci propriæ supra medianam longitudinem anterius flexa; altera vero fascia paullo supra apices elytrorum sita, etiam alba, sed latior, ad figuram longitudinaliem anterius flexa. Capite subrotundo a reliquis differt.

HÆC cùm proxime præcedente e Genere *Curculionum* esse docuit & demonstravit D. Car. de Geer: cuius veritatem durius infestis, pedum tenacitas, unguium antennarumque insertio, mordendique conatus irritus evincunt.

478. CERAMBYX viridi-cærulescens, antennis corpus subæquantibus.

Act. upf. 1736. *p.* 120. *n.* 1. *Cerambyx viridiæneus.*

Mouff. *lat.* *p.* 133. *f.* *ult.* *Cerambyx tertius.* *p.* 134.

Lift. *loqu.* *p.* 384. *n.* 11. *Scarabæus magnus suaviter olens.*

Raj. *inf.* *p.* 81. *n.* 17. *Scarabæus Capricornus dictus major viridis odoratus.*

Frisch. *germ.* 13. *p.* 17. *t.* 11. *Scarabæus arboreus cæruleo-viridis.*

Habitat in Salice, odorem spargens gratum & fragrantissimum.

DESCR. Quæd ipsum corpus inter nostras maxima est hæc species; tota cæruleo-viridis aureo nitens; Abdomen supra cæruleum. Alæ nigrae. Pedes colore cum reliquo corpore convenient; pedum tarsi subtus villosi, glauci; tibia terminatur spina; Thorax utrinque mucrone gaudet, intra hos mucrones tifa tuberculæ paullo minora, elytris propiora, & nonnulla alia tuberculæ adhuc minora anterius. Elytra minutissimis rugis, fibrisque tribus longitudinalibus parum elevatis notata, oblongo-lanceolata, flexilia. Antennæ vix longitudinem corporis adtingunt, harum articuli per gradus versus extremitatem breviores sunt, contratio ac in reliquis modo.

479. CERAMBYX nebulosus; antennis corpore longioribus; thoracis punctis quaternis luteis.

L

Mouff.

Mouff. lat. in appendice tab. penult. (Mas.)

p. 151. f. 2. Scarabaeus VII. ex Russia.

Pet. gaz. 14. t. 8. f. 8. Capricornus russicus cinereus, cornibus longissimis.

Frisch. germ. 13. p. 18. t. 12. Scarabaeus arboreus, antennis longissimis.

Aet. upf. 1736. p. 120. n. 2 & 3. Cerambyx fuscus, antennis corpore quater longioribus.

It. ael. 8. Cerambyx nebulosus &c. ut supra.

Smolandis Timberman.

Habitat frequens in linteribus & arborum truncis decorticatis, dum ex his domos extruunt ruricola, hinc pueris nostris dicitur Timberman, i. e. Aedilis; omnibus notissima species: vulgus hunc laedere religioni apud nos dicit.

DESCR. Pollicem transversum longum est corpus, totum cinereum. Elytra obtusa pilis minutissimis adspersa, inter quos pilos tubercula seu puncta minutissima prominent confertissima. umbra nigricans coleoptera transversim ambit versus posteriora in medio curvata. Thorax etiam cinereus, mucrone utrinque prominulo, & punctis quatuor luteis transversalibus a tergo. oculi nigri, punctum pone antennas nigrum. Antennae ipso corpore quintuplo longiores, ex 10 articulis cinereis, versus apicem nigris, quo capiti propiores, eo breviores. Alae nigricantes, venis fuscis. Fæmina ano prominet; huic antennæ ipso corpore triplo longiores: matris autem cornua quintuplo vel sextuplo corpore longiora.

480. CERAMBYX niger, thorace planiusculo: margine utrinque tridentato, coleopteris piceis. D. Geer.

Frisch. germ. 13. p. 15. t. 9. Cerambyx niger, anten- nis ferratis.

Raj. ins. 95. Cerambyx maxima, cornibus magnis articulatis & reflexis.

Habitat ad Medevi acidulas.

DESCR. Corpore maximo, antennis longiore, planiusculo; facies ferme Scarabæi 339.

481. CERAMBYX rufus; coleopterorum lineis tribus nigris longitudinalibus.

Habitat in Smolandia, Scania, Dalekarlia.

DESCR. Est hæc species inter maximas hujus generis. abdomen, pedes, frons obscure rubra; sed abdomen pilis canis rectum. Thorax aculeis lateralibus majoribus, utrinque solitariis apice rubris; & pluribus minoribus intermediis. Inter antennas duo tubercula rubra. Elytra tuberculis elevatis scabra, villisque minimis adspersa. Elytra ad basin angulos formant, e quibus ad apicem fascia seu linea lata nigra excurrit, ut & a

Scutella per utrumque elytron, secundum longitudinem futuræ; linea intermedia lata nigra usque ad apicem elytrorum.

482. CERAMBYX ater, elytris punctatis maculis pallidis sparsis; antennis corpore longioribus, thorace spinoso.

Habitat in sylvis.

DESCR. magnus & ater est. oculi nigri pone antennas excurrentes. Thorax utrinque angulo majori armatur macula ferruginea ad basin elytrorum introrsum. Thorax & Elytra atra punctis sparsis fere contiguis excavatis (nudo oculo manifestis). Puncta flava, sparsa super thoracem & elytra. *Mas* antennis nigris triplo aut quadruplo corpore longioribus; *Femina* antennis corpore sesqui longioribus nigris, articulis singulis versus basin cinereis.

483. CERAMBYX cinereus, elytris punctis nigris fascia-
que nigra, antennis corpore sesquilongioribus.

Habitat in Gotlandia ad fodinas Burvicenses.

DESCR. Hic inter minores omnino numerandus est. Caput nigricans. Antennæ corpore sesquilongiores apice tenuissimæ: articulis singulis superne nigris inferne pallidis. thorax utrinque denticulo notatus, superne cinereus punctis nigris maculatus. Elytra cinerea, punctis minimis excavata, non striata, præterea punctis inæqualibus nigris irrorata, densius versus basin; fascia dein nigra transversalis latiuscula in medio elytrorum.

484. CERAMBYX cinereus; elytris præmorsis nigris
punctis fasciaque alba, antennis corpore sesquilon-
gioribus.

Habitat saepe in domibus.

DESCR. Longitudo muscae domesticæ, sed angustior. *Totus* cinereus est, punctisque nigris irroratus: striæ aliquot elevatæ in elytris, & fascia alba transversalis latiuscula in medio elytrorum, basi tamen paullo proprior. Thorax aculeis prominulis, præsertim lateralibus. Antennarum articulis superne nigris, inferne cinereis. VARIETAS in aliis fascia albida corodata in parte anteriore coleopterorum; postica pars elytrorum retusa acute præmorsa s. dentata.

485. CERAMBYX cinereus nigro-nebulosus; anten-
nis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.

Att. upf. 1736. p. 20. n. 1. Necydalis cinereo - ma-
culata fulcata.

DESCR. Caput vellere cinereo punctisque vix conspicuis nigris sub vel-
lere. pone oculos versus pectus nigrum; punctum pone antennas nigrum.
Antennæ cinereæ, undecim articulis, corpore dimidio breviores, antror-
sum protensæ: tibiæ ad apicem duabus spinis armantur. Thorax cinereus,
marginè laterali nigro, in cuius medio mucro niger. Linea nigricans lon-
gitudinalis thoracis in medio tergi. Elytra oblonga, arcta, striis tribus lon-
gitudinalibus elevatis nitidiusculis; cæteroquin nebulosa sunt elytra ob
maculas nigricantes temere sparsas; (& in quibusdam fascia duples trans-
versæ nigra lateribus testacea). Totum corpus alias cinereum, nigro ne-

bulosum, qui cinereus color a pilis minutissimis, ad cervinum colorem accedentibus, oritur.

- 486. CERAMBYX cinereus**, coleopterorum fasciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace spinoso.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Hic antecedenti adeo similis magnitudine, futura, facie ut dicere facile idem esse animal; sed elytra, quae magis fusca, gaudet duabus fasciis flavis approximatis in medio elytrorum.

- 487. CERAMBYX testaceus**; elytrorum fascia duplice albida, thorace spinoso.

Habitat saepe in herbariis antiquis, ubi e foliis farinam conficit & coacervat.

DESCR. Magnitudo pediculi. Corpus totum testaceum; Elytra vero saturatus colorata, super quæ fasciæ duas albæ, quarum pectori propior in medio non cohæret, altera anno propior retrorsum in medio arcuatur seu flebitur. Abdomen ovatum & convexum admodum est. Thorax angustus inuncrone utrinque prominulo; dum incedit anus terræ incumbit.

* * * * * Thorace inermi.

- 488. CERAMBYX niger**; elytrorum fasciis duabus albis undulatis.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 6. Cerambyx cinereus, fasciis duabus pallidis.

Habitat in quisquiliis.

DESCR. Antennæ longitudine corporis: femora atra: Caput & thorax nigra tuberculis a tergo, absque angulis lateralibus. Elytra nigra, pone pallescentia punctis excavatis, e quorum cavitatibus pilus exsurgit: duplex fascia alba transversa undulata, similiter punctis excavata. Magnitudine antecedentem superat.

- 489. CERAMBYX nigricans**, thorace villoso cinereo, punctis duobus glabris.

Frisch. germ. 13. p. 17. t. 10. Scarabæus arboreus, antennis parvis, collari cinereo duobus punctis.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 1. Buprestis collaris villoso, elytris cinereis.

Habitat in lignorum acervis.

DESCR. Totus niger est cum cinerieris mixtura. Corpus totum sebrium vel inæquale punctis prominulis inordinatis & pilis cinereis vagis. Thorax vero totus hirsutus, cinereus f. niger pilis albis, duobus a tergo punctis prominulis glabris, quibus ab omnibus differt. Antennæ nigrae, parvæ, corpore dimidio breviores, oculi in quibusdam deaurari. Pedes nigri, tibiae duplaci spina terminatae in dorso elytrorum fascia alba undulata.

lata sed obsoleta, ut vix visibilis sit, femora clavata. Elytra flexilia. Denticuli nulli in thorace.

490. CERAMBYX testaceus, thorace villoso cinereo: lineolis duabus glabris.

Att. upf. 1736. p. 20. n. 2. Buprestis collari villoso: elytris testaceis.

Habitat

DESCR. Facies antecedentis, sed omnino minor. *Antennæ corpore breviores, testaceæ. Thorax villosus; cinereus s. niger pilis albis: a tergo punctis duobus oblongis, glabris. Elytra testacea, antennis pallidiora, punctis excavata, non tamen striata. Femora nigra: Oculi aurati; antennæ pilis adspersæ, tertio articulo longissimo; sœpe fascia alba obsoleta in dorso; hinc adfinitas cum præcedente fumina.*

491. CERAMBYX testaceus, thorace glabro.

Att. upf. 1736. p. 20. n. 3. Buprestis collari glabro, elytris testaceis.

Habitat

DESCR. Vix a præcedenti differt, nisi sola hirsutie thoracis. *Antennæ longitudinaliter corporis, uti femora & pedes testaceo-rufescentes. thorax inæqualis, testaceus. Elytra punctis excavata, non striata, testacea.*

492. CERAMBYX fuscus, punctis thoracinis impressis.

Habitat Löffstadii. *De Geer. Upsaliæ legit. D. Leche.*

DESCR. *Antennæ corpore paullo breviores: Corpus lineare, fere glabrum: singula elytra striis duabus elevatis. Abdomen ferrugineo fuscum. a tergo duas cavitates impressæ, excepta linea longitudinali.*

493. CERAMBYX griscus nigro - punctatus, thorace inermi.

Pet. gaz. 5. t. 2. f. 1. Capricornus norvegicus nigrescens, vaginis punctatis maculisque pallidis adspersis.

Habitat in sylvis.

DESCR. Hæc præcedenti 482 similis, ut pro ejusdem feminâ habuisset, nisi thorax mucrone laterali destitueretur. totum corpus supra & infra lana grisea & pallide-flavescenti-cinerea vestitur, per quam puncta glabra, sparsa, conserua, emergunt. *Corpus præcedenti 482 crassius. maxilla nigra. Anteriorum articuli grisei, sed apicibus albi.*

494. CERAMBYX niger, coleopterorum fascia longitudinali flava dentata: punctis flavis.

Fonst. inf. t. 15. Scarabæus minor 52.

Frisch. germ. 12. p. 29. t. 3. ic. 3. Scarabæus arboreus medius, elytris nigris, ornamenti flavis.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 7. Cerambyx cinereus, fascia alba.

Habitat in sylvis.

DESCR. Tota nigra est, oblonga, laevis. Thorax vellere flavo inductus, macula nigra, quadrata in dorso; utrinque ad latera gibbus. Elytra nigra, glabra, punctis minutissimis excavatis, futura longitudinalis flava, dentibus variis oppositis, quorum pat' primum incurvum, secundum transversum, tertium adscendens, quartum deorsum gibbini, quintum minimum, sextum ultimum adscendens, per marginem exteriorem: puncta aliquot difformia, flava, in medio elytrorum. Antennae corpore patulo longiores. flavedo omnis e villis minutissimis constans.

495. CERAMBYX violaceus nitens, antennis nigris, femoribus clavatis.

Frisch. germ. 12. p. 133. t. 3. ic. 6. f. 1. Scarabæus arboreus, totus violaceus.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 4. Buprestis collaris nigro: elytris æneo-eruleis.

Habitat in hortis & sylvis.

DESCR. Totum corpus e violaceo nitens, colore aureo & sericeo superbit. Thorax & elytra punctis contiguis excavata. Antennæ corpore ferme breviores, nigrae: femora clavata cum pedibus arra. abdomen nigrum. thorax elytris obscurior. ad Lepturam aliquatenus accedit. thorax planiusculus rotundatus absque spinis ulla. Elytra pone rotundata, nec præmorsa, planiscula.

Leptura.

496. LEPTURA viridi-flava antennis luteo viridique variegatis.

List. mut. t. 18. 23?

Act. upf. 1736. p. 20. n. 6. Leptura maxima nigra, subitus virescens.

DESCR. Inter Species hujus generis haec maxima nobis est. Totum corpus in se speciatum atrum est, sed pectus, thorax, abdomen, pedes, & maxima ex parte caput vellere e viridi-flavo tecta. Elytra non striata, punctis raro minutissimis adspersa; ad basin futuræ longitudinalis elytrorum villositas pectori concolor. Corpus ponit attenuatum & elytra præmorsa. Haec species solis antennis ab omnibus nobis notis differt, quarum singuli articuli inferne lutei, superne nigri; hinc monilis instar e nigro & luteo variegatis. Variat etiam elytris viridibus, adeoque recto corpore viridi; elytrorum color luteo-viridis dependet a vellere minutissimo, quo deratio elytra nigra sunt: femora postica absque denticulo & thorax absque angulis.

497. LEPTURA nigra thorace elytrisque rufis. De Geer.
Habi-

Habitat in Roslagia.

DESCR. Magna satis est. tibiae flavæ.

498. LEPTURA nigra, elytris nigricante lividoque variis. *De Geer.*

Habitat in Roslagia.

DESCR. Magna. elytra livida basi & medio extrorsum livido, reliquo nigricante.

499. LEPTURA nigra, elytris rubescentibus lividis.

Raj. inf. p. 97. n. 6. Cerambyx capite, scapulis, antennis nigris, elytris flavis: extremitatibus nigris.
Act. upf. 1736. p. 20. n. 5. Leptura elytris testaceis, apice nigris (quæ mas).

■ 4. Leptura elytris rubris.

Frisch. germ. 12. p. 38. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabæus arboreus major violaceo-ruber.

Habitat sat frequens in nemoribus.

DESCR. Corpus totum cum pedibus, antennis, omnibusque partibus, exceptis elytris, nigrum, oblongum, pone angustatum. Thorax absque spinis, ut omnes hujus generis. Abdomen & tota infima superficies nigra quidem est, sed certo respectu ad lumen, si anterius inspiciatur alba. Elytra artenuato-præmora apicis angulis utrisque acutis. Colore differunt elytra: aliis enim sunt saturate rubra absque ulla nigredine, & haec *Feminae* sunt: aliis rubra, apice nigra ut & margine elytrorum exteriore & interiore: aliis testacea apicibus nigris & margine exteriore nigro, & hi mares sunt. Elytra infinitis punctis excavata, non tamen striata, & villis quibusdam vix conspicuis, præsertim versus posteriora, adspersa. Thorax & caput in quibusdam flava hirsutie adspersum. Penis longissimus. Tibiae omnes spina terminatae.

500. LEPTURA nigra; thorace, elytris, tibiisque purpureis.

Frisch. germ. 12. p. 37. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabæus arboreus major purpureo-ruber.

Habitat

DESCR. Antecedenti, (quæ vulgaris) duplo major & simillima. Elytra, thorax & tibiae (sed non femora) coccinea. reliquum corpus nigrum est, & sub ventre, ante inspectum, albo lucens, reliqua ut in specie sequenti.

501. LEPTURA nigra: elytris thoraceque flavescente.

Habitat

DESCR. Hæc præcedenti minor, facie eadem, & forte sola varietas; sed elytra minime rubra, verum obsolete ferrideque flavescentia, versus basia angulata; nec abdomen antice visum album nitidumque adparet.

502. LEPTURA nigra; elytris lividis; maculis quatuor nigris. *R. Haft.*
 Habitat in sylvis. *DESCR.* Est inter maximas. Omnia nigra, sed thorax & abdomen lana cinerea. in singulis *Elytris* macula una anterius paullo minor, altera posterius major magis quadrata & magis saturate ferrugineo nigra.
503. LEPTURA nigra tota. *De Geer.*
 Habitat ad acidulas Medevienses.
DESCR. Majuscula, *Elytra* angusta.
504. LEPTURA nigra; coleoptris testaceis; maculis sex nigris margine connexis. *Act. upf. 1736. p. 20. n. 7.* Leptura elytris testaceis, maculis nigris.
 Habitat -
DESCR. Totum animal nigrum est omnibus partibus, sed *Elytra* testacea, apice truncata, nigra macula terminata; in medio macula nigra margine exteriore connexa, quadrata; juxta basin macula oblonga, angulata, margini exteriori adnexa; intra hanc versus suturam longitudinalem macula ovata, nigra, parva, interiori margini adnexa; ergo elytra testacea s. pallida margine exteriori & interiori nigro; maculae ad apicem elytrorum clavis coleoptris conficiunt simul unicum nigrum maculam; in medio due maculae quadratae margini exteriori adnexae constituant binas distinctas maculas; maculae ad basin elytrorum angulatae & parum sinuatae, margini exteriori adnexae constituant binas alias maculas; sed maculae ovatae intra has interiori margini elytrorum adnexae simul coemunt in unam, adeoque sex maculae, connexae omnes margini elytrorum interiore nigro. *Pedis* spina terminati. si maculae elytrorum abscent, pro 499 habent, adeo similes inter se sunt haec duas.
505. LEPTURA nigra; elytris macularum ferruginea- rum quatuor paribus.
 Habitat in sepibus. *Malmborg.*
DESCR. Est e maximis sui generis. Corpus totum nigrum, ut & *elytra*, que maculis ferrugineis quatuor parium insigniuntur, quarum intermediae undulatae sunt, thorax postice complicatus quasi est, vel *Elytra* testacea, fascis quatuor nigris undulatis transversis, ultima terminatrix.
506. LEPTURA nigra; elytris flavis, apice nigris.
 Habitat in Scania. *D. Leche.*
DESCR. Vix pediculo major, cylindrica nigra; *Antennae* longitudine fere corporis. *Elytra* flava, apice nigra, obtusa & fere truncata, minus rigida, ut *Cantharidis* speciem dixisset, nisi thorax teres fuisse, omnia rubor & totum corpus nigrum.
507. LEPTURA nigra, elytrorum lineis transversis fla- vis, pedibus testaceis. *Raj.*

Raj. inf. p. 82. n. 22. Scarabæus mediis, abdomine longo, angusto, niger, lineolis & maculis luteis pulchre variegatus.

Frisch. germ. 12. p. 32. t. 3. f. 2.

List. nat. t. 31. f. 1.

loqu. p. 385. n. 14. Scarabæus niger, lineolis quibusdam luteis distinctus, subcrocis pedibus.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 8. Leptura elytris nigris, lineis flavis.

Habitat in pratis inter arbores, & in hortis.

DESCR. Est tota fusco-nigra, oblonga, angusta, thorax margine superiore flavus est. Scutellum ubi elytra conjunguntur puncto flavo notatur. ad angulos elytrorum macula oblonga, transversa, in utroque elytro, quæ ambæ non coëunt: in medio elytri utriusque est linea flava, arcuata, flexura deorsum spectante, pede interiori versus futuram cum opposita fere coëunte, hinc figura arietis. intra hanc & apicem linea transversa flava cum opposita connexa. apex elytrorum flavus, ut & anus. caput; thorax & elytra villis tenuissimis testa sunt. Elytra apice truncata, licet extus præ pilis vix conspicue. Pedes rufescentes, tibiæ spina terminalia. Antennæ rufescentes superne fuscae. alæ dum parum dehiscunt elytra aurato-purpurea lucent. Lineæ 4 flavæ sub abdomen. Cum haec convenient in multis *Frisch. inf. 12. tab. 3. ic. 5. f. 1. 2. 3.* praesertim 3. licet non in omnibus.

508. LEPTURA nigra; elytris testaceis: punctis duobus, cruce, fasciisque nigris.

Habitat in *Scania* D. Leche.

DESCR. Corpus nigrum. Elytra pallide testacea cum puncto in singulo elytro nigro; dein lunula recurva in ipsa futura elytrorum longitudinali; demum macula in singuli elytri margine exteriore, quæ ambæ conjunguntur linea transversa; tandem fascia lata nigra & apice fascia nigra & lunula nigra ad apicem; per futuram longitudinalem ducitur nigra linea: femora & tibiæ supra flavæ, infra nigrae.

509. LEPTURA deaurata; antennis nigris; femoribus posticis dentatis.

Frisch. germ. 12. p. 33. t. 3. ic. 6. f. 2. Scarabæus arboreus purpuro-aureus medius.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 3. Leptura rubro-aenea.

Habitat locis humentibus, saepe in foliis *Nymphææ* & *Caricis*.

DESCR. Tota cupreo-aurata; capite, thorace, elytris, pedibus punctis minutissimis, fere contiguis, excavatis, sed in Elytris digesta sunt puncta in 10 circiter ordines longitudinales, vix tamen inde striata sunt elytra. oculi nigri. antennæ fuscae. lente inspectum egregium plane est animal. Hæc præcedentibus omnibus minor. Elytra truncata apice; punctum nigrans pone antennas prominens. Abdomen a capite versus caudam vilium albo.

albo-argenteum est, a cauda vero versus caput nigrum, *femora* articulanti cum corpore singulari artificio, globo scilicet intra cavitatem recepto. *pedes* postici reliquis duplo longiores; horum *femora* compressa, versus basin angustiora, versus genua, latere interiore denticulo notata. *Antennae* admodum approximatæ & basi fere contiguae; in medio circiter *elytrorum* foveola depressa angulum *elytri* respiciens. *Corpus* pone angustatum.

510. LEPTURA subænæo-violacea; femoribus posticis dentatis.

Raj. inf. p. 100. *Cantharis arundines* frequentans tertia.

Act. upf. 1736. n. 1. *Leptura cæruleo-nigra.*

n. 2. *Leptura viridiænea.*

Habitat ad ripas sabulosas & arenosas frequens, ut & in *Nymphæa*.

DESCR. *Corpus* oblongum, glabrum, vel violaceum t. e nigro-cæruleo-æneum, vel viridi-æneum (forte sexus differentia). *Thorax* cylindraceus. *antennæ* filiformes, antrosum directæ, nigrae. *Abdomen* cinereum, magis obscurum, a parte anteriore visum albescens. *Elytra* striata, punctorum decem circiter ordinum, excavatorum; lente visa sunt pulcherrima; apex *elytrorum* truncatus, niger. *femora* postrema maxima, & longitudine & crassitie, rubra, ubi crassiora nigra; hæc *femora* subitus uno altero denticulo acuto, ut in chelis *Cancri*; antecedentis forte sola varietas.

Carabus.

* * Majores.

511. CARABUS ater; elytris convexe punctatis striatisque.

Hoffn. inf. 2. t. 3.

Habitat in lignis putridis; citissime currit; odorem olei tabaci spargit.

DESCR. *Caput* parvum. *Oculi* prominentes. *Antennæ* setaceæ, articulis undecim, longitudine dimidii corporis. *OS* maxillis prominens: maxilla inferiores maiores, arcuatæ, acutæ, ad basin denticulo armata a latere interiore. Maxillæ inferiores acuminatæ, arcuatæ, denticulo ad basin interne, etiam instructæ. *Antennulae* maxillares superiores, singula tribus articulis constant, extimo reliquis crassiore: haec *antennulae* maxillis triplo longiores sunt: *antennulae* maxillares inferiores unico articulo constructæ, nec maxillis longiores. *Oris* labium superius obtuso-emarginatum. *Thorax* ater, a tergo convexus, leviusculus, margine laterali prominent, versus basin angulato; a parte pectoris thorax compressus cartilagine ensiformi vel scutello versus abdomen. *Elytra* ovata, arcata, atra, margine exteriore elevata, aut dilatata; in singulo elytro tres ordinis longitudinales punctorum elevatorum, ovatórum, singulo ordine duodecim communiter punctis; inter singulum punctorum ordinem linea longitudinalis elevata. *Abdomen* glabrum, uti totum corpus: *femora* teretiuscula: *Tibiae* ad apicem duabus scolis terminatae.

NOT.

NOT. Omnibus hujus generis speciebus notæ communes sunt? Corpus oblongum, antennæ setaceæ; clypeus thoracis marginatus cordiformis, apice truncato elytra spectante; odor gravis, curius celerrimus, os maxillis prominens.

§12. **CARABUS** niger, elytris subvirescentibus convexè punctatis striatisque.

Habitat inter quisquilias.

DESCR. Magnitudo, statura, odor & ornaea ut in præcedente, sed elytra e nigro subvirescentia; an sexus differentia?

§13. **CARABUS** niger, elytris æneis convexè punctatis striatisque.

Habitat inter ligna putrida.

DESCR. Omnia ut in primo, sed elytra, thorax & caput a tergo ænea.

§14. **CARABUS** purpurascente-niger, elytris concave punctatis striatisque.

Raj. inf. p. 96. n. 2. Cerambyx purpurea punctata.

Lift. mut. t. 18. f. 4.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 1. Carabus niger, elytris fulcatis punctatis.

Habitat inter putrida vegetabilia.

DESCR. Omnia ut in præcedentibus. Elytra tribus ordinibus longitudinalibus punctorum excavatorum rotundorum, singulo ordine duodecim punctis constante; Lineæ longitudinales puncta distinguentes etiam concave sunt.

§15. **CARABUS** ater, elytro singulo striis octo.

Lift. loqu. 390. Scarabæus ex toto niger, alarum thecis crustaceis fulcatis.

Habitat cum præcedentibus.

DESCR. Forma & fere magnitudo cum præcedentibus convenit. Color toto corpore niger; elytra simul sedecim striis longitudinalibus, parallelis.

§16. Carabus violaceo-niger, elytris lævibus subrugosis.

Raj. inf. p. 96. n. 1. Scarabæus major, corpore oblongo e purpura nigricans.

Frisch. germ. 13. p. 25. t. 23. Scarabæus terrestris niger, clypeo thoracis cordiformi marginato.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Carabæus nigricans, lævis.

Lift. mut. t. 18. f. 5.

Habitat cum præcedentibus.

DESCR.

DESCR. Omnia ut in præcedentibus, sed margo thoracis & elytrorum & viola purpurascente cæruleus. Elytra & punctis & striis carent; sole rugæ longitudinales & transversales, sed lente visus puncta minutissima nudis oculis non conspicua.

517. CARABUS viridis, elytris obtuse sulcatis absque punctis, pedibus antennisque ferrugineis.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Carabus viridis; elytris sulcatis, lævibus.

Habitat in Oelandia.

DESCR. Omnia ut in præcedentibus, sed totus viridis est, parum ad cæruleum vergens; elytris sulcis tribus latis, obtusis, longitudinalibus, absque ulla interiectis punctis; sulci s. canales elytrorum vividissime & sericeo virent, sed convexitates magis obscure sunt, non tamen nigrae sed potius magis cæruleæ. Pedes & antennæ in aliis ferruginea s. testacea; totum corpus viridi nitens.

518. CARABUS niger, elytris viridibus obtuse sulcatis, pedibus antennisque nigris.

Raj. inf. 96. n. 6. Cerambyx dorso in longas rugulas diviso, omnium pulcherrimus.

It. æl. 96. Scarabæus niger, elytris viridibus obtuse sulcatis, pedibus antennisque nigris.

DESCR. Magnitudo & facies omnino præcedentium. Corpus totum nigrum subrufus, cum antennis & pedibus. Caput, thorax, elytra supra viridi nitentia; Elytra flagula sulcis 3 vel 4 rugosis exarantur pulcherrime viridi- sericeis, interjacētibus convexitatibus nigris. Margo elytrorum exterior ignei coloris est; antennæ breves. adeoque differt a priori corpore atro, pedibus antennisque nigris; antennæ dimidio brevioribus; sulcorum, in elytris, interstitiis nigris angustioribus.

* *Minores.*

519. CARABUS nitens, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 6. Buprestis capite collari- que cæruleo, elytris rubro-æneis.

Baub. ballon. p. 212. f. 4. Cantharis auricolor.

Gæd. belg. 2. p. 126. t. 31.

Habitat sat frequens Upsaliæ.

DESCR. Est magnitudine musca, sed angustior, auri instar fulgentissimi nitens. Caput & thorax nitet ex viridi- cæruleo. Elytra ignei coloris, vel cupri japonici, striis nudis oculis vix manifestis, plurimis, margine laterali extimo cyaneo. subrufus fusco-æneus. puncta in singulo elyro 6. longitudinaliter, inter secundam & tertiam striam a sutura, impressa. Abdomen e fusco nitet. Thorax postice angustior.

520. CARABUS supraæneus, coleopteris punctis sex excavatis, tibiis rufis.

Act. upf. 1736. p. 20. n. 8. Buprestis capite nigro; collaris elytrisque nigro-æneis.

Habitat apud nos frequentissimus in pratis.

DESCR. Magnitudo circiter inusitata domesticæ. Color totius animalculi a tergo viridi rubroque fusco-æneus, elytris striatis singulis tribus punctis longitudinalibus impressis. femora nigrae; tibiae rufæ; antennæ ad articulos inferiores tribus setis armatae.

521. CARABUS ater; pedibus rufis.

Act. upf. 1736. p. 21. n. 9. Buprestis corpore nigro, pedibus rufis.

Habitat etiam apud nos vulgaris.

DESCR. Magnitudine fere & figura praecedenti simillimus, sed totus ater. Thorax latitudine coleopterorum; elytra striata; tibiae & antennæ versus basin rufescentes: striae in singulo elytro octo, quarum secunda (a sutura) parva obliqua interrupta.

522. CARABUS nigricans, pedibus tibiisque pallidis.

It. gotl. 207.

Habitat in arena riparia maritima insulæ Färöen in Gotlandia; currit & volitat velocissime & promptissime inter omnia coleoptera.

DESCR. Musca domestica dimidio minor. Caput, thorax & elytra (quæ striis octo sunt) e cupreæ nigra. pedes nigri, exceptis mediis tibis pallidis.

523. CARABUS pallide testaceus, elytris glabris. De Geer.

Habitat in Roslagia.

DESCR. Media magnitudinis. Elytris absque punctis & striis. Antennæ filiformes.

524. CARABUS niger; thorace, antennis, pedibusque ferrugineis.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Est media magnitudinis. caput nigrum. elytra nigra striata. thorax, uti & antennæ pedesque toti ferruginei.

525. CARABUS capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.

Rai. inf. 89. Cantharis s. Scarabæus exiguis, elytris & capite cæruleis, scapulis croceis.

Habitat - - - - -

DESCR.

DESCR. Est insectum vix Culice vulgari majus. *Caput* cæruleum. *Elytra* saturate cærulea, nitida, vix striata. *Thorax* ruber. *Antennæ* maxima parte nigrae. *pedes* ex rubro & nigro varii.

526. CARABUS capite elytrisque atris, thorace rubro.

Habitat

DESCR. Magnitudo proxime præcedentis, & facies eadem; sed *caput* nigrum. *Elytra* atra, striata. *Thorax* ruber: *pedes* & *antennæ* omnino unicolores, ferrugineæ.

527. CARABUS nigro-æneus, antennis pedibusque nigris.

Habitat in ligno putrido. P. Kalm.

DESCR. Magnitudo & facies præcedentis, ex nigro æneus. *Thorax* atrior nitidior, punctis duobus concavis, obsoletis. *Elytra* striata, sed extima stria elytrorum ferrata. Thorax pone latitudinem elytrorum attingit. Variat punctis impressis in elytris, & non impressis. *antennæ* ad basin fæpe griseæ. subitus niger est hic Carabus.

528. CARABUS niger coleopteris pone fascia ferruginea: lateribus macula ferruginea.

Habitat in terra culta frequens.

DESCR. Totus niger, macula ad latus coleopterorum & alia posterius oblongiuscula, pone coniunctæ, pallide ferrugineaæ: *antennæ* nigrae, basi f. 3. articulis rufæ: *pedes* pallidi. *elytra* fulca.

529. CARABUS ater; elytris antice griseis.

Habitat in vaporariis horti academici.

DESCR. Est inter minimos hujus generis, vix pediculo duplo major. totus ater: *elytra* ad basin intra medietatem grisea, ut & futura longitudinalis grisea.

530. CARABUS ater, pedibus antennisque nigris.

Habitat in arboribus putridis. P. Kalm.

DESCR. Totus niger; *thorace* glabro, nitido, postice angustiore. *Elytra* striata, atra: puncto obsoleto excavato in medio singuli elytri: *pedes* & *antennæ* atrae.

531. CARABUS pallide testaceus, oculis nigris.

Habitat in terra primo vere.

DESCR. Totus pediculi majoris longitudine, teretisculus, opacus, unicolor, pallidus ad testaceum vergens colorem, exceptis *oculis* nigris: minime striatus.

532. CARABUS niger, thoracè ferrugineo, elytrorum maculis quatuor lividis.

Habitat in Scania, J. Leche. in Uplandia L. Clase.

DESCR.

DESCR. Pediculo duplo major. *Caput* nigrum in *thorax* rufus s. ferrugineus. *Elytra* singula basi livida macula ovata (quae in utrisque interdum coit) & alia macula in singulo elytro juxta apicem livida ovata (interdum undique distincta nigredine ipsius coleoptri). *Pedes* ferruginei s. pallidi: macula fusca ad flexuram alae, *antennae* ferruginea.

533. CARABUS griseus; capite, abdome, elytrorum basi nigricantibus.

Habitat - - - -

DESCR. Vix pediculo major. *thorax*, *elytra*, *antennae*, *pedes* subgrisea: *abdomen* & *caput* nigrum: basis *elytrorum* nigricans versus scutellum. Generis hujus species omnes gaudent corpore oblongo, *antennis* setaceis, *thorace* marginato cordato apice truncato; *maxillis* prominentibus, *odore* gravi, curu celerrimo, volant prompto; omnes *liguorem* ex ore evomunt & vivunt ex *raptu*, praesertim alia coleoptera davastant, inter *elytra* & *abdomen* vulnus iis infligunt.

Mordella,

534. MORDELLA oblonga atra; cauda aculeo terminata.

Act. upf. 1736. p. 15. n. 1. Mordella cauda aculeata.

Habitat communiter in floribus Hieraciorum.

DESCR. Magnitudo feminis foeniculi. Tota atra, glabra, oblonga. Caput parvum, inflexum. *Elytra* oblonga, atra, non striata. *Thorax* glaber, convexus. *Antennae* setaceae, truncatae, articulatae. *Corpus* versus caudam sensim angustius. *Abdomen* compressum, definens in aculeum s. spinam subulatam, acutam, nigram, *elytris* longiore, minime pungentem. *Pedes* longiusculi, quibus saltat.

535. MORDELLA flava.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo pediculi; facies Chrysomelæ, omnia ejusdem coloris fulvo-flavi, cum antennis, *elytris*, *pedibus*, *trunko*, *abdomine*.

536. MORDELLA subrotunda, colore murino.

Act. upf. 1736. p. 18. n. 2. Mordella colore murino. **Habitat** in hortis inter sata.

DESCR. Magnitudo dimidii pisii s. Coccionelle, ejusdemque figura, sed colore omnino murino s. e nigro fuscō; *Thorax* glaber, nitidior. *Elytra* vix manifeste striata, saltat pedibus.

537. MORDELLA subrotunda atra opaca.

Act. upf. 1736. p. 18. n. 4. Gyrinus nigricans minor. **Habitat** inter olera.

DESCR. Praecedenti similis, sed dimidio minor, totus aer, nec thorace nitido. Saltat uti reliqua. *Elytra* abdome paulo breviora, obtusa.

538. MORDELLA subrotunda atra nitida, tibiis annulatisque flavis.

Habitat inter plantas sylvaticas.

DESCR. Magnitudo majoris pulicis. *Tota* attra, nitida. *Elytra* striata. *Antennae* filiformes, pallide flavæ, apicibus nigricantibus. *femora* nigra, tibiis flavis.

539. MORDELLA subrotunda atro-aenea.

Habitat in terra primo vere, præsertim in cotyledonibus Helxines 324.

DESCR. Pulice longe minor. *Tota* supra nigra aeneo nitens. *Elytra* punctis excavatis striata; subtus tota cum pedibus nigra.

540. MORDELLA ovata cærulea nitida; tibiis ferrugineis.

Raj. inf. 98. n. 9. Scarabæus antennis articulatis longis f. *Capricornus* exiguus saltatrix.

Att. upf. 1736. p. 18. n. 5. Gyrinus cæruleus nitidus.

Habitat inter Brassicas nuper satas, quas devastat.

DESCR. Magnitudo majoris pediculi. *Totus* cæruleus, nitens, convexus, ovatus. *femora* crassa, nigra, saltatoria, alta; *tibiae* ferruginea.

541. MORDELLA oblonga nigra; macula ferruginea in medio coleopterorum, lateribus basi ferruginea.

Habitat in terra.

DESCR. *Corpus* totum fuscum, magnitudine pediculi. *Caput* obtusum, inflexum, *thorax* ovatus, teretusculus, verius abdomen angustior. *Elytra* ovata convessa: in medio coleopterorum macula rufa f. ferruginea lunaris, finu anum respiciente, incumbens utroque elytræ simul: ad basin singulorum elytrorum a latere utrinque rufescens. subtus tota nigra cum pedibus & antennis, qua filiformes, articulatae, thorace paullo longiores.

542. MORDELLA oblonga, atra; elytris longitudinaleiter in medio flavescentibus.

Lift. mut. t. 31. f. 29?

Att. upf. 1736. p. 18. n. 6. Gyrintus niger, utrinque albus.

Habitat in *Pulmonaria*, *Dentaria*, & aliis plantis vere, præsertim in didynamiis.

DESCR. Magnitudo maximæ pulicis. *Corpus* oblongum, nigrum, minime nitens. *Antennæ* setacea, truncatae, articulis undecim nigris, exceptis in quibusdam secundo & tertio albis. *Elytra* nigra, singula in medio longitudinaliter flavescentia, undique tamen margine nigro cincta, etiam ad futuram longitudinem. *Pedes* saltatorii pallidi. Daturque reliquis duplo maiore.

§43. MORDELLA rufa, tibiis anticis dentatis.

Lechei Scalopsacantharus f. Cantharo-scalops,

Habitat in *Scaniae* putridis fagis. J. Leche:

DESCR. Pediçulo longior; *Cörper* oblongum, non saliens, totum rufum, sed *thorax* minus rufus quam caput & elytra: *antennæ* filiformes. *Pedes* anteriores f. palmæ pedum non articulatae sed contiguae, utrinque dentate uti pedes gryllo-talpæ f. *Grylli* primi.

§44. MORDELLA nigra, elytris apice rubris.

Act. upf. 1736. n. 8. Gyrinus niger nitidus; elytrorum apice rubro.

Habitat inter olera, rara apud nos. in Holſatia frequentissimum esse obſervavimus.

DESCR. Magnitudo majoris pedieuli. tota atra, nitida; in apice utriusque *elytri* punctum rubrum.

§45. MORDELLA fusca opaca, elytris punctatis. *It. ael. 16.*

Act. upf. 1736. p. 18. n. 7. Gyrinus nigricans non punctatus.

Habitat in oleribus nuper enatis.

DESCR. Magnitudo pulicis. *Corpus* totum cinereum. *Antennæ* truncatae simplices. *Thorax* & *Elytra* cinerea, venis reticulatis elevatis notata: *Pedes* saltatorii, femoribus crassissimis, ovatis.

§46. MORDELLA ferrugineo-rufa, thorace antice depresso.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Non salit. magnitudo mediocris Carabi, & facies. *Antennæ* longitudine thoracis, ultimo globoso. Caput minimum; thorax laevis, supra in parte antica retusus vel depresso. Hoc tamen in majoribus f. feminis obtinet. *Elytra* singula & striis crenata f. punctatis exarata.

Generis species pleraque pedibus salinari; plantarum succulentâ folia devastant & commaculant; fugantur fuligine in tenellis plantarum colyle domibus.

§47. MORDELLA antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoſo.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 1. Attelabus ater oblongus depresso.

Habitat in quisquiliis & locis putridis.

DESCR. Longitudo digiti transversi. Tota nigra est; colore omnino pictis: elytra parum striata. thorax margine prominulo. *Antennæ* breves, obtuse & quasi moniliformes, undecim articulis (exceptis tribus primis longiusculis) lentiformibus; nigris, ultimo globoso, pallidiore. Os, antennæ, margo thoracis, pedes ferrugineo atra sunt.

An Carabi vel hujus generis sit, dubito. *Thorax* convenit cum *Tenebrio-*
ne, antennæ cum *Mordella*, sed præsentia alarum & distincta elytra negant
genus *Tenebrionis*; non tamen saltat, uti *Mordella*.

Cicindela.

548. CICINDELA supra viridis, coleopteris punctis de-
cem albis.

Mouff. lat. p. 145. f. infim. *Cantharis quarta.*

Jonst. inf. t. 16. *Cantharis Mouff. minor 4.*

Lift. mut. t. 17. f. 12.

loqu. p. 386. n. 17. *Scarabæus viridis*, cui de-
cem maculæ albæ supra alarum thecas sunt.

Habitat in sterilißimis pratis sat frequens vere, ce-
lerrime currit & oxyfissime volitat.

DESCR. Inter Coleoptera certe hæc species unica ex præstantissimis dici
debet, cum aureus nitor ex toto corpore radiet, vel ferriceo fulgeat, *Ely-*
tra	*tupra viridia*	*planiuscula*	*lævia*	*punctis aliquot albis notata*	*quorum*
primum	*ad baseos angulum*	*secundum*	*rotundum prope marginem*	*tertium*	*lunulatum prope marginem*
4:um	*oblongum ad marginem*	*5:um*	*intra tertium*	*seu in medio elytri*	*reliquis interius*
alæ	*fusca*	*Thorax*	*angustus*	*rotundatus*	*viridi-nitens*
Caput	*aureo-viride*	*depresso vertice*	*Oculi*	*nigri*	*prominentes*
Labium	*superius obtusum*	*album*	*Maxillæ*	*superiores*	*prominentes*
dentibus plurimis validis	*inferiores maxillæ apice unico dente armatae*	*sub his antennarum duo paria*	*quorum superius constat articulis duobus*	*inferius quarternis*	*Labii inferioris loco antennulae binæ ex binis articulis pilosis*
Abdomen	*viridi-aureum*	*Pedes*	*longissimi, tenuissimi, ad basi*	*femorum corpus quoddam ovale, durum*	*antennæ filiformes, corpore bre-*
vires	*vis*	*articulis*	*versus*	*arcuata, X articulis.*	*vioribus*

549. CICINDELA atra, coleopteris maculis sex fascia-
que albis.

Aet. upf. 1736. p. 19. n. 1. Cicindela atra, punctis
quatuor fasciaque albis.

Pet. gaz. p. 77. t. 50. f. 5. Cantharis Chusan. viri-
dis elegantissime variegatus. *quod ad figuram?*

Habitat in sylvis ac Pinetis Westrobotniæ, ubi fre-
quens, celerrime currens & volitans per vias, ra-
rior Uptaliæ & in reliquis provinciis, semper in
sylvis acerofosis.

DESCR. Facies omnino antecedentis, sed sesquimajor. Tota atra est, Co-
leoptera depressa, latuscula; ad angulum exteriorem bascos elytrorum
punctum album; paulo supra, juxta exteriorem marginem, aliud pun-
ctum, sed sublunulatum. versus apices elytrorum in singulo elyro pun-
ctum rotundum, album. fascia linearis, flexuosa s. undulata, arcuata,
versus

versus posteriora in medio deflexa, cingit in medio elytra: Haec maculae omnes non constant ex pilis, cum elytra glabra infraitis punctis excavatis conspersa, sed translucent per ipsam crustam. Alae membranaceæ, acutæ, venis fuscis & fascia fusca longitudinali juxta extremitatem marginem. Femora & pedes longi, tenues, atri, setis quibusdam adspersi. Tibiae spinis duabus terminatae. Thorax angustior, teretiusculus, cruce depresso, uti caput niger. Oculi prominuli. Os prominens: labium superius atrum, rotundato-acutum. maxillæ superiores magnæ, prominentes, nigrae, versus basin extus albae, dentibus plurimis (5) duris armatae. Antennæ & inferiora otis ut in præcedente.

550. CICINDELA viridi-aenea; elytris punctis latis excavatis. *It. æl. 38. 121.*

List. loqu. p. 385. n. 12. Scarabæus parvus inauratus.
Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Cicindela ænea: punctis excavatis.

Habitat ad ripas aquarum inter arenam humidam frequens celerrimeque currens.

DESCR. Est admodum parva, vix duo seihina oryzæ æquans. os prominens, omnia quod ad figuram ut in præcedentibus. Caput, thorax, abdomen, femora (non tibiae) pedes ex auro & cupro nitentia. oculi nigri, prominentes. Thorax angustus, tetetiusculus. Elytra viridi-aenea, punctis latis excavata, in medio singuli puncti excavati punctulum prominens. Puncta majora excavata connectuntur longitudinaliter linea elevata nigricante. quin superficies sit virescens, sed punctorum fundus ænæus, exsurgit singulatis color.

551. CICINDELA atra; thorace fulvo, elytris nigro-cæruleis.

Habitat in sylvis.

DESCR. Caput & pedes nigri. Antennæ nigrae, longitudine corporis: thorax subglobosus, fusco-rufus; absque spinis (hinc a Cerambyce diversa: absque margine laterali (hinc a Carabis distincta). Elytra oblonga, nigro cœrulea, punctis minutissimis. abdomen a tergo flavum. Corpus oblongum, angustum. pedes longi; elytra non apice truncata (hinc a Lepturis diversa).

552. CICINDELA elytris viridi-cærulescentibus, ab domine fulvo.

Habitat in nemoribus ad radices montium.

DESCR. Facies omnino præcedentis. Caput & thorax cum pedibus anten-nisque nigra. abdomen pone pedes fulvum. Elytra viridi-cœrulescentia, nitida, punctis sparsis excavata. antennæ X. articulis, an hæc Leptura potius species dicenda?

553. CICINDELA thorace viridi, elytris ferrugineis pos-ne nigro-cœruleis.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Facies Carabi, sed thorax non marginatus. Antennæ nigrae. Caput

pnt & thorax cærulæa, nitida. thorax subglobosus. Elytra ferruginea, pone in medio magna macula nigra, cæruleo splendente, quæ dimidiam partem elytrorum occupat, margine tamen exteriore ubique ferrugineo. pedes flavi. Corpus subitus obscuro-ferrugineum.

Buprestis.

554. BUPRESTIS ater.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 2. Attelabus ater maximus cylindraceus: pectore crassiusculo: ore forficato.

Frisch. germ. 13. p. 23. t. 19. Scarabæus arboreus, collo crasso.

Habitat inter quisquilias locis fuccis.

DESCR. Hoc insectum singulare; an hujus generis, vix certo constat; differt enim facies, locus, notæ plurimæ. os enim longa forfice & acutæ cum unico a latere interiore denticulo. Corpus totum atrum est, punctisque minimis excavatum. antennæ filiformes sunt, crassiusculæ, breves, nec thorace longiores. Thorax nullo modo marginatus; antice & postice, ubi articulatur, pili minutissimi rufi. Caput extra thoracem prominet: femorum posticorum par spatio a reliquis magis remotum est, quam in ullo e nostris nobis notis insectis. Caput cum thorace fere adtingit longitudinem elytrorum. Elytra singula duabus tribusve striis elevatis notantur. an novi generis? an Cicindelæ?

555. BUPRESTIS viridi-ænea immaculata.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 4. Cicindela ænea; elytris striatis.

Habitat in sylvis ad aquas.

DESCR. Longitudo digiti transversi. thorax viridi-æneus punctis excavatis, crassus, imo crassitie coleopterorum, caput maxima ex parte intra se recipiens. Elytra ænea, minus viridia, immaculata, singula osto circiter striis exarata.

556. BUPRESTIS fusco-ænea: elytris maculis æneis impressis.

Pet. gaz. p. 5. t. 2. f. 2. Cantharus marianus viridis perelegans, vaginis fulcatis signaturis flavescentibus ornatus.

Habitat ad ripas.

DESCR. Caput ut in reliquis maxima ex parte intra thoracem receptum, hinc in hisce torvus adspectus; oculi pone virescentes. thorax rubro æneus. Elytra fusco-ænea, singula fulcis quatuor aut quinque exarata, punctis quatuor (in singulis elytris binis) in figuram quadratam positis, impressis, deauratis, supra elytra. antennæ feraceæ, brevissimæ. abdomen dorso cærulæum.

OBS. Figura Petiveri infecto nostro paulo major est.

557. BUPRESTIS æneo-nitida, supra cinerea; coleopteris apice adtenuatis. *De Geer.*

Habitat in sylvis.

DESCR. Est e maximis. *Elytra* apice truncata, adtenuata; supra cinerea, striata, absque maculis, interlucente aureo nitore.

558. BUPRESTIS fusco-ænea glabra nitida; thorace submarginato.

Lift. mut. t. 31. f. 13.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 20. *Cicindela minima aurea laevis.*

Habitat ad aquas.

DESCR. Hæc minima est. *Antennæ* breves, capillaceæ. *oculi* prominentes: tota nitida ænea: *thorax* latiusculus carinatus marginatus. *Elytra* nitida, striis minutissimis e punctis minutissimis. *Abdomen* nigro-nitidum. *pedes* nigri. *Rostrum* prominulum.

559. BUPRESTIS atra; thorace punctis impressis.

Habitat in subhumidis.

DESCR. Hæc species parva est, tota fusca s. atra. *thorax* a tergo quatuor punctis depressis s. concavis transversim positis notatus. *Antennæ* thorace breviores, filiformes. *Elytra* non striata, sed punctis excavata minutissimis. *Caput* obtusissimum, retropresso.

560. BUPRESTIS æneo-nebulosa, antennis clavatis.

Habitat in agris.

DESCR. Pulice fere minor, subtus tota nigra, supra obscure ænea cum macula fusca in medio dorso, ambo elytra tangente. *Elytra* tenuissime striata. *thorax* s. obliquis sulcis striatus. *Antennæ* clavatae ut *Dermestes*. Generis species plerumque aquas frequentant; capit maxima pars intra thoracem retractum, hinc torvus adspectus; corpus pone coarctatum, supra depresso-sculptum.

Dytiscus.

* *Antennis perfoliatis.*

561. DYTISCUS antennis perfoliatis fuscis. *De Geer.*

Habitat in aquis.

DESCR. Corpus maximum, piceum, lave, pone acuminatum.

562. DYTISCUS antennis perfoliatis nigris, elytris laevis. *De Geer.*

Habitat in aquis.

DESCR. magnitudo media, pone minus acutus.

563. DYTISCUS antennis perfoliatis nigris; pedibus fuscis; elytris striatis. *De Geer.*

Habitat in aquis.

DESCR. Hic parvus est.

* *Antennis setaceis.*

564. DYTISCUS niger, elytrorum marginibus dilata-tis flavis.

Aet. upf. 1736. p. 14. n. 1. *Dytiscus maximus;* ely-tris margine prominentibus.

Frisch. germ. 2. p. 33. t. 7. f. 1. 2. *Scarabaeus aquaticus magnus niger,* margine luteo.

Habitat in aquis.

DESCR. Inter nostros maximus est. Margo elytrorum, praesertim a late-re medio, admodum prominent, flavo colore: apex sterni bifurcus, acuminatus.

565. DYTISCUS niger, margine coleopterorum thora-cisque flavo.

Aldr. inf. p. 707.

Mouff. lat. p. 164. fig. bona.

Raj. inf. p. 93. n. 1. *Hydrochantharus nostras.*

Lift. mut. t. 5. f. 2.

Habitat in aquis frequens.

DESCR. Toton niger, laevis: in vertice linea lunularis s. anguli obtusi rubens. thorax cingitur luteo margine. Elytra margine exteriore flava, duabus striis vix manifestis longitudinalibus e punctis minutissimis notata. Umbra flava vix manifesta versus apices elytrorum. Apex sterni bifurcus.

566. DYTISCUS cinereus: margine coleopterorum fla-vi: thoracis medietate flava.

Hoffn. inf. 2. t. 12.

Lift. mut. t. 5. f. 1.

Habitat in aquis; an sexu solummodo a præce-denti diversus?

DESCR. Magnitudo maximæ muscae. thorax flavus margine anteriore & posteriore (non lateribus) nigro. Elytra cinerea punctis minimis confertis lutescentibus seu subdiaphanis: margo exterior elytrorum flavescent. in vertice macula cordata flava marginibus nigris. sterni apex bifurcus, obtusus.

567. DYTISCUS elytris striis viginti dimidiatis.

Bradl. nat. t. 26. f. 2. l. A.

Raj.

Raj. inf. p. 94. n. 2. *Hydrocantharus elytris striatis f. canaliculatis.*

Frisch. germ. 2. p. 35. t. 7. f. 4.

Habitat in aquis stagnantibus præsertim.

DESCR. An idem sed sexu distinctus cum 565 Specie? Elytra profunde striata s. fulcata, sed non secundum totam longitudinem, relictæ spatio lœvi versus apicem. striæ hæ & elytra glabra sunt: margo elytrorum pallidus: in singulo elytro decem striæ.

568. *DYTISCUS supra fuscus*, subtus ater.

Habitat in aquis.

DESCR. Est inter minores, totus lœvissimus: apex sterni bifurcus, obtusus.

569. *DYTISCUS elytris sulcis decem longitudinalibus.*

Raj. inf. 94. f. 3. *Hydrocantharus minor*, corpore rotundo plano.

Habitat in aquis. *Malmborg.*

DESCR. Est inter minores, & penultimo longe minor. Thorax niger, margine & linea transversa flava. Elytra nigra, singula quatuor vel quinque sulcis latis longitudinaliter excavata, & pilis griseo-cinerea, interiacentibus marginibus nigris glabris. Apex sterni bifurcus est.

570. *DYTISCUS ovato-oblongus niger*: capite pedibusque rufis.

Habitat in aquis stagnantibus, agilis valde.

DESCR. Magnitudo seminis oryzæ, supra lœvis, niger: caput, exceptis oculis, rufum. pedes rufi; antennæ nigrae.

571. *DYTISCUS ovatus fuscus*: capite thoraceque rubris.

Act. upsi. 1736. p. 15. n. 5. *Dytiscus ovatus*, collari ventreque rubro; alis fuscis.

Habitat in fontibus cum Monoculo frequens.

DESCR. Magnitudo seminis oryzæ, vel pulice paulo major. Elytra fusa; abdomen rubrum. Thorax & caput rufescens. oculi nigri.

* *Antennis clavatis.*

572. *DYTISCUS ovatus glaber*; antennis capite brevioribus obtusis.

Merr. pin. 203. pulex aquaticus.

Pet. gaz. p. 21. t. 13. f. 9. *Scarabæus niger nostras supra aquam velociter circumnatans.*

Raj. inf. p. 87. n. 9. Scarabæus aquaticus subrotundus e cœruleo viridi colorc splendente undique tinctus.

Smolandis Watten-bagge.

Habitat in aquis, super quas currit vel natat citissime, citosque gyros & orbes conficit, lacesitus etiam aquam descendit.

DESCR. Noster niger omnino est; pedes autem flavi, lati, brevissimi. Antennæ clavatae vel certe non versus apicem angustiores, nec, quantum video, fissæ.

Generis species omnes dorso imposita circumgyrando exsiliunt; viettant rapto; devastant reliqua insecta; quiescent in umbra; si diutius in sicco fervantur vivi, vix dein submergi possunt; habitant in agris; parent pedum unguis.

Elater.

573. ELATER thorace villoso; elytris testaceis, apice nigris.

Lift. loqu. p. 387. n. 18. Scarabæus ex fusco rufescens sive castaneus.

Raj. hist. p. 92. n. 6. Scarabæus antennis articulatis quarto & quinto æqualis.

Habitat frequens inter segetes & in pratis.

DESCR. Pedes, alæ, antennæ ramose & elytrorum apices nigra. Thorax villis subcinereo-testaceis tectus. Elytra rubicunda s. pallide incarnata, tenuissime striata, apice nigro.

574. ELATER niger, elytris rubris.

Habitat in sylvis.

DESCR. Magnitudine & facie ad antecedenterem accedit, sed thorax glaber uti & caput nigra. Elytra rubra strijs tenuissimis, ex punctis per novem ordines in singulo elytro. Antennæ femipectinatae. Os edentulum.

575. ELATER fusco-viridi-æneus.

Lift. mut. t. 17. f. 14. mas. & f. 14. femina.

loqu. p. 387. n. 19. Scarabæus e nigro virens corniculis altero tantum verso pectinatis. (Mas).

Aet. upf. 1736. p. 15. n. 3. Notopeda nigro-ænea, antennis simplicibus.

Habitat hinc inde in pratis.

DESCR. Hæc species sequenti major est. MAS thorace & elytris magis saturate viret & angustior est, antennis valde pectinatis.

FEMINA magis ænea: thorace latiore nitidiore virescente: elytris magis nigricantibus. antennis filiformibus minime pectinatis.

576. ELATER niger, thorace rubro.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Attelabus oblongus niger, collari testaceo.

Habitat apud nos ad agrorum margines. sed rarissime.

DESCR. Inter nostros minimus vel reliquis fere dimidio minor: *Tor* tus ater, sed elytra, quæ etiam striata, parum ad cœruleum vergunt colorem. Thorax maxima ex parte ruber; sed antice niger, in media tamen magis: postice levissimo margine elytra spectante etiam niger, hinc thorax quasi fascia transversali lata, rubra, lunulata, cavitate lunulæ caput spectante. Antennæ nigre, non pectinatae, sed articulis pa- rum antice gibbis.

577. ELATER totus nigro-fuscus.

Raj. inf. 78. Scarabæus minor longo & angusto corpore, totus niger, saltatrix.

α *Raj. inf. p. 92. n. 1.* Scarabæus antennis articulatis primus maxime vulgaris.

Act. upf. 1736. p. 15. n. 4. Notopeda atra, antennis simplicibus.

β *Raj. inf. p. 92. n. 3.* Scarabæus antennis articula- tis tertius.

Act. upf. 1736. p. 15. n. 5. Notopeda fusca; an- tensis simplicibus.

Lift. mut. t. 17. f. 14.

Habitat in pasculis.

DESCR. Totus niger vel ad cinereum s. fuscum vergens s. colore mu- rino. Antennæ in omnibus a me visis absque ramis sunt. corpus ra- tione magnitudinis, brevius quam in reliquis.

578. ELATER viridi-aeneus, pedibus fulvis. *De Geer.*

Habitat - - - - -

DESCR. Inter majusculos. Elytra striata: Antennæ filiformes.

579. ELATER niger, elytris cœruleis.

Habitat *Upsaliæ. D. Malmborg.*

DESCR. Corpus totum subtus cum pedibus antennisque nigrum: *thorax* nigro-cœrulescens: *elytra* e nigro-cœrulea, singula striis decem insculpta.

580. ELATER niger: elytris antice dimidiato rufis. *De Geer.*

Habitat in *Rostagia.*

DESCR. Est iater minores. Antennæ filiformes.

581. ELATER niger; elytrorum latere exteriore livido.
De Geer.

Habitat in *Roslagia*.

DESCR. Est inter minores. *elytra* livida, sutura longitudinali nigra. *pedes* flavescens.

582. ELATER thorace rubro; elytris griseis.

Habitat *Upsaliæ*.

DESCR. Est inter minores sui generis. *caput* nigrum. *thorax* ruber. *Elytra* grisea, singula septem punctorum excavatorum ordinibus striata. *Regio tota* subtus cum *abdomine*, *pedibus*, *thorace* *fusca*.

583. ELATER niger, elytris fuscis, antennis pedibusque rufis.

Habitat in agris.

DESCR. Hic pediculo duplo major, in sua vero specie minimus; totus niger, sed *elytra* fusca seu cinerascentia. *pedes* rufi, adhuc antennæ magis rufæ.

Generis hujus omnes species dorso impositæ exsiliunt lepide quasi convulsi, mediante pectoris apice prominulo in fossulata incidente; omnes corpore angusto gaudent.

Cantharis.

584. CANTHARIS fæmina aptera.

Aldr. inf. p. 492.

Column. ecpbr. I. p. 38. t. 36. Noctiluca terrestris.

Jonst. inf. p. 108. t. 14. f. 2. Cicindela Mouff.

Charl. exerc. p. 47. Cicindela.

Mouff. lat. p. 109. f. 1. mas. 2 fæmina.

Merret. pin. p. 201. Cicindela.

Wagn. helv. p. 239. Cicindela, Lampyris.

Bradl. nat. t. 26. f. 3. A. fæmina. B. mas.

Raj. inf. p. 79. Cicindela impennis f. fæmina.

p. 78. Scarabæus Lampyris fordide nigri-

cans, corpore longo angusto f. Cicindela mas.

Dal. pharm. p. 391. Cicindela.

Suecic Lysmalk.

Habitat æstate frequens in juniperetis supra terram.

DESCR. Marem non dum vidimus, sed solam fæminam, quæ & elytris & alis caret, ex plicis tamen abdominis & scuti pectoralis figura hario. Iamur marem reliquis Cantharidibus fore simillimum. Fæmina constat in cœluris undecim; quarum prima est thoracis clypeus incumbens, planus, marginatus, sepiovatus, pone truncatus, sub quo caput minimum. Tres ultimi corporis articuli subtus flavescentes noctu lumen de se spargunt platerium.

Quam-

Quamdiu vivit, nocte lucet; mortua lumen amittit: in cespite gramineo viridi & succulento diutius viva servari potest. Hoc lumen creditur ea spargere, sola ut mares eam facilius reperiant, atque ipsis candela instar inferviat.

585. CANTHARIS elytris testaceis; thorace rubro immaculato.

Raj. inf. p. 84. n. 28. *Cantharus sepiarius major*, e rufo flavicans, elytris non maculatis.

Att. upf. 1736. p. 19. n. 1. *Cantharis elytris testaceis.*

Habitat cum sequenti vulgaris.

DESCR. Magnitudo, figura & omnia omnino ut in sequenti, excepto solo colore elytrorum luteo-pallido & thorace immaculato. oculi nigri sunt.

586. CANTHARIS elytris nigricantibus; thorace rubro: nigra macula. *It. ael. 38.*

Raj. inf. p. 84. n. 29. *Chantharus sepiarius major*, elytris nigricantibus, dorso s. thorace supino obscure rufo.

inf. p. 101. n. 2. *Cantharis semunciam longa.*

Frisch. germ. 6. p. 36. t. 3. ic. 6. f. 5. *Scarabaeus arboreus nigro-fuscus*, elytris tenuibus.

Att. upf. 1736. p. 19. n. 2. *Cantharis elytris fuscis.*

Habitat ubique sat apud nos frequens.

DESCR. Animal oblongum, molliusculum. *Caput* nigrum, planiusculum, infra oculos rufescens, *os* minimum, forcipatum: maxillis arcuatibus, simplicibus, quibus frusta mordet. antennulae ad maxillas minimae, *antenna* communes corpore diuidio breviores, filiformes, articulis undecim, fuscae, sed capiti proprius rufescens. *thorax* a tergo planus, cordatus, marginibus eminentibus, rufescens, excepta macula magna nigra capiti contigua. *Elytra* plana, oblongo-linearia, mollissima, flexilia, sericea, fusco-nigra. *alæ* diaphano-fuscae. *abdomen* fuscum excepto ultimo seu septimo articulo rubicundo, ut & marginibus lateralibus rubris. hi margines laterales compressi, singula incisura plicatim incombente, molliissimi, apicibus incisurarum lateralium mammillaribus,

587. CANTHARIS elytris rubris; thorace rubro nigra macula.

Frisch. germ. 12. p. 41. t. 3. ic. 7. f. 2. *Scarabaeus arboreus parvus ruber*, elytris longis, clypeo pettorali linea nigra.

Raj. inf. p. 101. n. 4. *Cantharis prioribus similis quarta.*

Act. upf. 1736. p. 19. n. 3. Cantharis elytris ruber-rimis.

Habitat variis in locis, præsertim *Dannemore* in a-cervis mineræ ferreas frequens.

DESCR. Præcedentibus dimidio minor. Totum corpus (excepto thorace & elytris) atrum. antennæ filiformes, sed articulis apice antorsum prominulis; macula dorsalis thoracis atra etiam scutellum tegit. Elytra mollia, saturatissime rubra s. coccinea, tenuissime striata. Alæ fuscæ.

588. CANTHARIS viridi-ænea; elytris extrorsum rubris.

Raj. inf. 77. Scarabæus minor; corpore longiusculo; elytris rubicundis.

Habitat in *Urtica* majore rarius, nec non in plantis variis.

DESCR. Est hæc e mediæ magnitudinis; præcedentibus minor, sequentibus major. Caput, thorax, antennæ, abdominis annuli supra & infra, elytra versus basin & marginem interiorem viridi-ænea, at elytrorum pars postica versus apicem & etiam versus marginem exteriorem sive lateralem rubra, ita ut Elytra maxima ex parte rubra sint, & a basi versus futuram longitudinali viridi-ænea. ad latera thoracis, ut & abdominis, utrinque vescula coccinea bicornis. Alæ fuscæ.

589. CANTHARIS æneo-viridis, elytris apice rubris.

It. al. 127.

Raj. inf. p. 101. n. 7. Cantharis vix tres octavas unciae longa.

Act. upf. 1736. p. 19. n. 5. Cantharis elytris viridi-æneis apice rubris.

Habitat frequens in graminibus, præsertim in *Care-cibus*.

DESCR. Præcedenti, cui facie simillima est, omnino minor. ad latera thoracis & abdominis etiam utrinque gerit vesículam coccineam tricuspidem. alæ nigro-fuscæ. antennæ nigrae. Caput, thorax & elytra æneo saturate viridia, extimis apicibus elytrorum rubris seu coccineis. Abdomen e-lytris longius, subtrus æneum, sub alis rubrum. variat elytrorum colore cæruleo vel magis viridi.

590. CANTHARIS elytris nigris: fasciis duabus rubris

Act. upf. 1736. p. 19. n. 6.

Habitat in plantis..

DESCR. Magnitudo pediculi, sive decuplo minor quam antecedens. antennæ & pedes nigri. Caput & thorax virescentia; Elytra atra, fascia duplice rubra transversa, altera paulo supra basin, in medio ad futuram interrupta; altera in ipsis apicibus elytrorum, vel paulo intra apices in quibusdam; hæc in medio contigua. Abdominis latera rubra.

591. CANTHARIS elytris nigris: apice flavis, thorace atro.

Habitat - - -

DESCR. Magnitudo & facies praecedentis; sed caput & thorax omnino altra. Elytra apicibus summis flava seu sulphurea, abdominis latera flava,

592. CANTHARIS fusca, elytris apice flavis, thorace rufo.

Habitat - - -

DESCR. Magnitudo pediculi. Caput atrum. Thorax rufo-ferrugineus, macula nigra. Elytra fusca abdomine dimidio breviora, apicibus flavis. fessura nigra. Tibiae pallidæ; abdominalibus segmentis margine flavis; adeoque thorace a praecedente manifeste differt.

593. CANTHARIS nigra, elytris lividis. De Geer.

Habitat in plantis.

DESCR. Est e minimis generis sui.

Tenebrio.

594. TENEBRIÖ atra, coleopteris pone acuminatis.

Aldr. inf. p. 499.

Mouff. lat. p. 138. f. 139. Blatta foetida tertia.

Charl. exerc. p. 48. Blatta foetida.

Fonst. inf. t. 16.

Merr. pin. 202. Blatta foetida.

Pet. gaz. p. 38. t. 24. f. 7. Scarabæus impennis tardipes.

Lift. loqu. p. 388. n. 21. Scarabæus e toto niger minime nitens foetidus?

Raj. inf. 89. Scarabæus niger rotundus laevis, antennæ globosis.

Frisch. germ. 13. p. 27. t. 25. Scarabæus terrestris & itercorarius niger foetidus.

Dal. pharm. p. 91. Blatta officinarum.

It. œl. 62. Tenebrio primus.

Suecic Skrobbæ.

Habitat inter quisquilias hortorum & agrorum; crudelium vulgus intra domos hanc ambulantem observantes mortis nunciam esse sibi persuadet.

DESCR. Tota atra & omnino picea est. Elytra secundum longitudinem totam coanata, alæ nulla, antennæ longiusculæ, articulis lentiformibus, ultimis

ultimo globoso. sepe terminantur Elytra apice, a dorso, rimula. *Thorax marginatus*, punctatus. Elytra rugosa.

Speciem aliam habet *Pet. gaz.* p. 19. t. 12. f. 6. quæ rotundior, & *List. loqu.* p. 388. n. 20, mat. t. 18. f. 3, quæ violacea, ab hæc diversa. *Lister* suam describit magis ventricosam, proin si ejus descriptio referatur ad tab. 18. f. 3. in tabulis mutis a nostra diversa erit.

595. TENEBRIÖ atra; coleoptris pone rotundatis; maxillis prominentibus. *De Geer.*

Frisch. germ. 13. p. 27. t. 22.

Habitat - - -

DESCR. Minor. *Thorax* ut in *Carabis*. *femora clavata*. *maxillæ capitis* longitudine, cum in precedenti breviora.

Meloe.

596. MELOE.

Mouff. lat. 162. f. med. Proscarabæus.

Jonst. ins. p. 74. t. 15. Proscarabæi fæmina.

Charl. exerc. p. 46. Proscarabæus f. anti - *Cantharus*.

Hoffn. ins. 2. t. 9.

Merr. pin. p. 201. Proscarabæus.

Wagn. helv. p. 234.

Gœd. belg. 2. p. 152. f. 42.

List. gœd. p. 292. f. 120.

loqu. Scarabætis mollis ex nigro viola nitens.

Frisch. germ. 6. p. 14. t. 6. f. 5.

Dal. pharm. p. 391. Proscarabæus.

Schrœd. pharm. 5. p. 345. Chantharus unctuosus.

Habitat ad margines agrorum & in collibus soli expositis mense Majo. tacta oleum limpidissimum ex omnibus pedum geniculis emitit.

DESCR. Totum animal molle est & atrum; pedes, antennæ, abdomen paulo magis violacea. elytra coriacea, mollia, rugosa, minime nitida. antennæ moniliformes, in fæmina abdomeni longius elytris. alæ nullæ.

Necydalis.

597. NECYDALIS elytris apice lineola alba. *It. œl.* 74.

Att. upf. 1736. p. 38. n. 16. *Cimex longus* depresso-sus griseus: genubus globosis.

Habitat in sepibus.

DESCR. Caput nigrum. Thorax oblongus, ater, punctis duobus nitidis dorsibus. Elytra grisea, basi angulata, ab domine dimidio breviora, apice

ce dehiscentia inter se, & singula macula linearis alba apice notata. *alæ* feminudæ, ut in hemipteris cruciatæ, nec intra elytra retractæ. *antennæ* griseæ, corpore duplo longiores, setaceæ, articulo infimo crasso, secundo minimo, tertio & reliquis oblongis. *Pedes* grisei. *femora* versus apicem valde crassa, clavata, & in eodem loco fere globosa. Ex antennis esset Cerambyx! ex pedibus Leptura! ex elytris Forficula! cum Cerambyce tamen maxime adfinis, licet externa facie dissimilis.

598. NECYDALIS elytris apice puncto flavo.

Habitantem reperi in Heliantho tuberoso.

DESCR. Pediculo paulo major. *Caput* nigrum, maxillis flavis. *thorax* flavus, marginatus. *Elytra* nigricantia, in medio fusca apice flavo puncto terminata. *alæ* nigre, elytris duplo longiores cruciatim incunacientes. *antennæ* corpore breviores, filiformes, nigricantes, versus basin flavescentes. *femora* nigra, tibiis flavis. *abdomen* fuscum, lateribus flavis.

Forficula.

599. FORFICULA alis apice macula alba.

Mouff. lat. p. 171. f. infim. *Forficula* f. *Auricularia* vulgatior.

Jonst. inf. t. 16. f. 2. *Forficula*.

Merian. europ. gall. t. 30.

Lift. mut. t. 31. f. A.

Loqu. p. 391. n. 25. *Scarabæus* subrufus, cauda forcipata.

Pet. gaz. t. 74. f. 5. *Forficula vulgaris*.

Frisch. germ. 8. p. 31. t. 15. f. 2. mas. 1. *fæmina*. *Vermis auricularis*.

Act. ups. 1736. p. 15. n. 4. ♂ 6. *Forficula mollis* cineræ cauda forcipata. (*Larva*?)

Suecic Twestiæ, Oernmask.

Habitat in terra prægnanti.

DESCR. Insectum oblongum. *Antennæ* setaceæ, longæ, tredecim vel quatuordecim articulis. *Clypeus thoracis* planus, antice truncatus, posse rotundatus, pallidus, in medio niger. *Elytra* pallide rufa. *Alæ* extra elytra prominula, apice extorsum alba: ovata macula. *Abdomen* rufescens, nudum. *Cauda* duobus unguibus arcuatis, apice conniventibus, corneis, forcipata.

600. FORFICULA alis elytro concoloribus.

Habitat in sterquiliniis.

DESCR. Dīmidio minor est hæc species, colore castaneo. *Caput* & *thorax* nigricantia. *Elytra* & *Alæ* (quaæ complicatae apice prominent) castanea; *abdomen* castaneum. *forfex* caudæ erector. *Antennæ* X. tantum articulis, non vero XIV. uti precedens. *Pedes* & *abdomen* subtus pallidiora.

Staphylinus.

601. STAPHYLINUS hirsutus niger, thorace abdome
mineque infimo flavo.

Act. upf. 1736. p. 15. n. 1. Forficula hirsuta, nigra,
nitida: capite, collo, cinguloque ventris flavis.
Habitat in locis arenosis apud nos rarus, in Ost-
Frisia vulgatissimum observavimus.

DESCR. Magnitudo Bombylii, totus valde hirsutus. *caput* nigrum;
thorax flavus. *elytra* cinerea. *abdomen* antice nigrum, pone luteum;
pedes nigri, etiam hirsuti.

602. STAPHYLINUS pubescens cinereus nigro - ne-
bulosus.

Habitat in fimo equino.

DESCR. Insectum inter maiores, non maximos, numerandum est; oblongum,
pubescens, cinereo - ceneus, maculis nigris, perlucentibus. *Antennae* articulis IX. *Caput* depresso: os forcipatum. *thorax* angustus.
Elytra brevia, capiti & thoraci concoloria. *Abdomen* fuscum maculis
nigris. *Cauda* duabus fetis villosis; abdomine presso exirent ad caudam
duo cornicula mollia, reculta, alba, pellucida.

603. STAPHYLINUS ater glaber; maxillis longitu-
dine capitis.

Jonst. inf. t. 17. f. 1. 2. 3. Staphylinus.

Mouff. lat. p. 197. Staphylinus.

List. log. p. 391. n. 2. Scarabaeus majusculus ni-
ger, forcipibus infestis.

Raj. inf. p. 109. n. 1. Staphylinus major, totus niger.

Act. upf. 1736. p. 15. n. 2. 3. Forficula collaris ni-
gro: elytris nebulosis.

Habitat in sylvis, vietitat aliis insectis, sub metu
caudam reflectit & duas vesiculos cordatas exferit.

DESCR. Hic maximus inter nostros est. *Caput* & *thorax* atra, glabra.
Elytra atra, (in quibusdam cinctis leviter nebulosa) obtusa. *dorsum* ab-
dominis caudae concolor. *pedes* nigri. *Os* duabus maxillis arcuatis du-
bris acuminatissimis simplicibus, capite longioribus.

604. STAPHYLINUS ater; elytris pedibusque rufis.

Act. upf. 1736. p. 15. n. 6. Forficula collaris nigro,
ventre atro, elytris testaceis.

Frisch. germ. 5. p. 49. t. 25. Scarabaeus rapax, ely-
tris brevibus.

Habitat in stercore, edit alia insecta.

DESCR. Et inter maiores, non maximos, numerandus. *Caput* & *thorax*
ni-

nigra. Abdomen nigrum micante punctato deaurato in singulo segmento utrinque. Elytra & pedes rufa. Antennæ nigrae basi & apice rufescentes.

- 605. STAPHYLINUS niger**; thorace æneo nitido, elytris atro-cæruleis.

Act. upsi. 1736. p. 15. n. 7. Forficula collari nigro, ventre atro, elytris cærulescentibus.

DESCR. Est e mediis speciebus. Caput & thorax polita, nitida. Elytra punctis minutissimis adpersa. Antennæ XI. articulis.

Variat in hac specie color thoracis & coleoptri: in aliis thorax æneus, & elytra atro-cærulea; in aliis thorax ater nitidus, & elytra atra.

Differentia specifica essentialis consistit in thorace decem punctis excavatis, sed vix absque lente conspiciendis.

- 606. STAPHYLINUS rufus**; capite elytris abdomine neque pone nigris.

Act. upsi. 1736. p. 15. n. 8. Forficula collari testaceo, elytris ventreque testaceis: apicibus nigris.

Habitat in arenis ripariis.

DESCR. Est hic mediæ magnitudinis. Rafa sunt thorax, pedes, abdomen maxima ex parte & elytra antice; nigra vero os, caput, elytra pone & in medio ad futuram, nec non abdominis tria ultima segmenta: Antennæ fere clavatae.

- 607. STAPHYLINUS rufus**; elytris cæruleis, capite abdominalisque apice nigris. *It. gotl. 173.*

Habitat in Gotlandia inter arenam ripariam.

DESCR. Magnitudo formicæ nigrae. Totus incarnatus, sed capite & abdominis tria quatuorve ultima segmenta attra; Elytra tota cærulea; femora incarnata geniculis nigris. Antennæ articulis XI, ovalibus, caput versus angustis, excepto ultimo extrorsum angustato; sunt etiam antennæ pallidæ apice nigrae. antennulæ oris clavatae, apice nigrae. maxilla acuta; denticulo laterali interno.

- 608. STAPHYLINUS fusca**; elytrorum futura ab domine pedibusque ferruginea.

Habitat in lignis putridis.

DESCR. Magnitudo minimæ formicæ; Corpus totum lineare, longiusculum. Caput & thorax glabra, fusca: thorax versus elytra duobus punctis excavatis notatus. Elytra fusca, sed ferruginea ad futuram longitudinalem. Abdomen & Pedes ferruginei.

- 609. STAPHYLINUS ater glaber**; pedibus rufis.

Act. upsi. 1736. p. 15. n. 10. Forficula tota atra.

Habitat

DESCR. Magnitudo formicæ. Totus ater, glaber, exceptis rufis pedibus; nec thorax, nec elytra punctata. Os flavescens. Caput & Antennæ nigrae. Abdomen glabrum a tergo.

610. STAPHYLINUS ater glaber; pedibus rufis, elytrorum margine flavo.

Habitat *Upsaliæ*. *P. Kalm.*

DESCR. Est inter omnes nostros minimus, utpote qui pulicem non excedit. Thorax & elytra latae glabra, atra, margine elytrorum anum spectante rufo. pedes testacei. Priori similis, sed quadruplo minor. Abdomen fere subulatum.

611. STAPHYLINUS niger; elytris antice griseis, pedibus rufis. *It. gotl. 173.*

Habitat in *Arena riparia humida*, sub qua cuniculos facit, præsertim in *Gotlandia*.

DESCR. Magnitudo pediculi: Abdomen infra elytra admodum acuminatum, nigrum. Thorax niger: lateribus versus basin parum testaceis, pedes longiusculi testacei. Elytra nigra, in medio versus basin grisea, seu macula magna testacea fusca, utraqve elytra occupante, juxta basin. Os flavum.

612. STAPHYLINUS niger; elytris sanguineis.

Aet. upf. 1736. p. 15. n. 12. Forficula nigra, elytris sanguineis.

Habitat passim vagus.

DESCR. Magnitudo pediculi, Totus ater, glaber, exceptis elytris sanguineis.

613. STAPHYLINUS totus testaceus.

Habitat in plantis & stercore.

DESCR. Magnitudo antecedentis. Totus ejusdem coloris seu dilute testaceus aut flavescens, excepto abdome, a tergo pone elytra, paulo magis fusco seu obscuro. Antennæ longiusculæ sunt & facies fere Carabi. Duas setas in cauda nondum vidi.

614. STAPHYLINUS niger; thorace elytris pedibusque subtestaceis.

Habitat.

DESCR. Magnitudo pediculi. Caput nigrum, thorax glaber, convexus, supra & subtus cereus sive pallide testaceus. Elytra thorace concoloria, sed antice & ad marginem exteriorem nigricantia, pone omnino, uti thorax, colore & glabritie. pedes magis saturate ferruginei. Abdomen nigrum, pone elytra pilis hispidum.

615. STAPHYLINUS niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in *Scania*. *D. Leche.*

DESCR. Pediculo dimidio minor, oblongus, niger, sed Elytra ferruginea, & Antennæ & Pedes minus ferruginea quam elytra.

616. STAPHYLINUS niger; elytris tibiisque fuscis.

Habitat in Scania.

DESCR. Pediculo fere major. Totus atet, glaber. Elytra fusca: tibiae flavescentes, non vero Femora. Thorax, caput & maxilla ratione magnitudinis insignes.

Blattā.

617. BLATTA ferrugineo-fusca; elytris fulco ovato impressis.

Mouff. lat. p. 138. f. 2. 3. Blatta molendinaria & piltrinaria.

Column. ecphr. I. p. 40. t. 36. Scarabaeus alter testudinatus minor atque alatus.

Jonst. ins. t. 13. f. A. Grylli.

Lift. mat. t. 18. f. 2. fæmina.

Barthol. act. 1671. p. 107. t. 108. Gryllus alatus (& repens) vermis in saccharo.

Raj. ins. p. 68. Blatta prima sive mollis Mouffeti.

Frisch. germ. 5. p. 11. t. 3. Blatta lucifuga sive molendinaria.

Fennonibus Torrakå. Dracan.

Habitat in Molendinis, praesertim in fumosis hypocautis Fennionum (Pyrten) ubi devastat panes, ocreas & varia utensilia incolarum; rarius Stockholmiae & alibi. noctu prædatur; accensa candela aufugit oxyus.

DESCR. Magnitudo Grylli; tota testaceo-fusca seu ferrugineo nigritans, & quasiusta. Clypeus thoraci incumbens planus, ovalis, transversalis. Elytra diaphana, abdomine breviota, ovali-oblonga: singula tribus striis a basi exentibus, quatum intermedia elevata; interior excavata, incurvata, conficiens cum pari spatiu ovatum inclusum; exterior excavata juxta marginem, brevis; striæ absque ullo certo ordine: cauda duobus mucronibus. Pedes aculeati. MAS alas & elytra gerit, fæmina ejus tantum rudimenta.

618. BLATTA flavescentis; elytris nigro maculatis.

Act. upf. 1736. p. 35. n. 2. Lampyris alis superioribus ad angulum acutum striatis.

Habitat in Casis Lapponum sylvaticorum inter piscium squamas frequentissima. Dum pisces abs-

que sale a Lapponibus exsiccantur, sæpe unico die, ab hac omnino consumuntur.

DESCR. Magnitudo majoris muscae. *Thorax* clypeus membranaceus, patens, marginatus, ovalis, diaphanus. *Elytra* membranaceo-pellucida, cornæ coloris, stria longitudinali elevata, in qua striae ducuntur versus posteriores margines utrinque, ut coëant in striam longitudinalem minores ad angulum acutum; puncta aliquot nigricantia temere elytis adspersa. *Pedes* cornæ coloris: tibiae spinolæ. *Antennæ* longæ, setaceæ. *Alæ* inferiores aqueæ. *cornicula* duo articulata, recurva supra anum.

Gryllus.

619. **GRYLLUS** pedibus anticis palmatis.

Imp. alt. p. 692. *Talpa* insectum.

Aldr. inf. p. 571. *Talpa ferrantis imperati.*

Velsch. hecateost. I. p. 39. *Talpa ferrantis imperati.*

Mouff. lat. p. 104. *Gryllo-talpa.*

Jonst. inf. t. 12. 13. *Gryllo-talpa.*

Hoffn. inf. t. 4. f. ult. æ. *Edit alt.* 3. t. 6.

Goed. belg. I. p. 168. t. 76. *Gryllo-talpa.*

Lift. goed. p. 288. f. 119. *Gryllo-talpa.*

Barth. act. 4. p. 9. f. 1. *Gryllo-talpa.*

Werm. mus. p. 243. *Gryllo-talpa.*

Wagn. helv. 233. *Gryllo-talpa.*

Charl. exerc. p. 44. *Gryllo-talpa.*

Raj. inf. p. 64. 67. *Gryllo-talpa* *Mouffeti.*

Eph. N. C. dec. 2. ann. I. p. 154. *Gryllo-talpa.*

Frisch. germ. II. p. 28. t. 5. *Gryllus campestris*,
pedibus talpæ.

Black. herb. t. 81. f. 10.

Habitat in *Scania campestri*, ubi vesperi cantillat
uti *Ranula* 251 vel *Ortygometra* 162. *avicula.*

DESCR. Differt a reliquis manifeste varie notis. 1. Magnitudine, ut-pote omnibus nostris Insectis, excepto *Cancro*; major. 2. Pedibus anti-cis villosis & palmatis. 3. alis superioribus cinereis vasis nigricantibus; inferioribus longioribus, acuminatis. Cauda bifera est, uti sequentis.

620. **GRYLLUS** cauda bifeta, alis inferioribus acumi-natis, longioribus, pedibus simplicibus.

Mouff. lat. p. 135. *Gryllus domesticus.*

Jonst. inf. t. 12. *Grylli Mouffeti* & t. 13. f. D.

Charl. exerc. p. 44. *Gryllus domesticus.*

Hoffn.

Hoffn. inf. p. 11. f. 4. *Gryllus paludum*

Raj. inf. p. 63. *Gryllus domesticus.*

Suecic. *Syrfa.*

Habitat apud nos in Domibus, ubi in argillaceis muris cuniculos format, & stridule cantillat, præsertim per noctes, inhabitatoribus ingratus.

621. **GRYLLUS** cauda ensifera recta, corpore sub-viridi. *It. gotl. 253.*

Jonst. inf. t. 11. f. 1. 2. 3. *Locusta hewschrecken Mouffetæ.* *t. 13. f. 13.*

Hoffn. inf. t. 5. f. 16. 17.

Rob. ic. t. 27.

Merian. europ. t. 176.

Eph. N. C. dec. 2. ann. 11. obs. 16. p. 40.

Raj. inf. p. 61. *Locusta viridis major.*

Frisch. germ. 12. p. 3. t. 2. f. 1. *Locusta major viridis.*

Suecic. *Wårtbit.*

Habitat in pratis. Rustici huic insecto verrucas manus admovent, quas præmordet & evomit in vulnus liquorem, unde verruca contabescit.

DESCR. Distinguitur a reliquis variis notis. Thoracis armatura triangulari, seu ad latera deorsum producta & a tergo versus alas dilatata. *Fæmina* ad annumensem gerit bivalvem; *Mas* elytris versus basin foramine amplio, membrana pellucida consolidato, quibus soinum efficit sub cantu. Color totius corporis maxima ex parte viridis.

622. **GRYLLUS** cauda ensifera recurvata.

Gæd. belg. 2. p. 165. t. 40. *Sprinckhanen,*

Lift. gæd. p. 301. t. 121. *Acrigoneus.*

Frisch. germ. 2. t. 2. f. 4. an?

Habitat in Tiliis, ubi cantillat mense Angusto, præsertim copiose in prædio Fullerön Comitis Jæ. Cronstedt Regni Sueciæ Senatoris.

623. **GRYLLUS** elytris nullis, thorace in elytron longitudinale extenso: macula utrinque rhombœa nigra.

Raj. inf. p. 60. *Locusta minor fuscescens, cucullo longo rhomboide.*

Act. upf. 1736. p. 34. n. 9. Gryllus alis superioribus nullis, collaris producto ad longitudinem abdominis.

Habitat in pratis siccioribus.

DESCR. Est Species e minimis hujus generis. Manifeste distinguitur ab aliis omnibus scuto thoraci, producto a tergo ad longitudinem abdominis, linea longitudinali elevata, & punctis duobus oppositis atris rhombis sepe in medio longitudinis. Elytra non habet, nec his opus habet, cum thorax horum vices gerat. Alae due albæ sub hac crusta absconduntur. Antennæ breviores sunt in haec, quam in alia ulla. Elytra e thorace prodicte longitudine abdominis.

624. GRYLLUS elytris nullis, thorace producto abdome longiore. *De Geer.*

Habitat in pratis.

625. GRYLLUS elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris. *It. æl. 158.* *Wagn. helv. p. 230. Locusta prima.*

Frisch. germ. 9. p. 4. t. 1. f. 2. Locustæ secunda species.
Act. upf. 1736. p. 34. n. 4. Gryllus alis superioribus umbrosis, inferioribus rubris apicibus nigris.

Habitat in pratis mense Julio stridulus.

DESCR. Antenne corpore dimidio breviores, fuscae, in medio crassiores. Elytra nebulosa. Alæ plicatae, reticulatae, margine undulatae, nigrae versus apicem, alias rubrae. femora saltatoria angulata, ad genu fimbriata, latere inferiore flava & nigra, tibiis flavis. pedes primores, quatuor nigricantes.

626. GRYLLUS superne viridis; elytrorum margine albido.

Frisch. germ. 9. p. 6. n. 7. Locustæ septima species minima.

Habitat copiosissime omnium ad *Bursviken* juxta mare, ubi instar fermentantis segetis ante pedes cadit.

DESCR. Hic inter minimos, (si non minimus omnium) nostros numerandus est. Corpus superne viride, quum caput & thorax supra saturate viridia. Alæ dilute virides, exteriores sive elytra viridia margine exteriore seu laterali albo. Abdomen, pectus, femora, facies pallida. Antennæ articulis XXIII circiter constant.

VARIAT in quibusdam angulo utrinque thoracis dorsali lineola alba & alia lineola alba inter marginem elytrorum album & discum alæ.

627. GRYLLUS incarnatus; femoribus sanguineis, elytris virescenti- subfuscis, antennis cylindricis.

Frisch. germ. 9. p. 5. t. 4.

Habi-

Habitat in pratis rariis, ut *Bolstavik* &c alibi in *Rostagia*.

DESCR. Est e maximis nostris, & major penultima praecedenti sive septima: Est & reliquis pallidior & pedibus rubris saturatiorebus; Abdomen subtus flavum. Elytra flavo-pallida, praesertim antice, alias reticulata usque ad alae. Antennae cylindraceæ 24. articulis. Tibiae posticæ nigrae dentibus albis, terminatae quatuor unguibus praeter unguem palmarum. Femora postica latere interiore rubra. Tonus supra obsolete brunneus seu fusco-lividus. inter pedes anticos acumen thoracis flavescentes.

628. GRYLLUS antennis longitudine corporis. It. æl.

157.

Habitat in *Oelandiæ* campis (Alvar) mense Julio, praesertim circa Borgholm copiosissime, ubi instar pulveris volatilis ante pedes ambulantis dispersitur.

DESCR. Sunt hi inter minimos hujus generis, seu magnitudine 626; magis dein flavae, quam virescentes. Antennæ corpore ipso longiores. Elytra pallida, albo reticulata, interlucente nigredine. Caput & thorax supra pallida: macula nigra ad latera thoracis. femora pallida: fascia oblonga nigricante. Abdomen supra pallidum, lateribus fuscum, subtus flavo-viride.

629. GRYLLUS antennis subclavatis acutis.

Act. upf. 1736. p. 34. n. 6. Gryllus abdomine pallido, alis griseis unicoloribus.

Habitat in pratis *Rostagia*.

DESCR. Est inter minores, non minimos. Tonus rufus, thoracis anguli nigri lineola alba. femora rubra. Elytra grisea immaculata. Antennæ clavatae, ut in Papilionibus diurnis, sed tamen apice parum elongatis, & summo apice exalbidis.

II. HEMIPTERA.

Cicada.

630. CICADA elytris viridibus, capite flavo: punctis nigris.

Act. upf. 1736. p. 34. n. 11. Gryllus alis superioribus viridibus, inferioribus fuscis, capite flavo.

Raj. inf. p. 68. n. 3. Locusta-pulex tertia.

Habitat sub Augusti finem in pratis paludosis *Uplandie*, saepe copiosissima in *Equiseto* & *Scirpo*.

DESCR. Hæc inter nostras Cicadas maxima est, licet musca domestica non major longitudine, at longe inferior latitudine. Elytra saturate viri

dia. Ale. plumbea. thorax & scutellum viridia. Caput flavescens: duo puncta nigra in occipite & alia ad latera capitis. frons striis transversalibus. Abdomen a tergo plumbeum. Pedes flavescentes.

631. CICADA elytris flavis, linea abrupta dupli longitudinali nigra.

Pet. gaz. 61. f. 10. Ranatra bicolor ex fusco & pallido striata.

Habitat in pratis tempore foeniseccii.

DESCR. Magnitudo fere precedentis; hinc inter majores nostrates species. Tota flava est, sed clausis elytris, ad utrumque latus (dorsi) linea longitudinalis nigra, quæ interrupitur in medio oblique, ac si linea altera a thorace ducta esset, altera ab apice alarum; ambæ licet ad eandem longitudinem, nec tamen sibi invicem occurentes & tangentes in medio; ambae haec fasciæ juxta thoracem coadunantur in unum. in capite & thorace macula utrinque connata nigra. antennæ breves: frons flava striis utrinque transversis: Caput & thorax a tergo nigro-maculata. Elytra flava: linea longitudinali nigra, & alia ab apice basis elytri spectante, sed breviore. Abdomen flavum a tergo, utroque latere nigrum.

632. CICADA fusca; alis aqueis fusco maculatis: nervis punctatis. De Geer.

Habitat in pratis.

DESCR. Est inter majusculas. Alis minus complicatis: alarum nervi elevati maculato-punctati.

633. CICADA nigra; fasciis tribus albis transversis æqualibus.

Act. upf. 1736. p. 35. n. 14. Gryllus alis nigris, fasciis tribus transversis albis.

Habitat in pratis rarius; ad Lapidem Morensem Upsaliæ passim.

DESCR. Ut precedentes magis compressa, quam depressa. Elytra nigro-fusca fasciis duabus, albis transversis, latitudine interjacentis nigredinis. Thorax niger, versus marginem superiorem lineola transversa alba. os album; cætera nigra. Abdomen subtus nigrum. Thorax subtus albicans.

634. CICADA flava; fascia dupli longitudinali repando-dentata.

Habitat in Prædio Cronstedtiano Fullerön.

DESCR. Magnitudo pediculi, adeoque minima. Corpus oblongum, depresso, sulphureum; a tergo, supra elytra, fascia nigra quasi duo cornua nigra tauri prolifera, quorum basis esset thorax; vel aliter: penes basis elytrorum nigrum, a qua utrinque linea inscribens ovatam figuram, & apice cum pari non connexa, sed reflexa, hinc alia linea brevis reflexa: verbo fascia nigra oblonga ante medietatem macula lutea ovata, infra medietatem utrinque dupli denticulo.

635. CICADA flava; elytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris, pone auratis.

Habitat in Scania. *D. Leche.*

DESCR. Oblonga est, & præcedenti, cui similis, duplo aut triplo major, flava est, sed oculi nigri; macula nigra utrinque in thorace. Scutellum nigrum cum inclusu triangulo flavo & linea a thorace ducta flava. Elytra fulva pictis & notatis in medio juxta futuram punctis duobus nigris (in singulo elytro singulis) aliisque duobus punctis nigris, magis versus posteriora alarum, juxta marginem crassiorem: pone elytra auro translucens. corpus nigricans est. Pedes flavi.

636. CICADA fusca; elytris maculis binis albis lateribus: fascia duplice interrupta transversa albida.

Raj. cantab. 112.

inf. p. 67. Locusta-pulex *Svammerdamio*, nobis Cicadula.

Svamm. quart. p. 83. Locusta-pulex.

gall. p. 86.

bibl. 1. p. 215.

Poup. act. gall. 1705. p. 162.

Blank. belg. p. 97. t. II. f. N. O. P.

Pet. gaz. t. 61. f. 9. Ranastra bicolor, capite nigricante.

Frisch. germ. 8. p. 26. f. 12. Vermis spumans.

De Geer. act. Stockh. 1741. p. 221. t. 7. Cicada fusca, alis superioribus maculis albis, in spuma quadam vivens.

Habitat in plantis & Graminibus, cuius Larva latitudo intra spumam hisce saepe adspersam, quam vulgus *Grodsopp* (salivam Ranæ) vocat.

DESCR. Hanc Generosissimum *D. Carolus de Geer* ejusque integrum Historiam adeo graphicè delineavit, figurisque adcuratissimis depinxit, ut nil supra. Docet spumam ex infecti corpore & quidem ex ano, non vero ore, ejici per bullulas: qua singulæ alternatum excernuntur. Variat fusco colore saturiore sive nigro & dilutiore sive cinereo.

637. CICADA exalbida: utrinque linea longitudinali nigra.

Habitat in pascuis.

DESCR. Tota pallida seu exalbida: a fronte utrinque versus elytrorum apices juxta latera ducitur linea alba, ad posteriora latior, terminata antequam apicem alarum attingit: intra has lineas laterales ducuntur striae versus futuram ad angulum acutum caudam versus.

638. CICADA nigra; oculis albis.

Habitat in pascuis.

DESCR. Tota nigra, vel fusco-nigra, minime atra. oculi solum albi prominent.

639. CICADA nigra; elytrorum lateribus albis.

Att. upf. 1736. p. 35. n. 13. Gryllus fuscus alarum margine albo.

Raj. inf. p. 68. n. 2. Locusta pulex fusca.

Habitat in pascuis.

DESCR. Est etiam haec nigra seu nigro-fusca, sed linea lata alba elytrorum margines exteriores tingit. oculi & os alba.

640. CICADA nigra, capite albo.

Habitat in pascuis.

DESCR. Tota nigra, praeter maculam parvam obscuram ad marginem exteriorem juxta elytrorum apices. Caput & thorax dimidia anterior pars alba.

Sunt præterea Species 636 - 640 inter se adeo similes, ut deinde colore vix illa differentia; pleraque harum, dum adhuc larva intra spumam occultantur.

641. CICADA thorace bicorni pone producto, alis nudis.

Habitat in Carduis. R. Hass. Lundini. D. Leche.

DESCR. Monstrissimum & mutilum ad me delatum animalculum. Inter maximas e nostris hujus generis haec est. Caput obtusum. thorax gibbus, utrinque cornutus ut in Cimicis specie 651 & 652, pone productus in carinam subulatam longitudine corporis loco elytrorum, ut in Gryllis 623 - 624 atque lividae, venosae. Pedes rufi, vix saltatrixes. abdomen nigrum.

642. CICADA elytris albido nigroque striatis ad angulum acutum futuræ dorsalis.

Raj. inf. p. 68. n. 1. Locusta-pulex prima.

Habitat in pascuis humentibus.

643. CICADA flava compressa.

Habitat Fahlunæ in pratis.

DESCR. Tota flava est, & precedentibus paulo minor. Duo puncta fusca ad basin capitis a tergo.

OBS. Laternaria Merian. amer. t. 49. Grev. myf. t. 13. f. 1. 2. Ream. gall. 5. t. 20. f. 6. 7. hujus generis est.

644. CICADA alis viridi-luteis; apicibus nigricantibus deauratis.

Habi-

Habitat in *Ulmi* foliis citissime currit & aufugit.
 DESCR. Differt a reliquis cicadis, quod compressa sit, magis currens
 quam saltans.

645. CICADA flava; alis albis apicibus membranaceis.

Frisch. germ. 11. p. 13. t. 20. Pulex foliorum.

Habitat in foliis *Rosæ*.

DESCR. semicylindracea alba, abdomen fravescente, alis albis apicibus
 aquaeis, non deauratis, hinc diversa a præcedenti, alias simillima.

Cimex.

* *Cimices subrotundi.*

646. CIMEX apterus.

Mouff. lat. p. 269. f. superiores. Cimex domesticus.

Mattb. diosc. p. 257. t. 257. Cimices.

Merr. pin. p. 282. Cimex lectularius.

Bonan. microsc. t. 65.

Raj. inf. p. 7. Cimex.

Charl. exerc. p. 52. Cimex.

Aldr. inf. p. 534. Cimex.

Jonst. inf. p. 89. Cimex.

Suec. Wäggles.

Habitat in domibus.

OBS. Alatae non vidimus; sunt qui ferunt Cimicem certo anni tempore
 evadere alatae, quod non repugnat ipsius structuræ; hanc si qui obser-
 vent, eam describant.

**647. CIMEX rostro arcuato, antennis apice capillaceis,
 corpore oblongo nigro.**

Frisch. germ. 10. p. 22. t. 20. Cimex stercorarius ma-
 jor oblongus.

Raj. inf. p. 56. n. 3. Musca cimiciformis 3:ia gravi-
 ter olens.

Lift. loqu. p. 397. n. 38. Cimex maximus pullus s. a-
 tratus, alis nudis ex toto membranaceis. an?

Habitat *Holmiae*, ubi in domo aliqua capta fuit Lar-
 va a Commissario Carolo Clerck, sed non muta-
 batur in volatile, hinc de specie parum certus
 sum. D. de Geer, ad quem hoc animal misit, qui-
 que illud diu aluit, cum Frischii idem esse affere-
 bat; cum Frischio Raji species eadem.

DESCR.

DESCR. *LARVA* erat visu horrenda Araneum vel Phalangium referens, tota hirsuta, lacera, cinerea, arenam vel potius terram sicciam mentiens. Caput & antennæ ut in reliquis erant, & nuda: proboscis sub capite habebat incurvatum, arcuatam. antennæ setaceæ, nude, infimo articulo villosæ, articulis tribus nudis. Pedes sex, postici longissimi, clavati, versus ungues omnes pedes crassi: miro modo cursitat, nec pares pedes simul movere sub incessu, sed diversim, hinc incessus admodum inostrosus. Tota spurcitie obtecta, eamque facile deponit, quam primum penia abs-tergitur, unde apparet non proprios esse crines, sed muruatos & undique corpori impositos, nea quoquam observetur. vittat raptu, editim-
cas & alia infecta.

648. CIMEX subrotundus viridis; margine undique flavo.

Raj. inf. p. 53. n. 1. *de aliis cimicis cimicoides*

Habitat ruri passim.

DESCR. Corpus subrotundum. Antennæ articulis quinque, oblongis, viridibus, infimo minimo. Caput, thorax, scutellum, elytra viridia, scabriuscula: apex testelli flavus. Alæ superiores albidiiores, inferiores magis fuscæ. Venter totus subitus viridis, a dorso vero niger. Rostrum articulis quatuor, infimo adnato. Lingua feracea rostro longitudinaliter immixta; mandibula superior brevissima, subulata, linguam deprimens. Est maximus inter nostrates. dorsum sub alis non rubrum, sed atrum.

649. CIMEX nigricans; abdomine plano: margine imbricatim fecto.

Habitat in truncis exaridis sylvarum vastissimarum.

DESCR. Magnitudine Leptulario major. tota plana, exsucca, subitus nigra. abdominis margo utrinque sex lacinias obtusis colore testæ testudinis. Corpus & thorax ferdida: antennæ trium articulorum. alæ elytraque cinerea.

650. CIMEX griseus: abdominis margine nigro maculato.

Raj. inf. p. 54. n. 2. *Cimex sylvestris*, corpore breviori, fuscus, scapulis magis extantibus, maculae flavo rubente in centro crucis dorsalis. (alius Willugbæi.)

Jonst. inf. t. 17. f. 9.

Lift. mut. t. 31. f. 19. (non figura 16.)

lœqu. p. 396. n. 36. Cimex ex luteo virescente infuscatus, corniculis maculatis similiter ad alvi margines nigris maculis eleganter interstinctus.

Suecic Bärfis.

Habitat communiter in baccis autumno, quas foedo inquinat odore, pueris invisus.

DESCR. Thorax non prominet utrinque in acumen laterale, ut in spe-
cie exotica.

651. *CIMEX griseus ovatus*, thorace utrinque obtuse angulato, pedibus rubris.

Habitat circa Fahlunam, Aboam & alibi rariis.

DESCR. inter maximos est. *Antennæ nigrae versus basia rubrae. Dorsum totum griseum. Thorax angulo utrinque obtuso elevato cornutus. scuti apex ruber. Abdominis margo acutus nigro rubroque varius. pedes fusi.*

652. *CIMEX griseus ovatus*, thorace utrinque acuminne angulato, antennis rufis.

Habitat Fahlunæ.

DESCR. *Corpus griseum undique. Scuti apex lunari-pallidus. liture coccinea subtus in thorace. Antennæ pallide rubrae; Pedes corpori concolores. Præcedenti similis facie & magnitudine.*

653. *CIMEX rubra*; alis fuscis.

Habitat in Urtica & aliis plantis.

DESCR. *Cimicis domestici magnitudo. totus ruber, absque ulla notabili nigra macula. Elytra pumilio sive macula atro-purpurea in medio. Alæ fuscæ. Abdomen sub elytris nigricans. lineola transversa albida in medio elytrorum juxta marginem exteriorem.*

654. *CIMEX ovatus cærulescenti - æneus*, thorace lineola, scutelli apice, elytrisque puncto albo rubrove.

Raj. inf. p. 59. n. 6. Cimex sylvestris cærulescens paulo reliquis minor & magis depresso.

Sloan. hist. 2. p. 203. t.

237. f. 36. 37. Cimex minor cæruleus, lineis albis varius, testudinæ forma.

Habitat in plantis majoribus.

DESCR. *Dorsum totum cærulescens ænco nitens cum capite, thorace, elytris. thoracis linea in medio dorsi longitudinalis versus elytra desinens lineola transversa. Scutelli apex ut & macula e regione in singulo elytro solitaria colorata, ut & punctum parvum ad latus scutelli utrinque, virgo denique lateraliter corporis, his color vel albidus vel rubor. Pedes & antennæ nigrae. corpus subtus nigro-cærulescens. Variat maculis albis & rubris, tamen eadem species ex figura & copula patuit; Mas scilicet maculis albis, fæmina vero rubris nitet.*

655. *CIMEX ovatus niger*; elytris nigro alboque variegatis; alis albis.

Pet.

Pet. gaz. p. 22. t. 14. f. 7. *Cimex niger nostras albō maculatus.*

Lift. log. p. 396. n. 37. *Cimex niger maculatis candidis notatus.*

Raj. ins. p. 54. n. 5. *Cimex sylvestris paivus, corpore rotundiore, colore nigro splendente, maculis albis picto.*

Habitat cum præcedenti in plantis.

DESCR. Magnitudo & figura antecedentis; *totus* a dorso niger; *Elytra nigra*; inacula ad marginem exteriorem alba lannulari juxta basin, & alia macula alba juxta apicem ad marginem; antice ad marginem thoracis utrinque alba macula.

656. CIMEX ovatus, antice attenuatus, cinereo-exalbidus; antennis incarnatis.

Lift. mut. t. 37. f. 20.

Raj. ins. p. 56. n. 6. *Musca cimiciformis sexta* Wilughby.

Habitat *Upsaliæ.*

DESCR. Ovatus est, sed *thorax* cum acumine admodum attenuatus, apice seu fronte tamen obtusus. *Caput, Thorax, scutellum* cinereo-exalbida, punctis minutissimis nigricantibus adspersa; a *thorace* per *caput* duas fasciæ subfuscæ, longitudinales, versus frontem tendentes. *Antennæ* incarnatae aut rufescentes.

657. CIMEX ovatus griseus; alis nebulosis, abdominis lateribus albo nigroque variis.

Habitat frequens in Uplandia.

DESCR. Species est inter mediocres. *totus* superne griseus est & punctis profundis adspersus. *scutellum* versus basin magis fuscum. *Alæ* fusco-nebulosæ. *Antennæ* fere clavatae, fusco-nigricantes, articulis quinque. *dorsum* nigruin sub alis, margine colore albo, dentatum, nigro colore interjectum.

658. CIMEX ovatus griseus; alis albidis, abdominis lateribus rubro nigroque variis.

Act. upf. 1736. p. 35. n. 4. *Cimex subrotundus griseus.*

Habitat rarius ruri.

DESCR. Magnitudine, facie & colore cum superiore convenient, sed omnibus partibus pallidiör est. *Scutellum* ad basin magis fuscum, & superficies exterior punctis excavatis impressa, ut in præcedenti. *Alæ* albae, diaphanae. *Color* dorfi sub alis ruber, (quo manifeste a præcedenti differt, qui piger & viridis) versus basin nigra lata macula, versus anum lineis transversis nigritis, præsettum ad abdominis latera.

659. CIMEX ovatus; elytris lividis: apice fuscis.

Habitat in Scania. *D. Leche.*

DESCR. Magnitudo pulicis. Antennæ pedesque flavescentes. *corpus* nigrum. Elytra livida, apice fusca. *Alæ* aquæ.

660. CIMEX ovatus planus cinereo - nebulosus; scuto lineis tribus elevatis, antennis apice nigris.

Habitat in *Cardui capitulis.*

DESCR. parva est, depresso-plana, oblongo-ovata; *Caput* parvum cinnereum. *Antennæ* 3bus articulis, pallidæ extimo articulo ovato nigro, *thorax* cordatus, acuminatus, marginatus, costis tribus elevatis acutis longitudinalibus. *Alæ* s. coleoptera cinereo-nebulosa cruce elevata & linea utrinque elevata. *Abdomen* subtus & femora nigricantia, *tibiae* pallide. *Sternum* nigrum angustum cinctum linea albida & apice rotundatum albo margine. *LARVA* cinerea antennarum apicibus nigris.

661. CIMEX rotundo-ovatus, nigro rubroque variegatus, capite alisque nigris.

Habitat potissimum in Suecia australi.

DESCR. Est inter latissimos & maximos hic Cimex. *Caput* & *Thorax* tergo ruber, maculis duabus magnis bifidis dehiscentibus capite contiguis. *Scutellum* nigrum macula oblonga versus thoracem bifurca, versus apicem capitata. *Elytra* rubra punctis duobus nigris, altero intra apicem, altero intra marginem medium exteriorem; macula nigra, oblonga secundum marginem interiorem ampliata inter duo puncta. *Alæ* & *pedes* nigra, *abdominis* margo a dorso rubro nigroque variegatus.

* *Cimices oblongi.*

662. CIMEX oblongus rufus immaculatus, thorace utrinque angulato.

Act. upf. 1736. p. 35. n. 1. Cimex alis testaceis, abdome rubro.

Habitat *Fahluna*. *D. Claud. Sohlberg.*

DESCR. Inter maximas nostrates hujus generis hæc est. *Corpus* totum rubrum, non nitidum. *Thorax* rhombæus angulis alas spectantibus truncatis, rectis.

663. CIMEX oblongus viridis; scutello macula cordata flava, elytris dupli macula nigra.

Habitat in *Sylvis*. *P. Kalm.*

DESCR. Facies duorum præcedentium. *Caput* nigrum nucha flavescente, thorax flavus margine antico & postico nigro. *Scutellum* cordatum flavum cinctum nigredine baseos elytrorum. *Elytra* viridi-flavescentia apicibus nigris, & macula utrinque in medio crucis nigra. *Alæ* albescentes. *Abdomen* viride, lateribus & linea longitudinali nigra.

664. CIMEX oblongus rubro nigroque variegatus; alis fuscis, maculis albis,

It.

It. oel. 155. Cimex oblongus rubro nigroque variegatus &c.

Habitat in Oelandia super herbas, rarer in Uplandia.

DESCR. Similis est sequenti in Hyoscyamo, sed duplo major. *Corpus* supra rubrum. *Caput* in medio rubrum utrinque nigrum; *thorax* ruber ante & pone niger. *Scutellum* medio nigrum, lateribus rubrum, nigredine aucta macula cordata nigra versus scutelli apicem. *fascia nigra*, inaequalis, transversa coleopterorum in medio. *ala* fuscæ, maculis albis. *Thorax* rubrus niger. *abdomen* rubrum, ad latera utrinque quinque punctis, duplì ordine, nigris, & subtus utrinque tribus lineolis nigris notatum. *Anus*, antennæ, pedes nigra. *antennæ* quatuor articulis.

665. CIMEX oblongus rubro nigroque variegatus, alis fuscis immaculatis.

Breh. ballon. p. 212. f. 4. Scarabæus parvus.

Pet. gaz. t. 62. f. 2. Cimex hyoscyamoides ruber, maculis nigris.

List. mut. t. 31. f. 21.

loqu. p. 397. n. 39. Cimex miniatus nigris maculis notatus Hyoscyamo fere gaudens.

Raj. inf. p. 55. Cimex sylvestris minor, corpore oblongo, angusto, colore desuper rubro nigris maculis picto.

Habitat in foliis *Hyoscyami* 184.

DESCR. *Caput* nigrum, in medio rubrum. *Thorax* ruber, ante niger, pone duabus nigris angulatis maculis. *Elytra* rubra: macula nigra in medio elytri five due in medio dorsi. *Scutellum* nigrum apice rubro: regio abdominis sub scutello nigra; *abdomen* rubrum, supra anum nigrum, subtus lineis nigris transversis. *Alæ* fuscæ five nigrae, striatae, absque maculis ullis albis. *antennæ* pedesque nigri. *Rostrum* articulis quatuor.

666. CIMEX griseus; scutello macula cordata flava, elytris apice punto fusco.

Habitat in pratis.

DESCR. Dilute testaceus. *scutellum* tegit macula cordata flava. *Elytra* grisea, apice puncto minimo fusco. *Alæ* albæ. his notis certo dignoscitur.

667. CIMEX oblongus-viridis; scutello macula cordata viridi, elytris macula ferruginea.

Habitat in hortis & pratis apud nos frequentissimus.

DESCR. Praecedenti minor & magis oblongus; versus posteriora elytrorum macula magna fusco-ferruginea. *pedes* virides; *antennæ* fuscæ 4 articulis; nullum punctum in apice elytrorum. *Caput* & *thorax* fuscæ. *abdomen* viride, a tergo lineis 7 vel 8 fuscis transversis, & totidem maculis fu-

fuscois utrinque subtus juxta marginem. Hie & precedens macula scutelli cordata a reliquis facile distinguitur.

668. CIMEX oblongus griseus immaculatus, antennis setaceis.

Habitat in sylvis.

DESCR. A tergo nullis punctis manifestis excavatus: antennae minime clavatae, sed setaceae. pedes pallidi.

669. CIMEX oblongus totus albo fuscoque nebulosus
Habitat in nemoribus, præsertim in truncis *Populi tremulae* 819.

DESCR. Oblongus magis quam reliqui. Caput, thorax, elytra, alæ, femora, antennæ fusco & albido mixto nebulosa sive irrotata sunt. Antennæ longitudine corporis, setaceæ. Pedes longi albo nigroque nebulosi. Alæ depresso, non vero compressæ.

670. CIMEX oblongus supra rubiginosus, elytrorum striis sanguineis, alis pone albo fuscoque variis.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo media. corpus oblongum. Caput & Thorax supra rufa. Alæ pallide rufescentes striis seu venis longitudinalibus sanguineis; pone crucem alæ fusco albis maculis. Antennæ setaceæ longitudine fere corporis. scutellum non cordatum.

671. CIMEX oblongus niger; pedibus rufis, alis elytrisque albo fuscoque variis.

Habitat in sylvis.

DESCR. Caput, thorax & abdomen nigra, pedes rubicundi seu incarnati. Antennæ superne minime attenuatae, nigrae, inferne rufescentes. Elytra quasi deusta seu versus basin alba, versus apicem fusca, in medio macula obscura fusca. Alæ fusco & albo variegatae. Sequenti longe minor, alias colore quodammodo similis.

672. CIMEX elytris maculato-fulvis, pedibus rufis: femoribus anticis crassioribus dentatis.

Act. upsi. 1736. p. 36. n. 10. Cimex oblongiusculus, alis flavo fulvoque variis.

Habitat in Abietibus.

DESCR. Antennæ filiformes, nigrae, articulis 4: infimo brevissimo. Caput nigrum, acuminatum. thorax niger, pone rufus, nigredine triplici dente separata. Scutum nigrum. Elytra pallida, latetibus fulvis; versus crucem nigricante inacula oblonga. Pedes omnes rufi. femora antica crassissima deorsum dentata. abdomen ferrugineum.

673. CIMEX oblongus niger; elytris albo maculatis.

Act. upf. 1736. p. 36. n. 13. Cimex oblongiusculus
fuscus, alis nigricantibus puncto albo.

Habitat in sylvis.

DESCR. *Totus niger. pedes pallidi. puncta majora & minora sparsa su-
pra elytra, quorum posteriora majora, ut obiter intuenti duo tantum
conficiantur alba puncta.*

674. CIMEX oblongus ater, elytris griseo-fuscis :
macula rhombea nigra.

Act. upf. 1736. p. 36. n. 11. Cimex oblongiusculus
ater, alis fuscis macula rhomboidali nigra.

Habitat in *Pini* frequens.

DESCR. *Totus ater, uti pedes, antennæ, caput, thorax, scutellum,
abdomen, alæ. Elytra griseo-fusca, in quorum medio juxta centrum
crucis macula rhombea figura atra, in singulo elytro singula.*

675. CIMEX oblongus niger; pedibus antennisque flavis.

Habitat in *Corylo* præsertim, cursitans per folia.

DESCR. *Corpus, caput, thorax, scutellum, abdomen, elytra, alæ nigra,
immaculata; sed alæ parum nitent ad cœruleum in quibusdam.
At artus pallide flavi uti rostrum. Antennæ, pedes, antennæ setaceæ
sunt.*

676. CIMEX oblongus niger; elytris lineolis minutissimis sulcatis: alis pone flavo maculatis. *It. æl.*

121.

Raj. inf. p. 57. n. 2. Cimex brevis & fere rotundus
nigricans.

Habitat ad ripas & littora maris, lacuum & fluviorum.

DESCR. *Ab omnibus mihi notis differt, quod saliat fere ut Cicada,
licet non tam alte. Totus ater est, maculis obscure flavis in alis supra-
caudam & nigris rugis in ipsis alis. Antennæ filiformes, 4 articulis.
Fœtet.*

677. CIMEX oblongus ater, antennis seta terminatis.

Habitat in pratis.

DESCR. *Diffrerit a praecedenti seu riparia, quod major & immaculata,
quod in secco vivat nec salter, quod antennæ clavatae terminantur seta te-
nuissima exalbida.*

678. CIMEX oblongus niger, elytris cinereis: antice
nigris, alis pone albis. *It. æl. 121.*

Habitat in Arena.

DESCR. *Totum corpus nigrum. Elytrorum crux antice nigra, pone alba,
lateribus cinerea punctis minutissimis nigris.*

679.

679. CIMEX oblongus exalbidus: lateribus albis.

Act. upsi. 1736. p. 35. n. 9. Cimex oblongus albus.

Habitat in pascuis;

DESCR. Maxime oblongus est; *tarsus* exalbidus seu virescenti exalbidus, uti antennæ, elytra, thorax, caput, alæ, pedes. *Elytra* striata sunt & ad latéra albidiiora. *Antennæ* setaceæ, articulis tribus. *Variet* hic Cimex linea nigricante pone oculos utrinque per thoracem ducta & absque hac.

680. CIMEX oblongus niger, elytris luteo fuscoque variis, pedibus rubris. *De Geer.*

Habitat in foliis *Ulm*i. 219.

DESCR. Facies præcedentis; *antennarum* extimus articulus basi albus.

681. CIMEX oblongus pallido-fuscus, antennis nigris, linea dorsali thoracis alba.

Act. upsi. 1736. p. 35. n. 8. Cimex oblongus, alis cincereis margine albis, scapulis nigris linea alba.

Habitat Ruri.

DESCR. *Antennæ* setaceæ, nigrae. *Caput* nigruin; ante oculos lineola nigra, & alia in medio frontis alba. *thorax* a tergo niger, ad latera albidus; linea dorsalis longitudinalis alba; *scutellum* nigrum; linea longitudinalis alba. *Elytra* quasi deusta vel subfuscata marginè exteriori albida; longiora dein in hac specie sunt *elytra*, quam in reliquis.

682. CIMEX oblongus nigricans, elytris albis, antennis lividis: infimo articulo nigro.

Habitat in plantis.

DESCR. Abdomen & corpus totum nigruin. *Thorax* utrinque albidus, & præterea tribus lineis albis longitudinalibus; *Antennæ* livideæ, 4 articulis setaceæ, infimo articulo nigro. *Rostrum* albidum. *Pedes* lividi. *Alæ* inferiores albo cæruleo nitideæ, superiores fusceæ margine coleoptriiformi albo.

683. CIMEX linearis, pedibus quatuor, antennisque longissimis albo fuscoque variis.

Frisch. germ. 7. p. 11. t. 6. Cimex arborum oblongus alarum signatura alba.

Habitat in arboribus Scaniae. *D. Lecb.*

DESCR. Magnitudo culicis vulgaris. Alæ, pedes, antennæ albo & fuscæ confertim variegata; *Antennæ* corpore longiores, setaceæ, pedes primores multoties breviores reliquis.

684. CIMEX linearis: supra nigra; pedibus anticis brevissimis. *It. gotl. 182.*

Bradl. natur. t. 26. f. 2. D.

Baub. ballon. p. 213. f. 1. Insectum *Tipula dictum*.

Lift. mut. t. 5. f. 4.

Raj. inf. p. 57. n. 1. *Cimex aquaticus figuræ longioris.*

Smolandis Braxen - Mygg.

Habitat in *Aquis quietis*, cursitans supra aquas;

Propolides, quæ alis carent, sæpe copula conjunctæ obseruantur.

DESCR. *Venter* totus subitus albus, ante spectatus, apparet, pone spectatus niger. *Elytra* & alæ superiores atræ; inferiores albae abs conditæ.

685. CIMEX linearis nigricans compressus, pedibus anticis brevissimis.

Pet. gaz. 15. t. 9. f. 12. *Tipula londinensis* angustissima.

Habitat in *Aquis*.

DESCR. Præcedenti simillima, sed multoties minor & angustior.

686. CIMEX linearis exalbidus, pedibus omnibus longissimis, femoribus clavatis.

Act. upf. 1736. p. 36. n. 15. *Cimex linearis teretiusculus* albus, genubus crassis.

Frisch. germ. 7. p. 28. t. 20. *Cimex arboreus culiciformis.*

Habitat præsertim in *Smolandia* ad *Stenbrohult*.

DESCR. Corpore linearis a plerisque differt: *pedes* setacei, corpore longiores: *femora* versus genua clavata.

687. CIMEX antennis clavatis, elytris thoracisque marginè reticulato punctatis.

Habitat in *Uplandia*. *De Geer.* in *Scania*. *D. Leche.*

DESCR. Magnitudo pulicis, fuscus, ovatus: *Alæ* & margo thoracis punctis diaphanis reticulatis, vasis fuscis, cum maculis sparsis nigricantibus: *margo elytrorum* punctis quasi dentatus.

OBS. Cum species hujus generis plurimæ alijs insectis videntur, inquidendum judico num ne ex hac gente reperiantur species, quæ, in domos introductæ, cimices lectularios eradicare queant, & quænam horum potissimum hoc præstent.

Notonecta.

688. NOTONECTA grisea; elytris griseis margine fusco punctatis.

Bradl. natur. t. 26. f. 2. E.

Hoffn.

Hoffn. inf. t. 12. f. 19.

Pet. gaz. t. 72. f. 6. Notonecta vulgaris nigro pallidoque mixta.

Frisch. germ. 6. p. 28. t. 13. Cimex aquaticus angustior.

Habitat in Lacubus; inter nostrates in hoc genere maxima.

DESCR. Caput obtusum, flavum. oculi brunnei. Thorax magnus, flavus, pellucidus. Scutellum atrum, holosericum. Elytra flava, latere nigro punctata. Alæ inferiores albæ, pellucidæ, testæ. pedes anteriores breviores; intermedii longiores; postici longissimi, natatorii. rostrum acutum, subulatum. antennæ parvæ sub capite, duplice articulo tantum constantes. venter niger subtus hirsutus est.

689. NOTONECTA elytris pallidis lineolis transversis undulatis striata.

Pet. gaz. t. 72. f. 7. Notonecta vulgaris compressa fusca.

Habitat in Aquis, præcedenti multoties minor, fœtens.

DESCR. Hæc oblonga, depressa; frons & pedes flavi. Thorax & elytra fusca lineolis transversis undulatis parallelis numerosissimis flavescenti-pallidis. Corpus subtus flavescens, oculi nigricantes.

690. NOTONECTA arenulæ magnitudine.

Att. upf. 1736. p. 37. n. 3. Notonecta cinerea vix conspicua.

Habitat in scaturiginibus & fontibus.

DESCR. Magnitudo minima arenulæ: alis & elytris, ni fallor, caruit. pedes posteriores longiores, primam par minimum; depressa est, dorso fusco velut transversè striata.

Nepa.

691. NEPA abdominis margine integro.

Mouff. lat. p. 321. Scorpio palustris.

Baub. ballon. p. 212. f. 2. Araneus aquaticus.

Hoffn. inf. t. 11. f. 2. edit alt. 3. t. 4.

Jonst. inf. t. 27. f. 1. 2. Scorpiones aquatici Mouff. t. 28. f. ad verb. stello. figura bona.

Bradl. natur. t. 26. f. 2. C.

Pet. gaz. t. 74. f. 4. Scorpio vulgaris aquaticus.

Raj. inf. 58. Scorpio palustris ad cimices referendus.

Swamm. bibl. t. 3. f. 4.
Habitat in fluviis, stagnis, paludibus, loco limoso,
præfertim in fluvio Sahla Upsaliæ.

692. NEPA abdominalis margine ferrato. *De Geer.*

Frisch. germ. 6. p. 31. t. 14. *Cimex aquaticus latior.*
Habitat in Aquis.

DESCR. Longe minor; facies Cimicis aut Notonectæ; dorsa convexa
absque aculeo caudæ. color fuscus.

Chermes.

693. CHERMES graminis.

Habitat Fablunæ in pratis.

DESCR. Magnitudo Cicadæ & ejusdem faciei, ut primo intuitu Cicada
species salutetur. Antennæ albicant apicibus nigris. Alæ quatuor non in
crucem complicatae, sed deflexæ, ut in phalæna. Abdomen nigricans in
cifuris margine albis. Pedes albi, non saltatrices. Caput obtusum, u-
na cum thorace griseum, lineolis albis pictum. Alæ aquæ, venis fuscis:
variis anastomosibus.

694. CHERMES Ulmi.

Habitat intra revoluta folia *Ulmi* 219 cum Aphidi-
bus ejusdem.

DESCR. Larva subrotunda, cinerea punctis elevatis nigris, obtecta lanu-
gine alba copiosa.

695. CHERMES Ceraftii.

Habitat in *Ceraftio* 379 monstroso folijs ventricoso in-
flexis in capitulum.

696. CHERMES Aceris.

Habitat in ramis & pedunculis *Aceris* 303 nostratis.

DESCR. Est inter hujus generis minores, vix pediculum majorem ma-
gnitudine superans. Totum a tergo e flavo virens subtus dilute virescens.
ani apice subulato, dilute viridi fuscescente. Oculi etiam dilute flavescentes.

697. CHERMES Betulæ.

Habitat in *Betula* 776, succo viridi tinctorio plenum.

DESCR. Abdomen incarnatum linea transversa lata nigra in singula in-
cifura solitaria, scilicet 5 in tergo, 3 in ventre. Peccus pallidum, ut &
caput. Antennæ setaceæ: Cauda acuta: Alæ 4 pellucide, nitidae. Succus
viridis tinctorius intra corpus.

698. CHERMES Alni.

Act. upsi. 1736. p. 36. n. 27. *Cimex cauda plumosa*
corpus tegente.

Frisch.

Frisch. germ. 8. p. 28. t. 13. Vermis fuctorius alni.
Habitat in *Alno* 775, cuius ramos vere operiunt & quasi lana vestiunt pupulæ.

DESCR. Insectum album, acuminatum. Oculi laterales, prominuli. Pedes sex, quorum duo posteriora paria propria. Cauda acuminata, bifurca, supra hanc quasi stylus prominulus. Antennæ variegatae. os apice nigro, situm in ipso ventre inter primum & secundum par pedum. Alæ quatuor alba venis fuscis. falt.

LARVA magnitudine pediculi, corpore planiusculo, viridi-maculato, centre obtuso, postice elevato, versus caudam nigro. Antennæ albæ, superne nigrae, tenues, rectæ. Elytrorum rudimenta. Cauda villis multis, reflexis, diaphanis, retroflexis, corpus tegentibus, albis. vesicula sive guttula intra lanam e cauda egressa sæpe observatur. oculi rubri. Sedent plures in ramis alni proximæ, capite deorsum spectantes, ut alterius cauda proximam ex parte tegat.

699. **CHERMES Pini.**
Habitat in ramis *Pini* 788, ipsi ramis immutatis, lanae infidens.

DESCR. Corpus fuscum, totum supra testum lana alba (non e cauda egressa), quæ quasi ex turundis crassusculis componitur: magnitudo Cimicis lectularii, pedibus sex lente repens: denudatum corpus a lana totum fuscum, facie larvæ Coccionellæ: lana infidet toto dorso, abdomen subtus & totum corpus subtus glabrum. Rostrum non inflexum est versus pectus.

700. **CHERMES Abietis.** *It. gotl.* 180.
Frisch. germ. 12. p. 10. t. 2. f. 3. Insectum tuberculi muricati arboris *Taxi*.

Flor. lapp. p. 218. n. 347. E.

Clus. pannon. p. 20. 21. *Picea pumila*.

Hoffman. fl. altd. 1. *Picea pumila*.

Habitat in *Abietis* 789 turionibus, quæ fiunt in summitatibus ramorum monstrose imbricatis, dilatatis ad basin foliolis, longitudine brevioribus etiam factis, apud nos in Abiete frequens, similis frago viridi.

DESCR. Corpus Abietis in ipsis ramorum extremitatibus fragiforme, habet extus supra se. & inter squamas foliaceas imbricatas, in finu squamarum, plurima animalcula parva, e quorum uno quasi lana prominet. Juxta basin hujus corpuseculi s. fragi observatur lana major in copia, in qua mater minorum, quæ cauflat fragum. Mutatur in volatile: alis 4, aqueis; corpore pallide flavescente; oculis fuscis, & minimo puncto nigricante inter oculos. Antennæ setaceæ. Alas gerit uti Cherimes Alni. os obtusum, inflexum, uti Grylli,

701. **CHERMES Salicis.**
Habitat in *Salice varia*.

DESCR. Hæc alba est. *Abdomen supra maculis obsoletis. Thorax linea transversa nigra. antennæ infra medium albæ, extra medium nigra.*

702. CHERMES Urticæ.

Reaum. inf. 3. t. 29. f. 20. 22. 13.

Habitat in *Urtica majore* 774.

DESCR. Hæc fusca, lateribus pedibusque albidis. *cauda reflexa. antennæ nigrae versus basim albæ. oculi flavescentes.*

LARVA, monstrosa, facies pediculi, depresso, ventre ciliato.

703. CHERMES Fraxini. De Geer.

Habitat in *Fraxino* 830.

DESCR. *Alis thorace nigro maculatis.*

Aphis.

704. APHIS Ribis.

Leuvenh. arcan. epist. 90. p. 545. t. 548. f. 1. 2. 3.

Aelbescen - luyzen.

Jung. verm. p. 163. 164. Ventriones ribiani s. Mel-lomyjæ.

Blank. belg. p. 164. t. 14. f. D. E. Pediculus ribis viridis.

Frisch. germ. II. p. 9. t. 14. Pediculus arboreus fu-sco - viridis in Ribe.

Reaum. gall. 3. t. 22. f. 7. 8. 9. 10.

Habitat sub foliis *Ribes* 197, quæ inde puculas rubi-cundas obtinent;

DESCR. Magnitudo pediculi. *Corpus incumbens. pedum viridium genicula dorso altiora, fusca. antennæ corpore longiores, tenues, rectæ, juxta caput geniculo reflexæ, nigrae. Corpus fusco - virens, pectus a tergo nigrans. Lineæ tres transversæ supra clunes, fere conjugiae: latera abdo-minis nigris punctis. Alæ quatuor, erectæ, compressæ, albæ, venis nigris, quarum duas minime. Podex prominet: appendices setaceæ, alijs breviores.*

705. APHIS Ulmi. De Geer.

Reaum. gall. 3. t. 25. f. 4. 5. 6. 7.

Habitat in foliis *Ulmi* 219 vesiculos & foliorum con-volutiones cauſans.

DESCR. Minores subvirescentes; Majores corpore cylindrico ferrugineo alba lanugine adsperso, ab domine 6 l. 7 articulis: *Appendiculis obsoletis ex anno vesicula.*

706. APHIS Pastinacæ.

Habitat in *Pastinaca*.

DESCR.

DESCR. Corpus viride. Caput; antennæ, gibbus thoracis, pedum extremitates nigra, alæ alba; appendiculi ad latera ventris mobiles.

707. APHIS Sambuci.

Frisch. germ. II. p. 14. t. 18.

Reaum. gall. 3. t. 21. f. 5-15.

List. loqu. p. 397. n. 40. *Cimex exiguus cæsius*, cui alæ ex toto membranaceæ prægrandes.

Habitat in *Sambuci* 250 petiolis.

708. APHIS Ruminis.

Habitat in *Ruminibus* 293. 295.

DESCR. Corpus nigro-æneum. Antennæ nigrae vel albæ apicibus nigris. pedes albidi geniculis nigris. Cauda acuminato-cornuta. Alarum basis virescens; appendiculi atri, filiformes, longitudine caudæ.

709. APHIS Aceris.

Habitat sub foliis *Aceris* 303.

DESCR. Corpus latius. Cornua postica (s. appendiculi) vix illa, eaque obtusissima. dorsum abdominis supra verrucis adpersum, pone testum macula fusca cordata, antice bisida. Caput & thorax in medio nigra. antenæ apice sericeæ.

710. APHIS Rosæ.

Habitat in ramis *Rosarum* 406. 407.

DESCR. Cornua longitudine fere abdominis, nigra. Corpus viride vel incarnatum. antennæ nigrae longitudine abdominis. genicula pedum viridi-nigra.

711. APHIS plantarum aquaticarum. *De Geer.*

Habitat in *Nymphæis* 426. 427. & *Potamogetone* 139 mense Augusto.

712. APHIS Tiliæ.

Frisch. germ. II. p. 13. t. 17. *Pediculus arboreus* in *Tilia*.

Habitat in *Tilia* 432.

DESCR. Corpus oblongum. Ordines quatuor longitudinales punctorum atrorum a tergo abdominis, thoracis linea lateralis utrinque nigra. Alæ adscendentæ, compressæ; majores inferiori margine nigrae, superiore margine maculatae seu exteriore margine linea nigra superne septem maculis nigris. antennæ & pedes alternatum albo nigroque variegati.

713. APHIS Serratulæ.

It. œl. jun. 12. *de Geer.* 12. *Wahlberg.* 12. *Wahlberg.*

Habitat in *Serratula* 660.

DESCR. Corpus fuscum: punctorum elevatorum ordinibus sex in dorso. Ailarum rudimenta, appendiculi, pedes, antennæ nigra. femora versus basi alba.

714. APHIS Cardui.

Habitat in *Cardui* 655 & *Serratulæ* 662 caulibus.

DESCR. Tota æneo-nigra nitida, sed pedibus antennisque nigris basi albidis, appendiculis abdominis attra.

715. APHIS Artemisiæ.

Habitat in *Absinthiis* variis.

DESCR. Artus, pedes, appendiculi, antennæ nigra. Corpus nigrum, tergo cinereo, cum in medio tergi supra abdomen macula magna fusca. Latera abdominis etiam parum fusca. cauda acuminé acuta. Appendiculi erecti.

716. APHIS Centaureæ.

Habitat in caulibus *Jaceæ vulgaris* 709.

DESCR. Tota nigra est absque ulla albedine; foliæ albae; posteriora abdominis magis fusca ad rubedinem inclinantia: margo crassior alarum lineola lata alba exaratus.

717. APHIS Betulæ.

Habitat in *Betula* 776 rarius.

DESCR. Corpus pallide virens: puncta 4 nigricantia in margine singulæ incisuræ utrinque. minima est: caret alis & appendiculis.

718. APHIS Pini.

Habitat in *Pinu* 788 nostraræ.

OBS. Appendiculi brevissimi.

719. APHIS Cucubali.

Habitat in *Cucubalo* dioico 361 frequens.

DESCR. Tota atra, polita, nitida, margine abdomen cingente plicate; abdome pone obtuso. antennæ & pedes pallidiores.

Coccus.

720. COCCUS radicum purpureus.

Cornar. *dioscor.* l. 4. c. 39. *Granum zschinbitz.*

Scalig. *exerc.* 325. n. 13.

Camer. *epit.* 691. *Polygonum cocciferum.*

Baub. *pin.* 281. *Polygonum cocciferum.*

Baub. *hist.* 3. p. 378. *Polygonum polonicum cocciferum.*

Chabr. *sciagr.* 454. *Polygonum polonicum cocciferum.*

Paulli. *quadrip.* 113. *Ova insecti incogniti.*

Raj.

Raj. bist. 186. *Polygonum Polonicum cocciferum*.

Tylkoffsch. phys. 3. f. 10.

Rzaczynsch. polon. 95.

Berniz. misc. N. C. dec. 1. *ann.* 1. *obj.* 8.

Rupp. jen. 86. *Knawel folio & flore albicante.*

Dal. pharm. 84. *Polygonum cocciferum.*

Breyn. comm. physico-technic. 1731. p. 413.

act. lips. 1731. p. 406.

act. angl. 421.

act. physico-med. N. C. vol. 3. *app.* 5. *t.* 1. **Coccus tinctorius radicum.**

prodr. 3. *app.* 1.

Frisch. germ. 5. p. 6. *t.* 2. *Cochinella germanica.*

Reaum. gall. 4. *mem.* 2. p. 1. n. 143. *Progall. infestum grani scarlatini Polonici.*

Habitat apud nos rarius (uti multi me certiores fecere) circa tempus Johannis, ipse tamen non dum reperi; provenit in **SCLERANTHO calycibus fructus clausis** 349. Plerumque in *Potentilla* foliis digitatis, caule erecto fruticoso. *Gerber.* in *Pimpinella saxifraga* majori altera. *C. B. Scaliger.* in *Hieracio* foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro 633. *S. Pauli.*

721. COCCUS Phalaridis.

Habitat ad radices *Phalaridis sativæ* in terra prægnante, & quidem copiose, ubi Formicæ rubræ sedulo terram fodunt & accedunt.

DESCR. Animal magnitudine seminis *Cannabis*, exalbidum, solis *pedibus* parum incarnatis. *Antennæ* vix corporis $\frac{1}{4}$ partem adtingunt. *Rostrum* inflexum. *Anns* retusa, vix villosa. *volatile* non vidi, proin utrum *Coccus*, *Aphis* aut *Chermes* sit, hæreo.

722. COCCUS Hesperidum.

Hire act. gall. 1692. p. 14. t. 14.

Frisch. germ. 12. p. 12.

Reaum. gall. 4. t. 1. f. omnes.

Act. ups. 1736. p. 37. n. 9. *Pediculus clypeatus.*

Habitat in *Citro* præsertim, in *Caldariis* sive *Hyber-*

bernaculis vulgarissimus, caules ramosque deturpans lepræ instar.

DESCR. *Larva ovalis, depresso, cymbiformis, patellæ instar: postice emarginata, pro lubitū pedes exserens & retrahens.*

723. COCCUS Betulae. *De Geer.*

Habitat in *Betula* 776 vulgari, inque ramorum diversicationibus solitarius.

724. COCCUS Insectorum Coleoptratorum.

Frisch. germ. 4. p. 19, t. 9. Pediculus Scarabæorum canali adfixus.

Habitat in insectis variis Coleoptratis.

DESCR. *Corpus ovale, margine acuto, parum convexum, rufescens. Cum partes accurate discernere non licuerit, ex facie hoc retuli; inquirant vero alii accuratus in genus, an hujus? an Acari? an Pediculi species? sera quasi semper adfixum est hoc insectum corpori majoris infecti, sape in copia. an ovum?*

725. COCCUS aquaticus. *It. goit. 181.*

Habitat in fossis & paludibus super Stratiote, Hydrochari, aliisque plantis aquaticis.

DESCR. *Corpus ovale, subitus planum, supra convexum, fuscum, altera extremitate barbam gelatinosam bifidam albam exserens; prope hanc extremitatem in superiore superficie preminet tuberculum obtusum, alteram versus extremitatem aliud tuberculum acutius. Corpus subdiaphanum, vel 8 infarctum corpusculis subrotundis; tandem perforatur superior superficies poris tortidem alternis, per quos excunt nati. Adfixus sedet foliis, nec inde repit, an hoc insectum quoddam, vel an ovarium alicuius infecti aquatice, certo determinare nequo; inquirant alii, nec, si erraverim, mihi vitio vertant.*

Thrips.

726. THRIIPS elytris glaucis, corpore atro.

De Geer. act. stockb. 1744. p. 3. t. 4. f. 4. Physapus ater; alis albis.

Habitat in floribus, praesertim luteis compositis, uti in Leontodonte, Chrysanthemo, Chamomilla, Buphtalmo etc. autumno frequentissima.

DESCR. *Est minimum insectum, utpote pediculo longe minus, haesitavi diu cuius Generis esset, cum nudis oculis vix nisi duas alas, ut in Tipula sive Culice distinguere posui; ex observatis autem Nobiliss. Domini De Geer patuit alas esse quatuor, superiores paulo crassiores; sed pedum situs, scilicet duo ad collum, reliqui ad thoracem, docuit adfinitatem cum Coleoptris. Corpus lineare, atrum est. antennæ rectæ, filiformes, atrae, breves, sex articulatis. Alæ angustissimæ, rectæ, elytris angustis-*

guttiſſimis, albido griseis, tenuiſſimis, flexib⁹, longitudine fere abdo-
minis, marginē, præsertim apice, hirsutis, basi aurem pallidioribus:
hæ alæ rectæ elytris efficiunt in tergo lineam angustissimam, nudis
urinque relictis abdominis lateribus nigris. Currit celerime; saltat;
variis modis abdomen flebit & vibrat, non facile volitat. Larva coc-
cinea, capite pedibus antennisque nigricantibus, in floribus Chamomilli
frequentissima inter flosculos incedens ac si perfectione esset animal-
culum.

727. THRIIPS elytris albis nigrisque fasciis, corpore atro.

Habitat in floribus, uti præcedens, sed rarior avis.
DESCR. Omnia, ut in præcedenti, sed fasciæ transversæ albæ & nigrae
alas distinguunt; Animal totum atrium, præcedenti majus, elytra nigrae
fasciæ tres niveæ fecant, quarum una in apice, altera in medio,
tertia versus basin elytrorum.

Character Generis: Corpus elongatum, angustum. Clypeus rhofaci duplex.
Alæ quatuor, abdome angustiores. Pedes vesica instructi. *Carol. De Geer.*

728. THRIIPS elytris niveis, corpore fusco.

De Geer act. stockh. 1744. p. 6. t. 1. f. 2. *Physapus*
fuscus, alis albicantibus.

Habitat in Junipero. *De Geer.*

III. NEUROPTERA.

Panorpa.

729. PANORPA.

Aldr. inf. t. 386. f. 8. 9. & 387. f. 5. 6.

Mouff. lat. p. 62. f. 3. 4. Musca scorpiuros I. & IV.

Hoffn. inf. t. 2. f. 14.

Merr. pin. p. 200. Musca scorpiura.

Frisch. germ. 9. p. 29. t. 14. f. 1. Scorpio-musca.

Reaum. gall. n. 4. t. 8. f. 9.

Habitat in pratis.

DESCR. *Rostrum* in proboscideum duram, corneam, prominens deorsum.
Antennæ 30 articulis, setaceæ, nigrae: *Corpus* fuscum: latera corporis fla-
va. *Cauda* articulata. *Chela* scorpionis instar, rufescente, bifida. *Alæ* albæ
maculis fasciatæ, venis reticulatis. Variat cum chela caudæ & abs-
que ea, quod forte sexus differentia.

Raphidia.

730. RAPHIDIA.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 1. Raphidia aculeo recurvo.

Habitat in pratis.

DESCR.

DESCR. Magnitudo & facies proxime ad Panorpam aequedit. *Caput* nigrum, cornutum, pone angustum, supra depresso, leve. *Thorax* angustus, cylindraceus, niger. *Antennae* setaceæ, albidae, innominis articulis. *Abdomen* oblongum, fuscum, lineis transversis albis. *Alæ* diaphanae, venis reticulatae, ut in Libellulis, etiam ad marginem exterioram punctum oblongum fuscum in quibusdam, ut in Libellulis. Ab ano exseritur *mucro* setaceus, niger, arcuatus, longitudine dimidi abdominis. Variat aculeo armata & eodem distituta, adeoque forte sexu.

Hemerobius.

731. **HEMEROBIUS** luteo-viridis; alis aqueis: vasis viridibus.

Mouff. lat. p. 62. f. ult. *Musca Chrysopes*.

angl. p. 937.

Grew. *mus.* p. 156.

Gæd. belg. 2. p. 40. t. 14. *Audax*, *intrepidus*.

Lift. gæd. p. 229. f. 104. *Tolmerus*.

Mer. europ. 3. p. 49. t. 8. f. *in fructu*
gallice. t. 175. 109.

Alb. inf. t. 64.

Pet. *mus.* p. 4. n. 6. *Perla minima* merdam olenis.

Raj. inf. p. 274. *Musca quadripennis*, corpore luteo-viridi, alis per amplis e flavo pariter virentibus.

Reaum. gall. 3. t. 33. f. 2. 5. 6. *Leo aphidis*.

Mus. petr. 1. p. 717. *Musca Chrysopis viridis*.

Habitat in Hortis frequens.

DESCR. Alæ magnæ, reticulatae: venis viridibus, pellucidæ, ac si alæ solo reticulo constarent. *Corpus* etiam viride, tactus foeret sternore humano. *Ova* petiolo longo insident. *Larva* viicitat aphidibus.

732. **HEMEROBIUS** viridi nigroque varius; alis aqueo reticulatis. *De Geer*.

Reaum. gall. 3. t. 3. f. 14. 15.

Frisch. germ. 4. p. 40. t. 23. *Musca foetida* auro oculata.

Habitat in arboribus.

733. **HEMEROBIUS** Formicaleonis.

Reaum. gall. 4. t. 14. f. 18. 19. *Formica-leo*.
t. 11. f. 8.

6. t. 32. 33. 34. f. 7. *Formicaleo*.

It. el. 149. 206. *Formicaleo*.

Oelan.

Oelandis Sandpiller.

Habitat in *Arena sicca*, præsertim in Oelandia.

DESCR. *Larva* magnitudine Aranæ cinereæ, *Abdomen* magnum ovatum, papillis hispidis, 5 ordinum, longitudinaliter notatum. *Thorax* angustus. *Oe* forcipe longa ad apicem connivente; singula maxilla tribus dentibus, præter apices, armata, utrinque pilosa. *Pedes* albantes, quibus retrograde incedit instar cancri, & abdomine cavitates & arenam fedit, in qua latebit.

734. **HEMEROBIUS** alis albis: maculis fuscis sparsis, antennis fusco alboque annulatis.

Habitat in *Lupuletis* passim.

DESCR. *Corpus* albidum, magnitudine formicæ. *Alæ* magnæ, albæ, venoso-reticulatae, maculis parvis, obsoletis fere instar punctorum, tenui sparsis. *Antennæ* setaceæ lineolis albis fuscisque monilis instar variegatae. *Pedes* albidi, oculi cœruleo-anei. supra abdomen utrinque ordo macularum fuscum.

735. **HEMEROBIUS** alis albis: maculis fuscis: pone punctis sex distinctis, antennis fuscis.

Habitat in Scania campestris. *D. Leche.*

DESCR. Præcedenti simillimus, sed quadruplo minor. *Alæ* albæ, reticulatae & fusco maculatae, ut in illo, sed pone in singulis alis observantur puncta sex, scilicet singula intra singulam reticulam. *Antennæ* non albo & nigro variegatae ut in illo.

736. **HEMEROBIUS** niger, thorace abdomineque flavo.

Habitat *Upsaliæ* minus frequens.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Antennæ* nigrae, setaceaæ, longitudine corporis. *Caput* nigrum. *Collum* angustius, flavum. *Thorax* nigricans. *Abdomen* ovatum, teres, oculo incisuris profundis cinctum, flavum. *Pedes* nigricantes. *Alæ* aqueæ venis obscuris ramosis. *Facies* Aphidis.

Phryganea.

737. **PHRYGANEA** nigra; alis albidis striatis albo maculatis.

Att. upf. 1736. p. 27. n. 4. Hemerobius alis albis, corpore atro, antennis brevissimis.

Hoffn. inf. 2. t. 12. juxta phalangia. edit. altera t. 2. f. 13.

Habitat præsertim *Upsaliæ* in plateis lutosis.

DESCR. Magnitudo Panorpæ. *Alæ* corpore longiores, lanceolatae, obtusifusculæ, albæ, venis fuscis striatae; venis his vix reticulato-connexis, nisi solum in alis exterioribus duabus aut tribus margini interiori propteribus; duo exteriores nervi seu extimus vix uno in loco connectitur;

at alæ omnes quatuor, ad marginem exteriorem, versus apicem, linea fuscæ inter duo exteriora vasa notantur. Corpus & pedes nigra. Abdomen subitus atrum; juxta anum duæ appendices brevissimæ. Antennæ nigrae, setiformes, longitudine corporis. Thorax planiusculus, medio convexus.

738. PHRYGANEÆ alis testaceis nervoso striatis, antennis antrorsum porrectis.

Act. upf. 1736. p. 27. n. 2. Hemerobius alis testaceis venoso striatis, antennis longitudine alarum.

Aldr. ins. p. 763. Perlarum forte species.

Habitat in viis lutoſis.

DESCR. Facies phalænæ majoris. Antennæ antrorsum porrectæ, longitudine corporis. Alæ magnæ, latæ, subtestacea sive fuscotestacea, venis aliquantulum ramosis striatae, minime autem ulla in puncto reticulatae. Corpus fuscum.

739. PHRYGANEÆ grisea; alis superioribus nebulosis: macula marginali nigra.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Media magnitudinis est. Alæ incubentes, pone compressæ superiores (uti totum corpus) griseæ, fuscæ obsolete nebulosæ; in quorum medio juxta marginem inferiorem seu crassiorem nigra macula.

740. PHRYGANEÆ alis cinereo-testaceis: lineolis duabus longitudinalibus nigris albo puncto.

Habitat in Scania. *D. Leche.*

DESCR. Alæ testaceo-cinerascentes, lineis in superioribus alis duabus longitudinalibus, eademque serie dispositis, & singulis albo puncto notatis. Antennæ longæ, antrorsum porrectæ. Hæc inter nostrates maxima.

741. PHRYGANEÆ alis deflexo-compressis flavescentibus: macula rhombea laterali alba.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Alæ magnæ, pellucidæ (quas gerit uti Phalænæ nasuta) deflexo-compressæ, subluteæ sive griseæ; in medio alæ exterioris macula rhombea albida obliqua & pone hanc alia albida vix notabilis. Corpus testaceum, uti antennæ & pedes, supra & pone maculam alarem aliquid fuscæ. Est hæc inter majusculas sui generis.

742. PHRYGANEÆ alis fuscis; macula duplii laterali flavo.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Inter minores, non autem minimas, haberi potest. Alæ fuscae in medio alarum macula duplex lunularis flava, altera pone alteram. Animal antrorsum angustatum.

743. PHRYGANEA alis reticulatis; cauda inermi,
thoracis marginibus flavis.

Habitat ad Aquas, ubi sedet tranquilla.

DESCR. Sedet alis deflexis uti Phalena; vel potius Papilio à Queræ folio dicta. Alæ subcinereæ; reticulatae: venis fuscis maxime reticulatis; præsertim ad marginem exteriorem, qui admodum dilatatus. *Corpus* totum nigricans. *Antennæ* corpore dimidio breviores. *Cauda* simplex, absque stylis prominulis. Os dubbus denticulis & quatuor antennulis. *Collare* antice & postice, non ad latera, flavescens.

744. PHRYGANEA alis venoso - reticulatis, cauda bifida.

Act. upf. 1736. p. 27. n. i. Hemerobius cauda bipinnata, alis cinereis venoso - reticulatis.

Wagn. helv. p. 227. 228. 229. Musca aquatilis æstiva major.

Habitat ad Aquas, præsertim in Lapponia Umensi.

DESCR. Variat admodum magnitudine. Alæ oblongæ incumbentes, non deflexæ, antrorsum angustatae, albæ; venis fuscis admodum reticulatae. Cauda duabus fetis antenniformibus; & antennarum longitudo gaudet.

745. PHRYGANEA alis cæruleo - atris, antennis corpore duplo longioribus.

Raj. inf. p. 275. Musca parva quadripennis, antennis omnium, quas unquam vidi, pro corporis magnitudine longissimis.

Act. upf. 1736. p. 27. Hemerobius alis cæruleo - nigris, antennis corpore longioribus.

Habitat ad Aquas inter arundines & scirpos. Vespertino tempore nebularum instar saltans in ære.

DESCR. Alæ nigrae seu atræ cum cærulei vel virecentis mixtura, margine dorsali in medio villosæ. Antennæ corpore duplo vel triplo longiores, nigrae. Pedes cinereo-nigri. Magnitudo musæ domesticae quo ad alas.

746. PHRYGANEA alis superioribus nebulosis; antennis corpore triplo longioribus.

Habitat ad Dægeroeam. in litoribus Lomarensibus Roslagiæ.

DESCR. Magnitudo majoris culicis. Alæ superiores pallido-griseæ maculis fuscis; inferiores canæ margine pilosæ. Antennæ albide corpore triplo aut quadruplo longiores.

747. PHRYGANEÀ saltatrix, antennis longitudine corporis, macula viridi albaque alarum.

Habitat in Prædio Fulleroen.

DESCR. Minima est & saltatrix. *Corpus* Culice minus, fuscum. *Antennæ* corpore longiores, lente inspestante villosæ apparent. *Os* ut in reliquis cum antennulis. (adeoque non Chermes; accedit enim figura ad Chermem alis). *Alæ* corpore longiores, versus corpus pone compressæ, aquæ, macula subviridi & alba, versus marginem inferiorem venis nigris, versus superiorem venis albis.

748. PHRYGANEÀ nigra; alis incumbentibus subcinerreo-nebulosis, caudæ fetis truncatis.

Habitat ubique frequens primo vere.

DESCR. Insectum oblongum, angustum, subcylindraceum, alis suis vestitum. *Antennæ* setacea, longitudine corporis, non vero alatum. *thorax* minus latus & marginatus. *Cauda* terminatur duabus fetis truncatis, brevissimis. *Corpus* totum atrum, exceptis solis alis. *Alæ* incumbentibus in figuram semicylindricam, subcinereæ, maculis seu fasciis albidis, hinc inde interlucentibus, vix tamen visu manifestis: suprema ala nervis tribus, versus marginem tenuiorem extensis, valde reticulata est; reliqui nervi non ita reticulati sunt. macula nulla in clypeo thoracis, sed duo velut ulcera coalita.

749. PHRYGANEÀ fusca immaculata.

Habitat Fahlunæ ad Stæmshægam.

DESCR. Parva, oblonga, cylindrica, tota fusca, alis venosis minime maculatis, corpore longioribus nitidiusculis. *Cauda* absque fetis. *Antennæ* corpore paulo breviores. *Abdomen* subitus atrum, supra pallidum, lateribus utrinque maculis septem nigris.

Ephemera.

750. EPHEMERA alis nebuloso-maculatis, cauda trifeta.

Habitat ad Lacus.

DESCR. Differt manifeste a reliquis. *Alis* venis reticulatis valde fuscis & maculis alarum nebulosis, fuscis, inæqualibus. Nulla enim alia inter nostrates alis maculatis gaudet. *setæ* etiam caudæ fuscae.

751. EPHEMERA alis albis reticulatis, cauda bifeta.

Act. upf. 1736. p. 27. n. 2. Ephemera alis incarnato-albis.

Blank. belg. t. 12. f. F.

Habitat juxta aquas æstate: Larva vero sub aqua.

DESCR. *Caput* minimum. *Tubercula* duo lenticiformia, elevata, lutea, oculis multo majora, pellucida, oculis incumbentia; *Thorax* compressus, supra nebulosus. *Abdomen* cylindraceum, albœ diaphanum, ultimus articulatus.

ticulis subfuscis. *Canda* duabus fetis rectis, corpore ipso duplo longioribus, albis; intra has dueæ setæ brevissimæ, incurvæ. *Pedes* nivei, quorum anteriorès longiores. *Alæ* erectæ, albæ, opalo - incarnato parum nitentes; reticulatæ.

752. EPHEMERA alis albis striatis.

Habitat ad aquas.

DESCR. Præcedente minor; *Alæ* similes, sed vasis minime reticulatis. *Canda* fetis longis caret: capitis tubera oculis minora sunt in hac specie. *Mas* corpore pellucido, thorace nigricante. *Femina* corpore opaco subrufescente. In congressu coherent perfecte uti Libellulæ.

753. EPHEMERA fusca, cauda bifeta, alis albis.

Habitat ad aquas.

DESCR. Culice paulo major; thorax nigricans; *Abdomen* fuscum; setæ caudæ longitudine corporis. *Tubercula* 2 suprà oculos; erasta, magna, livida.

754. EPHEMERA alis albis: margine crassiore nigricantibus, cauda bifeta.

Act. upf. t. 1736. p. 27. n. 3. Ephemeræ alis albis minima.

Swam. quart. p. 87. Ephemeræ minima.

Habitat ad lacus.

DESCR. *Alæ* albæ marginè crassiore fuso-nigricante. *Canda* duabus fetis artiata, absque ulla parvis interjectis. *Pedes* albi, exceptis primis majoribus magis fuscis. supra oculos *Tubera* duo oculis majora, fuscopurpurea. *Abdomen* cinerascens, segmentorum marginibus albis. Habet quasi sex oculos: tubera scilicet duo majora descripta; oculos duos compositos ad horum tuberum latera; oculos duos alios minimos ante tubera posita.

Circa vesperam evolant ex aquis, secum ferentes tunicam pupillæ, quam deponunt, ubi primo quiescunt, albam; sic ferentes & navigantium vestes tunicis his adspergunt; vivunt tantum per noctem, moriuntur infra-quent hora matutina omnes; magnitudo muscae domesticæ minoris.

755. EPHEMERA nigra; alis inferioribus albis. *It. atl. 21.*

Habitat copiose in Smolandia ad fluvium Sätthaella.

DESCR. Est inter minores generis sui, toto corpore & alis superioribus nigra; sole alæ inferiores albæ, quibus ab omnibus generis sui speciebus manifeste differt.

Libellula.

* *Alis erectis sedentes, Mediæ.*

756. LIBELLULA corpore sericeo nitido; alis luteo fuscis: margine immaculatis.

Raj. inf. p. 50. n. 11. Libella media, corpore è viridi cœrulecente, alis fulvescentibus absque maculis.

Habitat ad aquas fluentes.

DESCR. *Corpus* mediæ magnitudinis, e cœruleo nitens, sive atratum. *Alæ* luteo-fuscæ absque ullo puncto obscuræ ad marginem exteriorem alarum, uti in omnibus reliquis, exceptis speciebus 757 & 758, quæ itaque an vere specie different, hæsito; forte solæ varietates.

757. LIBELLULA corpore cœruleo nitido; alis viridi-cœrulecentibus: apice fuscis: margine immaculatis.

Raj. inf. p. 50. n. 10. Libella media, corpore cœruleo, alis fere totis ex cœruleo nigricantibus.

Vulgo Lovisa.

Habitat ad Fluvios.

DESCR. Magnitudo, figura, color, locus & omnia, ut in præcedenti, sed alæ, quæ etiam puncto marginali carent, nigro-cœrulecentes: apice pallide fuscæ. *Cauda* unguiculata.

758. LIBELLULA corpore viridi-cœruleo; alis subfuscis: puncto marginali albo.

Raj. inf. 51. n. 12. Libella media, corpore viridi, alis fulvescentibus maculis parvis albis prope extremum angulum.

Vulgo Ulrica.

Habitat ad Fluvios.

DESCR. Media est magnitudinis. *Corpus* viridi-sericeum, nitidum, minime cœruleum. *Pedes* nigri. *Alæ* subfuscæ puncto marginali albicante oblongo; *Cauda* inermis.

Hæc præcedentis fæmina. *De Geer.*

759. LIBELLULA corpore sericeo nitido; alis inaurato-fuscis: macula nigra.

Hoffn. inf. t. 11. f. ult.

Raj. inf. 50. n. 9. Libella media, corpore partim viridi, partim cœruleo, alis media parte maculis amplissimis e cœruleo nigricantibus.

p. 140. n. 2. Libella media, corpore partim viridi, partim cœruleo, alis media parte maculis amplissimis e cœruleo nigricantibus oblitis.

Habitat ad Fluvios.

DESCR. *Corpus* cœruleo-nitidum. *Pedes* nigri. *Alæ* a medio versus apices cœrulecenti nigrae, ipsis apicibus aurato-fuscis; a medio alæ versus ejus basin color inauratus, nullum punctum marginale in hac.

* * * *Alis erectis sedentes, parvæ.*

760. LIBELLULA corpore sericeo; alis puncto marginali fusco.

Raj. inf. 51. n. 15. Libella minor, alis reticulatis, dorso viridi: incisuris albicantibus.

Levenh. arcan. 1695. p. 18. t. 19. Junfferties.

Habitat juxta paludes.

DESCR. Hæc e minoribus. *Dorsum* secundum totam longitudinem æneum. *Alæ* auratae, nitidæ, puncto marginali fulco, rhomboide, non nigro. *Vasa* alarum reticulata constant semper duobus nervis longitudinaliter sibi propioribus. *Thorax* & *abdomen* subtus & ad latera livida. *pedes* extra nigricantes, intus lividi. *Oculi* cinerei, supra fuscæ: *Caput* a tergo æneum, linea alba transversa, transversim trifida, extremitatibus crassioribus. *thorax* a tergo viridi æneus, utrinque linea alba longitudinali notatus. *Antennæ* nigrae, breves, infimo articulo crasso.

761. LIBELLULA corpore incarnato; alis puncto marginali fusco.

Raj. inf. p. 51. n. 16. Libella media, dorso albido, duabus maculis nigris juxta incisuras.

p. 52. n. 17. Libella minor, alis reticulatis, dorso rubro maculis ad singulas incisuras nigris.

Habitat juxta paludes.

DESCR. Magnitudine & figura præcedenti simillima, sed *Corpus* incarnatum, juxta incisuras *abdominis* lineolis sive characteribus nigris. *punctum* alarum marginale fulcum.

762. LIBELLULA corpore sericeo; alis puncto marginali nigro.

Raj. inf. 140. n. 1. Libella minor, corpore livide cœruleo.

Habitat juxta paludes.

DESCR. *Alæ* albæ puncto marginali atro. *Corpus* supra viridi-cœruleum, nitidum, absque ulla alia mixtura, magnitudo præcedentium duarum.

763. LIBELLULA corpore cœruleo cinereoque alterno; alis puncto marginali nigro.

Raj. inf. 53. n. 18. Libella minor, alis brevioribus, corpore cœruleo maculis transversis nigris.

Gœd. belg. 3. p. 29. f. R.

List. gœd. p. 228. f. 103.

Habitat ad paludes.

DESCR. Magnitudine & facie cum tribus præcedentibus convenit. *Alæ* albæ, puncto marginali atro. *abdominis* articuli a tergo vii antice cinerei,

postice cærulescenti-nitidi; antepenultimus & ultimus articulus in plerisque cinereus, nullo modo nitidus.

* * * *Alis planis sedentes. Magnæ.*

764. LIBELLULA alis macula dupliçī marginali.

Raj. inf. 72. n. 3. Libella maxima, abdomine longo tenui lævi viridi - splendentē ad initium & finem intumescente.

Habitat Upsaliæ rarioꝝ,

DESCR. Nomen Raji nil valet, descriptio bona est. Thorax crassus, cinereus, a tergo hirsutus. Abdomen attenuatum ex lato principio. Alæ albæ, versus basi luteæ, sed inferiores infra luteum colore nigrae, latera abdominis cana; cauda duabus appendiculis teretibus utrinque attenuatis. Nota essentialis, qua hæc species ab omnibus distinguitur, consistit in punto marginali, quod ut in reliquis versus extremitates nigrum sit, sed præter hoc punctum, fusca s. nigra alia macula, ad marginem anteriorem, in medio alæ singulæ; adeoque puncta quasi duo marginalia in omni ala.

765. LIBELLULA alis albis: basi luteis.

Raj. inf. 94. n. 4. Libellula maxima, abdomine breviore latioioreque flavo.

Habitat frequens ad Aquas in Uplandia.

DESCR. Dorsum luteum; subtus tota nigra; Thorax niger utrinque lineis duabus obliquis flavis. Pedes nigri; Frons virescens. Oculi grisei. Alæ basi ferrugineaꝝ.

766. LIBELLULA corpore fusco; alis albis, cauda similiçī.

Raj. inf. 49. n. 6. Libella maxima, abdomine flavo angustiore, nullis ad radicem alarum maculis fuscoſis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Alæ albæ, puncto marginali rufo-fusco. Corpus nigricans: Anus absque appendice.

767. LIBELLULA lateribus flava; alis albis.

Raj. inf. 50. n. 7. Libella major, præcedenti congener.

Swam. quart. p. 175. t. 8. f. 6.

Habitat ad Aquas vulgaris.

DESCR. Latera thoracis & abdominis flava; Alæ albæ, nullo modo flavescentes ut in Rajana; a dorso longitudinaliter fusca. puncta marginalia alarum fusco-ferrugineaꝝ.

768. LIBELLULA thorace viridi nitido: lineis flavis, alis pallidis, abdomine nigro.

Raj. inf. 49. n. 5. Libella maxima, abdomine breviore latioreque cæruleo.

p. 140. Libella maxima, abdomine breviore & crassiore latioreque cæruleo.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Caput & thorax viridia, nitida. oculi subfusc; lineæ due flavæ ad latera thoracis. ale flavescente-albæ, in quibusdam ad basin flavæ. punctum marginale fuscum. Abdomen cylindricum nigrum subtus flavum marginis colore dentato. cauda diphyllo angusta.

769. LIBELLULA viridi-inaurata; alis pallidis, pedibus nigris.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Precedenti simili, sed alia. *Mas* cauda quadridentata, dentibus superioribus pilosis, inferioribus singulis dupli denticulo. *Femina* cauda foliolis 2 lanceolatis. caput, thorax, abdomen cupreo inaurata. thorax pilosus absque maculis; margo alarum posticarum pone versus abdomen macula membranacea. oculi prasinii. Labium pallidum. abdomen subtus hinc inde pallide albescens.

770. LIBELLULA grisea; alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis flavis, cauda diphylla.

Reaum. gall. 6. t. 35. f. 3.

Raj. inf. 49. n. 2. Libella maxima, abdomine longo tenuiori, alis flavescentibus.

p. 140. Libella maxima, abdomine longissimo tenuiori, alis fulvescentibus.

p. 48. n. 1. Libella maxima vulgatissima, alis argenteis.

Mouff. lat. p. 67. Libella major. 2. 3.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Duo folia fusca lanceolata, in cauda. Abdomen longum, angustum, rufo-fuscum, interdum albo maculatum. in Thorace lineolæ utrinque due, oblique transversales, flavæ; thorax alias abdomini concolor, hirsutus. Alæ albidae vel in aliis flavescentes macula ferruginea. Est inter maximas.

771. LIBELLULA thorace luteo-virescente: lineis nigris, abdomine nigricante: characteribus flavis.

Reaum. gall. 4. t. 10. f. 4.

6. t. 35. f. 5.

Merr. pin. 197. *Libella maxima lutea*, cum 4. vel 5. spinis in caudæ extremitate.

Pet. mus. 84. n. 819. *Libella major*, corpore compresso flavescente.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Est inter maximas. *Mas* cauda forcipata, duobus unguibus majoribus, oppositis, & dupabus mucronibus subjectis, parvis. *Thorax* viridi-flavescens, anterius ad alarum exortum, versus caput, tribus nigris lineis duplicatis notatus. *abdomen* cylindricum, nigrum, octo constans articulis, a tergo linea flava longitudinali inscriptis, que 6 priores articulos exarat, non vero 7 & 8. Singulum segmentum ad latera macula flava transversa, & alia minore incurva longitudinali insignitur, que maculae evidentiores in feminina, quam in mare. *Femina* cauda duobus mucronibus armatur; *Maris* vero quatuor. *Maris genitalia* sub, vel in primo abdominis segmento, feminæ vero sub vel in ultimo segmento, uti in omnibus congeneribus. *Alæ* aquæ, puncto marginali & linea transversa in medio.

IV. LEPIDOPTERA.

Papilio.

* *Pedibus quaternis unguiculatis.*

772. PAPILIO tetrapus; alis angulatis nigris: margine postico albido.

Hoffn. inf. t. 3. f. 2. ♂ *t. 6. f. 3.*

Jonst. inf. 2. t. 9. ♂ II.

Raj. inf. 135. Papilio maxima nigra, alis utrisque, tam exterioribus, quam interioribus, limbo lato albo cinctis.

136. Papilio maxima nigra, alis utrisque limbo albo lato cinctis.

Vulgo Morio.

Habitat in *Betula* frequentissimus, Larva foliis *Betulae* victat.

DESCR. In maximis nostris Papilionibus hic est; Alæ angulato-dentatae, utrinque nigrae, sed margine latera & posteriora respiciente albae, at margo crassior. alarum superiorum antice duplii macula alba insignitus. Antennæ & Corpus nigrum.

773. PAPILIO tetrapus; alis angulatis fulvis nigro-maculatis: primariis punctis quatuor nigris.

Aldr. inf. 245. t. 246. f. 7. Polychloros.

Mer.

Mer. europ. 2. p. I. t. 52.

Gæd. lat. I. p. 175. t. 77.

Lift. gæd. 5. f. 3.

Raj. inf. 118. n. 2. *Papilio urticaria* referens major, alis amplioribus, quam *Ulmariam* vocitare soliti sumus.

306. n. 14. *Eruca mediæ magnitudinis*, corpore e cinereo nigricante, spinulis rarís in quolibet annulo ramosis fulvis.

Pet. mus. 34. n. 315. *Papilio testudinarius major*.

Alb. inf. 56.

Reaum. inf. I. t. 23. f. 2.

Frisch. germ. 6. p. 7. f. 3. *Eruca cærulescens*, spinis luteis.

Habitat in Salice, Ceraso, Pyro.

DESCR. Sequenti vulgatissimo simillimus est, sed paullo major. Alæ angulatæ, dentatae, fulvæ. Superior ala anteriore margine quatuor fasciis nigris & in disco punctis majusculis quatuor; Superiorum exterior margo, ut & alarum inferiorum margo exterior nigra fascia cinctus; inferioris alæ basis nigra est.

774. *PAPILIO tetrapus*; alis angulatis fulvis nigro-maculatis: primariis punctis tribus nigris.

Mouff. angl. p. 188. c. 3.

lat. p. 101. n. 11. f. 5. 6.

Hoffn. inf. I. t. 4.

Gæd. inf. I. p. 90. f. 21.

Lift. gæd. 3. f. 2.

Blank. belg. I3. t. I. L. M. N. O. P. Q.
germ. II. t. I. N. O. P. Q.

Merian. europ. I. p. 15. t. 44.

Rob. ic. t. 5.

Bry. renov. t. 15.

Bradl. natur. t. 27. f. 2.

Anon. angl. p. 34. n. 316. *Papilio testudinarius major*.

Raj. inf. 117. n. 1. *Papilio urticaria vulgatissima*, rufo nigro cæruleo & albo coloribus varia.

p. 118. *Eruca nigra* f. pulla setigera urticaria.

p. 348. n. 18. idem.

Alb. inf. 4. f. 6.

Reaum. gall. I. t. 26. f. 6. 7.

Habitat in *Urtica* foliis ovalibus 773. omnium vulgarissimus.

Larva spinosa, spinis spinosis.

Puppa est Chrysalis communiter deaurata.

DESCR. Praecedenti simillimus, sed discus alæ superioris duobus punctis nigris notatus, & hæc ala etiam basi nigra est.

775. PAPILIO tetrapus; alis angulatis fulvis nigro-maculatis: secundariis v. albo notatis.

Aldr. inf. 245. t. 244. f. 3. 4. mala.

Mouff. lat. 103. n. 2. f. 2. Papilio diurna media 2:da.

Hoffn. inf. 2. t. 7.

Mer. inf. I. p. 6. t. 14. ♂. 15. ♀.

Pet. mus. Papilio testudinarius, alis laceris.

Alb. inf. t. 4. f. 5. Papilio alis laciniatis.

Raj. inf. 118. n. 3. Papilio ulmariæ similis, sed minor; alis laciniatis: interioribus linea alba incurva notatis.

p. 349. n. 21. ♂ p. 119. Eruca lupulacea hirsuta e rufo nigricans, macula s. areola alba longa in medio dorso notata.

Frisch. germ. 4. p. 6. t. 4. Eruca spinosa semialba, semique lutea, papilione ypsilo Græco in ala.

Reaum. gall. I. t. 27. f. 9. 10.

Rob. icon. t. 23.

Habitat in *Urtica*, *Humulo*, *Ribe aculeata*.

DESCR. Alæ sinuatae, extus fulvae, nigro maculatae, punctis quatuor ad minimum distinctis, nigris; inferiores fere exteriorum similes, subtus alæ omnes griseo-cinereæ, undulatae, cum litera alba Calis inferioribus in medio adscripta. Tibiaæ albeæ.

776. PAPILIO tetrapus; alis angulatis fulvis nigro maculatis: omnibus ocello cœruleo - variegato.

Mouff. angl. p. 968.

lat. p. 99. f. infim. Regina omnium.

Hoffn. inf. t. 12. f. 9.

Jonst. inf. p. 40. n. 4. t. 5.

Bry renov. t. 27.

Mer. europ. I. p. 10. f. 26.

Gœd. lat. I. p. 23. f. I. *Oculus Pavonis.*

Lift. gœd. p. I. f. I.

Pet. mus. p. 34. n. 314. *Papilio oculus Pavonis dictus.*

Alb. inf. t. 3. f. 4.

Valent. herb. t. 57.

Anon. angl. p. 201. f. I.

Reaum. gall. I. t. 25. f. 2. I.

Raj. inf. 122. n. 13. *Papilio elegantissima ad urticariam accedens, singulis alis maculis oculos imitantibus.*

Vulgo *Oculus pavonis.*

Habitat in *Humulo & Urtica foliis oblongo-cordatis.*

777. PAPILIO tetrapus; alis denticulatis nigris albo-maculatis: omnibus fascia arcuata coccinea.

Aldr. inf. p. 239. t. 240. f. 4. 5.

Hoffn. inf. I. t. 2. & edit. alt. t. 2. f. 15.

Mouff. lat. p. 100. f. 3. 4. *Papilio diurna VI.*

Gœd. lat. I. p. 96. f. 26.

Lift. gœd. p. 10. f. 4.

Mer. europ. 2. p. 41. t. 91.

Anon. angl. p. 203. f. 4.

Reaum. gall. I. t. 10. f. 9. 8.

Petiv. mus. p. 35. n. 327. *Papilio major nigrescens, alis maculis rubris & albis pulchre illustratis.*

Blanck. belg. p. 18. t. 2. f. A, B, C, D.

germ. p. 15. t. 2. f. C, D.

Fonst. inf. t. 7. f. 6. 7. *Phalæna diurna maxima.*

Vulgo *Ammiralis.*

Habitat in *Urtica.*

778. PAPILIO tetrapus; alis dentatis fulvis albo nigroque variegatis: secundariis ocellis quinque.

Mouff. angl. p. 169.

lat. p. 101. n. 8. 9. f. 1. 2.

Hoffn. inf. t. 7. f. 3. edit. alt. 4. t. 5.

Goed. lat. 3. p. I. f. I.

Lift. goed. p. 14. f. 6.

Blank.

Blank. belg. p. 21. t. 3. A. B. C. D.

germ. p. 17. t. 3. C. D.

Mer. europ. 3. p. 52. t. 15. edit. ult. 88.

Albin. inf. LVI.

Reaum. gall. 1. t. 26. f. 11. 12.

Pet. mus. p. 35. t. 326. *Papilio eleganter variegatus*, agilis, *Bella donna* dictus.

Raj. inf. 122. n. 13. *Papilio major pulchra*, nigro rufo albo coloribus varia.

Vulgo *Bella donna*.

Habitat in *Carduis*.

779. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvis nigro-maculatis: subtus lineis argenteis transversis nigris.

Pet. mus. 35. n. 321. *Papilio fritillarius major*, lineis subtus argenteis.

Raj. inf. p. 119. n. 4. *Papilio major*, alis fulvis: maculis nigris in supina parte, prona transversis: areis argenteis depictis.

Vulgo Imperator.

Habitat in Hortis,

780. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvis nigro - maculatis: subtus maculis 21 argenteis.

Mouff. angl. p. 969.

lat. p. 101. f. 3. 4. n. 10.

Aldr. inf. p. 245. t. 246. f. 8. 9.

Pet. mus. p. 35. n. 320. *Papilio fritillarius major*, maculis subtus argenteis.

Raj. inf. p. 119. n. 5. *Papilio major*, alis fulvis, supina parte maculis crebris, prona etiam argenteis eleganter pictis.

Vulgo Rex.

Habitat in Hortis.

781. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvis nigro- maculatis: subtus maculis 37 argenteis.

Hoffn. t. 12; f. 11.

Merian.

Merian, europ. 2. t. 157. f. superior.

Rob. icon. t. 12.

Pet. mus. p. 51. n. 520. Papilio rigensis aureus minor, maculis argenteis subtus perbelle notatus.

Raj. inf. p. 120. n. 6. nomine Petiueri.

Vulgo Principissæ.

Habitat frequens Upsaliæ.

DESCR. Præcedentibus duobus minor, sequentibus duobus major est. Alæ omnes supra fulvæ : maculis punctiformibus, multis, distinctis, nigris. Alæ majores subtus luteæ multis maculis s. punctis nigris; versus apices notatae punctis 7 argenteis, quarum tres majores sunt. Alæ secundariae subtus habent maculas argenteas plures: quarum 19 majores, 11. vero minores, seu potius puncta sunt; nam versus marginem posteriorem septem maculæ argenteæ subovatae; intra has septem puncta argentea: versus marginem interiorem alæ, due lineæ argenteæ; præter has in disco septem maculæ majores argenteæ, exceptis minoribus reliquis.

782. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvis nigro - maculatis: subtus maculis 9 argenteis.

Pet. mus. p. 35. n. 322. Papilio fritillarius maculatus præcox.

Raj. inf. 120. n. 7. Papilio fritillarius major (rectius minor) alis fulvis superne maculis nigris tessellatis.

Vulgo Princeps.

Habitat Upsaliæ minus frequens.

DESCR. Inter eos, qui argenteis punctis gaudent, hic certe minimus est. Alæ luteæ, subtus nigro-undulatae, supra nigro-reticulatae; minores alæ in margine habent 7 maculas albas subrotundas, æquales; in medio disci subtus macula una argentea, reliquis major, oblonga, utrinque obtusa, collocata in fascia pallidiore; nona deinceps in eodem latere versus basin alæ reperitur argentea.

783. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvis nigro - maculatis: subtus fusciis tribus flavis.

Aet. upf. 1736. p. 22. n. 24. Papilio alis erectis subrotundis testaceis: punctis pallidis, lineolis undulatis fusca, subtus albo-variegatis.

Pet. gaz. 28. t. 18. f. 10. Papilio fritillarius lincolniensis, fasciis subtus pallidis.

Raj. inf. 121. n. 9. nomine Petiucri.

Vulgo Comes.

Habitat sat frequens in Horto Academicō.

DESCR. Facies eadem cum quatuor præcedentibus, magnitudo cum ultima convenit, Alæ omnes luteæ, supra nigro undulatae s. potius reticu-

ticulatae. Alae primariae subtus flavæ, parum nigro undulatae, apicibus flavis: secundariae alæ subtus flavæ & nigro undulatae fasciis duabus fulvis undulatis: caret hæc maculis omnibus argenteis.

784. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis dentatis fulvo nigroque nebulosis: primariis ocellis duobus.

Hoffn. inf. 2. t. 8.

Pet. mus. p. 34. n. 307. Papilio oculis nigris subtus marmoreus.

gaz. p. 22. t. 14. f. 9. idem nomen.

Raj. inf. 128. n. 6. Papilio majuscula, alis pullis cum duplice in exterioribus macula lutea, & duplice oculo nigro.

Vulgo Faunus.

Habitat in sylvis petrosis non infrequens.

DESCR. Alæ supra fuscae sunt cum fasciis obsolete flavis; Alæ primariae subtus flavæ, versus margines nebulosæ. Alæ secundariae subtus albo & nigro nebulosæ sunt. Ocelli duo nigri puncto albo in majoribus alis utrinque.

785. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis fusco-nebulosis: primariis sequiocello; secundariis quinis ocellis.

Mouff. angl. 972.

lat. p. 104. n. 9. f. 10.

Fonst. inf. p. 58. n. 9. t. 6.

Merret. pin. 198. n. 10. Papilio ultimia parte alæ exterioris clypeolo nigro, quem medium punctum eburneum ornat decorata.

Merian. europ. 2. p. 10. t. 4. (edit. ult.) t. 54.

Robert. ic. 15. f. 2.

Aldr. inf. p. 245. t. 244. f. 12.

Raj. inf. 123. n. 15. Papilio media, alis fulvo s. rufo & nigricante colore variis cum ocello prope extimum angulum alarum exteriores.

Petiv. mus. p. 34. n. 312. Papilio oculatus ex aureo & fusco marmoratus.

Vulgo Satyrus.

Habitat in Poa, infidet sæpe petris & saxis.

DESCR. Alæ rotundatae, integerrimæ, omnes supra fuscae, oculis nigris pupilla alba, & margine extimo rufo notatae; horum ocellorum unicus supra alas in aliis primoribus, tres minores vero supra in secundatiis aliis;

ala

alæ etiam primores plicatæ sunt striis profundis; At alæ subtus, licet fuscæ sint, primores tamen obscurioribus lineis undulatæ & singulæ notatae ocello glauco, in medio nigro, pupilla alba: juxta hunc ocellum versus angulum alæ ocellus minimus glaucus pupilla alba. Alæ secundariae fuscæ, cano undulatæ, singulae margine ocellis septem notatae, quorum pupilla nigra in medio alba circulo dupli glatico circumdata. horum ocellorum duo ab domine proximi in unum coaliti sunt.

786. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis lævibus fuscis: primoribus subtus fulvis ocello uno.

Aldr. inf. 245. t. 246. f. 13.

Hoffn. inf. t. 1. f. 1. & edit. alt. 4. t. 10.

Pet. mus. 34. n. 309. Papilio pratensis oculatus fuscus.

Raj. inf. 124. n. 16. Papilio media, alis supina facie pullis, prona ex rufo s. fulvo & fusco variis cum ocello ad extimum alarum exteriorum angulum.

Reaum. gall. 1. t. 11. f. 1.

Vulgo Coridon.

Habitat in sylvis.

787. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis fuscis: fascia transversali rufa: ocellis utrique septem.

Alb. inf. t. V. f. 1. Papilio fusca pratensis.

Vulgo Alexis.

Habitat in sylvis.

DESCR. Alæ supra fuscæ, subtus dilutius fuscæ: *Primores* infra & supra fascia rufa transversæ, ocellis 4 nigris. Margine maculis 5 albis. *Secundariae* supra & infra ocellis 3 nigris ruffo cinctis subtus minoribus, & duabus insuper mæculis albis. *Antennæ* nigrae subtus albae.

788. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis fuscis: subtus primariis ocello triplici, inferioribus quintuplici.

Pet. mus. p. 34. t. 313. Papilio medius, omnino fuscus, plurimis ocellis nigris in circulis luteis subtus ornatus.

Raj. inf. 129. n. 7. Papilio medius totus pullus, prona alarum parte ocellis aliquot e puncto albo dupli circulo nigro & fordide luteo cincto compositis illustrata.

Habitat in sylvis.

DESCR. utrinque fuscus, subtus dilutior. *Ocelli* nulli supra alas; subtus primoribus ocelli 3 minoribus gracilis, subtus secundarii ocelli 5 (2&3) pupilla alba.

789. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis fulvis: primariis subtus ocello unico; secundariis subtus albo fasciatiss.

Pet. mus. p. 34. n. 311. Papiliunculus aureus oculatus in ericetis frequens.

Raj. inf. 125. n. 19. Papilio parva e fulvo & fusco bicolor, fulvo medium alam, fusco oras extreimas occupante, cum ocello ad extimum angulum alarum exteriorum.

Habitat in Ericetis.

DESCR. Raji descriptio bona est: *Ale* supra fulvæ, subtus cinerascentes; Ocellus in ala primaria subtus unicus est & niger puncto albo circu-loque nigro. *Ale* secundariae carent ocellis & fascia pallidiore notantur. Variat major ocello obsoleto.

790. PAPILIO tetrapus; alis rotundatis fulvis: subtus cinerascentibus: fascia alba ocellisque quinis.

Habitat cum praecedenti.

DESCR. Praecedenti simillimus vel paulo major. *Ale* luteæ f. ferrugineo-fulvæ, primores subtus apicibus cinerascentia subiecta obsoleta albicante linea; ocello unico parvo: *Ale* secundariae subtus cinereo fusca cum fascia lata albida; his singulis ocelli tres versus marginem posteriorem, & unicus ocellus versus marginem anteriorem remotus a reliquis interjecta fascia. omnes ocelli constant circulo albo puncto nigro: in medio albo; adeoque differt a praecedenti ocellis in ala secundaria quaternis, quibus ille caret.

* * *Pedibus sex unguiculatis.*

791. PAPILIO hexapus; alis flavo nigroque variegatis: secundariis angulo subulato maculaque fulva.

Mouff. angl. p. 968.

lat. p. 99.

Hoff. inf. 1. t. 12. edit. alt. t. 9. f. 10.

Hollar. mus. t. 5. f. 2.

Aldr. inf. p. 96. n. 5. 6. f. 1.

Fonst. inf. p. 40. n. 2. t. 5. 7.

Jung. verm. 134. Eruca rutacea.

Merian. europ. 1. p. 13. t. 38. Basse la Reine.

Merret. pin. 198. Papilio diurna maxima 2da.

Misc. nat. Curios. ann. 2. dec. 2. p. 49. f. 9.

Column. ecphr. 2. p. 85. t. 86. Papilio erucæ rutaceæ.

Rob. ic. 18. male.

Reaum.

Reaum. gall. 1. t. 30. f. 1.

Frisch. germ. 2. p. 41. t. 10. *Eruca anethi.*

Pet. mus. p. 35. n. 328. *Papilio major caudatus ex nigro & luteo variegatus.*

Raj. inf. 110. n. 1. *Papilio alis amplissimis, flavicante & nigro coloribus pulchre variegatis; interioribus caudatis.*

Habitat in *Ruta*, *Anetho*, *Seseli* (Fœniculo tor-tuoso), *Pimpinella*, *Selino*.

DESCR. Alæ, pedes, lingua nigra. Antennæ clavatae. Alæ primores ovatae, obtusaæ, integerrimæ, nigro flavoque variegatae; seu nigras concipiæ, cui juxta marginem crassiore maculae tres, lunares, flavæ; juxta marginem vero posteriore maculae 8, parvæ; & in medio inter ambos descriptos ordines, a margine interiore verius angulum alæ, maculae 7, juxta se collocate, quarum interiores majores. Alæ secundariae singula denticulatae, cuius posterior angulus linearis productus & reliquis multo longior: margo hujus alæ 6 maculis flavis lunulatis pictus, praeter septimam maculam, quæ anno proxima est, & ocello fulvo cœruleo colore cincto spectabilis; discus hujus alæ flavus. Larva glabra, suaveolens, 16pus, taeta duo cornua fulva exserens.

792. PAPILIO hexapus; alis secundariis angulato-dentatis: subtus flavo alboque flammeis.

Hoffn. inf. t. 12. f. 1.

Pet. gaz. p. 18. t. 11. f. 10. *Papilio minor fuscus, dupli linea inferne præditus.* (Mas.)

f. 11. *Papilio minor fuscus: campo aureo, linea gemina subtus ornatus.* (Fæmina.)

Raj. inf. p. 130. n. 10. *Papilio minor, alis exteriores nigricantibus, macula in medio lata arcuata fulva.*

Habitat in *Betula*; præsertim in Smolandia obvius.

793. PAPILIO hexapus; alis divaricatis integerrimis fulvis: punctis albis, lineaque nigra.

Act. upf. 1736. p. 23. n. 33. *Papilio alis erectis ovalis integerrimis testaceo - griseis, tesserulis albis linea nigra sub superioribus.*

Habitat in Pratis.

794. PAPILIO hexapus; alis divaricatis denticulatis nigris albo-punctatis.

Hoffn. inf. 4. t. 2. f. ult.

Pet. mus. 35. n. 325. *Papiliunculus fuscus*, punctis plurimis albicantibus.

gaz. 56. t. 36. f. 6. *Papilio fuscus* &c.

Act. upsi. 1736. p. 23. n. 34. *Papilio alis erectis obtusis dentatis nigris*: punctis albis tessellatis.

It. oeland. 3. *Papilio hexapus*, alis divaricatis denticulatis nigris albo-punctatis,

Habitat primo vere in Pratis.

DESCR. Magnitudo Argi 803. *Corpus* totum & alae supra nigro fuscae; *Ale* maculis parvis seu punctis quadratis, albis, numerosis adspersa sunt a parte exteriori, margine quasi dentato, interiacentibus maculis albis. *Corpus* & *Ale* subtus griseo-cinereæ; alæ ipsæ subtus maculis albis difformibus inaequalis magnitudinis. *Antennæ* elevatae, supra fuscae, subtus albide, petiolis annulis minimis albis. Alæ erectæ non sunt, sed divaricatae, fere uti *Phalaenæ* quercifolia dicta.

795. PAPILIO hexapus; alis angulatis flavis puncto ferrugineo.

Mouff. angl. p. 198.

lat. p. 103. f. 1. *Papilio diurnus medius* 1.

Fonst. inf. p. 42. n. 1. t. 5. 6.

Hoffn. inf. I. t. 1. aut. 12. f. 8. t. 2.

Rob. ic. t. 13.

Alb. inf. t. 2. f. 3.

Pet. mus. p. 1. n. 1. *Papilio sulphureus* (Mas.)

Raj. inf. 112. n. 4. *Papilio præcox sulphurea* f. flavo-viridis, singulis maculis ferrugineis notatis.

3 *Pet. mus.* p. 1. n. 2. *Papilio sulphureus pallidus*.
(fæmina.)

Vulgo *Papilio canicularis*.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. *Antennæ* ferrugineaæ; *Ale* flavæ: puncto in singula ala media ferrugineo, & ad marginem alarum primorum anteriorem puncta minutissima ferruginea. Alarum secundiarum basis superne antice ferruginea. *Pedes* albidi.

796. PAPILIO hexapus; alis rotundatis albis; venis nigris. *It. gotl.* 182.

Aldr. inf. p. 245. t. 246. f. 6. *mala*.

Hoffn. inf. t. 10. f. 14.

Mer. europ. 2. p. 38. t. 35. f. *superiores*.

gall. t. 157. (edit. alt.) 85.

Alb.

Alb. inf. t. 2. f. 2.

Pet. mus. p. 33. n. 301. Papilio alba, venis nigris.

*Frisch. germ. 5. p. 16. t. 5. Eruca hyemalis luteo
alboque striata.*

*Raj. inf. 115. n. 5. Papilio alba, nervis alarum ni-
gris, brassicæ majoris figura & magnitudine.*

Reaum. gall. 2. t. 2. f. 9. 8.

Vulgo Papilio hyemalis.

Habitat in *Pruno spinosa*, foliis lanceolatis. *Fl. Svec.*

397. & *Oxyacantha*. *Fl. Svec. 399.*

Forte & hujus speciei sit, *Papilio ex Eruea gregaria majore proveniens*
fordide albicans venis nigricantibus. Raj. hist. 17. & Larva labyrinthiformis
It. aeland. 62.

797. PAPILIO hexapus; alis rotundatis albis: venis di-
lato-virescentibus.

Mer. europ. (edit. 1) v. 2. p. 77. t. 39.

Alb. inf. t. 52. f. F. G.

*Pet. mus. p. 33. n. 302. Papilio albus medius: venis
latis, subtus nigricantibus.*

gaz. t. 62. f. 4. nomen idem.

*Raj. inf. 114. n. 4. Papilio brassicaria media, alis
albis secundum nervos lineis e viridi nigricanti-
bus subtus striatis.*

Vulgo Brassicaria latis venis.

Habitat in *Brassica*.

798. PAPILIO hexapus; alis rotundatis albis; prima-
riis bimaculatis apice nigris, minor.

Mouff. angl. p. 971. f. 9. 10.

lat. p. 103. f. ultim. Papilio diurnus medius.

Gœd. belg. 1. p. 97. f. 27.

List. gœd. p. 22. f. 8.

Mer. europ. 2. p. 40. t. 39. edit. gall. t. 89.

Blank. belg. p. 29. t. 5. f. A. B. C. D.

germ. p. 23. t. 5.

Rob. icon. t. 6.

Alb. inf. t. 51. f. C. D. (Mas) & E. F. (Fæmina.)

Reaum. gall. 1. t. 29. f. 7. 8. & t. 2. f. 3.

*Merr. pin. 198. n. 5. Papilio corpore & antennis li-
vescentibus, capite aliquo pallidis.*

Pet. mus. p. 85. n. 826. Papilio vulgaris albus minor,
gaz. p. 10. t. 64. f. 4. Papilio alba vulgaris striata, maculis duplicibus. (fæmina.)
p. 10. t. 49. f. 11. Papilio albus minor, apicibus nigris. (Mas.)

Raj. inf. 114. n. 2. Papilio alba media, alis exterioribus albis, duabus maculis nigris infra medianam longitudinem versus interiore marginem notatis, interioribus subtus nigricantibus.

p. 349. n. 20. Eruca Brassicam depascens viridis mediocris, linea in utroque latere e luteo albente.

p. 114. n. 3. Papilio alba media, alis omnibus albis cum macula (seu punctum mavis dicere,) leviter nigricante in exterioribus. (Mas.)

Vulgo Brassicaria minor.

Habitat in *Brassica* & *Tropæolo*.

Larva viridis, a sequentis diversissima, licet utriusque Papiliones inter se adeo similes, ut demita magnitudine vix distingui queant.

799. PAPILIO hexapus; alis rotundatis albis: primariis bimaculatis: apicibus nigris; major.

Mouff. lat. p. 189. f. 1. Eruca in Brassica,

Gæd. belg. 1. p. 59. f. 11.

List. gæd. p. 16. f. 7.

Mer. europ. 1. p. 16. t. 45.

Blank. belg. p. 24. t. 4. f. A. B. C. D.
germ. p. 19. t. 4. f. A. B. C. D.

Alb. inf. p. 1. t. 1.

Swam. quart. p. 202. t. 13. f. 6.

fol. t. 37. n. 6.

Reaum. gall. 1. t. 29. f. 1. ♂ t. 10. f. 7.

Pet. mus. p. 85. n. 825. Papilio albus vulgaris major.
gaz. t. 62. f. 3. Papilio alba major, apicibus nigris.

Raj. cantab. p. 134.

inf. p. 113. n. 1. Papilio brassicaria alba major vulgarissima.

Raj. inf. p. 348. n. 19. Eruca brassicaria maxime vulgaris, nigro, luteo & cæruleo coloribus variegata.

Vul-

Vulgo *Brassicaria vulgaris.*

Habitat in *Brassica.*

Larva variegata.

MAS maculis tribus nigris in primore prona ala; in secundaria prona uno una; *fæmina* in prona parte nullam maculam nigram gerit excepto apice alæ.

800. PAPILIO hexapus; alis rotundatis albis immaculatis. *De Geer.*

Pet. mus. 33. n. 303. Papilio albus minor.

Habitat in sylvis.

DESCR. Est penultimæ fere magnitudine.

801. PAPILIO hexapus; alis rotundatis integerrimis: secundariis viridi-nebulosis; primoribus lunula nigra.

Mouff. lat. p. 106. n. 5. f. 2. 3. 4.

Hoffn. inf. 2. t. 9. f. 1.

Fonst. inf. 1. 5.

Bry rendv. t. 22.

Rob. ic. t. 21.

Valent. herb. t. 183.

Merian. europ. t. 181.

Petiv. mus. p. 33. n. 306. Papilio albus subtus viridi colore marmoreatus s. maculis croceis ornatus.

Raj. inf. 115. n. 6. Papilio minor alba, alis exterioribus albis macula insigni crocea splendentibus, inferioribus superne albis, subtus viridi colore variegatis.

a *Raj. inf. p. 115. n. 7.* Papilio minor alba, alis exterioribus ad imum marginem nigris aut fuscis, macula in medio nigra.

Pet. mus. p. 33. n. 305. Papilio alba subtus viridi colore marmoreata; fæmina.

Habitat Upsaliæ frequens.

Vulgo *Aurora.*

DESCR. *Antenna* clavata, exalbidæ. *Alæ* albæ; sed primores extus apice fuscae, subtus flavo-cinereæ cum macula s. puncto lunulato fuso in medio alæ utriusque paginae. *Alæ secundarie* subtus viridi nebulae, supra albæ, versus basin fuscae. *Oculi* virescentes, maculati. *Mas* in ala superiori, ejusque in medio a pagina exteriore, macula lata crocea distinctus.

802. PAPILIO hexapus; alis rotundatis integerrimis

Q 3

albis,

- albis; secundariis ocellis quatuor superne, septem inferne. *It. gotl.* 230.
- Mouff. lat.* p. 94. f. 2. 3. *Phalæna media* i.
- Pet. mus.* 49. n. 502. *Papilio alpinus* ex albo nigro-que variegatus, iride rubente oculatus.
- Pet. gaz.* 37. t. 23. f. 8. *Papilio alpinus*.
- Raj. inf.* 139. n. *Papilio alpina major*, alis albican-tibus: exterioribus maculis nigris notatis, interio-ribus ophthalmoidibus: iride rubra.
- Vulgo Alpicola.*

Habitat in Alpibus & altis exaridis montibus frequens.

DESCR. Mole cum maximis nostris certat. *Corpus* nigricans lana cine-reæ. *Alæ* erectæ, rotundatae, albæ, venis pallidis & farina cinereo-nebulosa perfusa. *Ala primaria* 3 maculis nigris versus marginem crassio-ren, unica nigra versus interiorem, quæ omnes utraque superficie ad-parent. *Alæ secundariae* ocellos albo, (in medio) rubro, nigro, cæruleo constructos, duos utrinque conspicuos habent, & juxta basin ocellos 4 cæcos absque pupilla alba; & versus anum unicum ocellum nigrum pupilla rubra: hi posteriores subtus conspicui. *Pedes* 6. *Antennæ* clavatae, apice subtus nigræ, sub ano membrana crassa, concava, carinata.

803. **PAPILIO hexapus**; alis rotundatis integerrimis cæruleis: subtus ocellis numerosis.

Hoffn. inf. 1. t. 4.

Mouff. lat. p. 105. f. ult. duæ ♂ p. 106. f. 1. *Papilio diurnarum minima* quarta.

Jonst. inf. t. 6. f. penult.

Merr. pin. 144. *Papilio* alis oculatis cyaneum cœle-stem spirantibus.

Mer. europ. 153.

Rob. ic. t. 17.

Pet. mus. p. 34. n. 318. *Papiliunculus* cæruleus, ocellis plurimis subtus eleganter adspersus.

gaz. p. 55. t. 35. f. 1. *Papiliunculus* cæruleis vulgatissimus.

Raj. inf. 131. n. 11. *Papilio parva*, alis superne pur-puro-cæruleis, subtus cinereis: maculis nigris circulo purpurascente cinctis, punctisque nigris pul-chre depictis.

Vulgo Argus oculatus.

Habitat in Ericetis.

DESCR. Tota alis supra cæruleis, infra ocellis numerosis nigris, & mæulis marginalibus fulvis in alis secundariis.

804. PAPILIO hexapus, alis rotundatis integerrimis nigro fuscis: subtus ocellis numerosis.

Raj. inf. 131. n. 12. Papilio parva, alis supinis puluis cum linea s. ordine macularum lutearum adimum marginem.

Vulgo Argus fuscus.

Habitat in Ericetis.

DESCR. Facies & magnitudo & color omnino præcedentis, a quo differt alatum lateris superioris colore, qui non, ut in illo, cæruleus, sed omnino nigro-fuscus; ad marginem alaruin secundiarum a latere supetiete linea e punctis fulvis.

An præcedentis fæmina?

805. PAPILIO hexapus; alis rotundatis: supra fuscis, subtus punctis nigris quadraginta duobus.

Vulgo Argus myops.

Habitat in Ericetis.

DESCR. Alæ omnes supra fuscae, obsolete inaculate, versus marginem posticum ferruginea. alæ primariae subtus singulæ punctis nigris 3 longitudinalibus majoribus; dein 8 minoribus transversim positis; tum 8, minimis, obsoletis, transversis, atnulo albo carentibus. Alæ secundariae punctis nigris 9, sparsis; tum 15, duplii linea dispositis; inargo postice fulvis est. Præcedentibus duabus cæterum simillimus.

806. PAPILIO hexapus; alis rotundatis integerrimis: subtus viridibus immaculatis.

It. æl. 7. Papilio argo similis, alis immaculatis supra cyaneis.

Pet. gaz. p. 6. t. 2. f. 11. Papilio minor: superne fuscus, inferne viridis.

Vulgo Argus cæcus.

Habitat in sylvis.

DESCR. Corpus cinereum. Antennæ & pedes nigrae: annulis numerosis albis. Alæ eræctæ, supra fusco-nigricantes, subtus virides; in alis secundariis, juxta marginem superiorem, punctum album. Oculi ante & pone linea alba notati: magnitudo argi. Sexus forte differentia: alis supra cyanis communiter est; variat & alis supra fuscis.

807. PAPILIO hexapus; alis rotundatis fulvis; utrinque punctis nigris.

Merian. gall. t. 164.

Pet. mus. p. 34. n. 317. Papilio minor atreus ex nigro permaculatus.

Raj. inf. 125. n. 20. Papilio parva, alis exterioribus circa margines nigricantibus, media parte rufis, serici instar splendidibus, maculis longis nigris pictis.

Vulgo Butyracea vulgaris.

Habitat in pratis Westmanniae.

OBS. Nulla alba puncta in inferiore ala subtus.

308. PAPILIO hexapus; alis rotundatis fulvis: infra albo punctatis.

Pet. gaz. 22. t. 14. f. 3. Phalæna minor nostras fulva, alis limbo nigro insignitis?

Vulgo Butyracea albo-maculata.

Habitat cum praecedente in pratis Westmanniae.

DESCR. Figura Petiveri quadrat, ni antennæ different. Facies & magnitudo omnino praecedentis, sed Alæ supra fulvæ s. ignei coloris, nitidæ, immaculatæ, margine tantum nigro. Alæ primores subtus aliquot nigris punctis notatæ, quorum duo in medio coalita sunt. Alæ secundarie subtus magis griseæ, punctis nigris & aliquot majoribus albis; ad marginem posteriorem verius anum alæ denticulatæ sunt, & maculis semicircularibus fulvis notatae. Mas supra maculis caret nigris.

Phalæna.

* Antennis prismaticis.

309. PHALÆNA prismicoris spirilinguis fusca; alis inferioribus abdomineque fasciis transversis rubris.

Mouff. lat. p. 91. f. 2. & p. 182. f. 1. Eruca glabra viridium nobilissima.

Jonst. inf. t. 19. n. 1. 2. Eruca viridis Ligustrina.

Jacob. mus. dan. 1. f. 5. n. 24. t. 1. f. 24. exterior. Eruca glabra & cornuta prima.

Jung. verm. 108. Eruca virgata s. calcarisata.

Swam. bibl. t. 29. f. 1. 2. 3.

Merian. europ. 3. p. 54. t. 23. gallic. t. 124.

Alb. inf. t. VII.

Gæd. belg. 1. p. 93. f. 24. (Papilio, non larva.)

Lift. gæd. p. 71. t. 25. (Papilio, non larva.)

Reaum. gall. 2. t. 20. f. 1. 2. 3. 4. Sphinx.

Raj. inf. 144. n. 1. Phalæna maxima caudata, alis angustis longis acutis, abdomine roseo: sex septemve areolis transversis nigris.

p. 362.

p. 362. n. 62. Eruca glabra maxima, viridium nobilissima mouffeto.

Vulgo Sphinx.

Habitat in *Ligustro, Syringa, Fraxino, Lonicera, Salice.*

Larva *XVipus*, glabra, cauda cornuta.

810. PHALÆNA prismaticornis spirilinguis; alis planiusculis erosis griseis, antennis albis. *De Geer.*

Habitat in *Populo.*

DESCR. Larva cornicauda. *PHALÆNA* pedes posteriores antennæque albae. Alæ griseo-variegatae, cinereæ: inferiores minores, magis fulvæ.

811. PHALÆNA prismaticornis spirilinguis; alis viridi fulvo purpureo que variis.

Mouff. lat. p. 183. Porcellus.

Gæd. belg. 3. p. 47. t. 2.

Lift. gæd. p. 73. f. 26. Eruca elephantina.

Albin. inf. t. 1. f. D. E.

Merian. europ. 2. p. 23. f. bona. gallice t. 73.

Frisch. germ. 13. p. 4. t. 2. Eruca vitis brunnea.

Raj. inf. 145. n. 2. Phalæna major, cauda acuta, alis angustis acutis ex viridi fulvo & purpureo rubente colore varia.

149. *Eruca porcellus dicta?*

Vulgo Porcellus.

Habitat in *Vite, Impatiante.*

OBS. Vidi Larvas duas distinctas in Suecia e genere *Porcelli Elephantis*, quarum metamorphosis nondum absoluta est.

812. PHALÆNA subulicornis elinguis; alis depresso-nebulosis, abdomine annulis albis.

Plin. hist. l. 17. c. 24. Cossus.

Mouff. lat. p. 196. f. 1. Sphondyla rubra.

Mer. eur. 3. p. 58. t. 36. gallice t. 137. ♂ 171.

Gæd. belg. 2. p. 112. f. 33.

Lift. gæd. p. 105. f. 39.

Alb. inf. t. XXXV. f. 56.

Reaum. gall. VI. t. 17. f. 1. 3. 4. 5.

Frisch. germ. 7. p. 1. t. 1. Eruca terrestris magna.

Raj. inf. 150. n. 2. Phalæna grandis, alis cinerascen-

tibus: lineolis creberrimis nigricantibus variis, ab domine annulis transversis nigris & albis versicolore.

p. 351. n. 25. Eruca maxima subterranea raris pilis obsita, supina parte tota, excepto capite, rubra, prona flava.

Vulgo Cosfus.

Habitat in ligno Salicis, vescitur ligno, non foliis.

Larva XVIpus pilis raris.

Puppa intra folliculum e terra; incisuris puppæ dentatis.

813. PHALÆNA subulicornis elinguis, alis lanceolatis albis: venis nigris.

Reaum. gall. I. t. 12. f. 9. 10.

Att. upf. 1736. p. 26. n. 85. Papilio apiformis, abdome aureo.

It. æl. 152. Papilio apiformis, abdomine aureo.

Habitat in lucis & hortis.

DESCR. Figura & facies apis. Alæ albæ venis nigris: superiores maculis nigris in medio & in apice, inferiores solo marginè nigræ. Cingulum abdominis flavum. Dorsum nigrum lineis duabus flavis. Cauda ferruginea villosa. Antennæ clavato-subulatae nigræ subitus albæ. Pedes spinosi.

814. PHALÆNA subulicornis spirilinguis; alis superioribus subcæruleis: punctis sex rubris, inferioribus omnino rubris.

Mouff. angl. p. 966.

lat. p. 97. f. infim. Phalæna pratensis t.

Fonst. inf. t. 7. ord. 3. Phalæna minima pratensis t. t. 6. Papil. tab. 9. aldr. n. 7.

Gœd. belg. 2. p. 126. t. 31. f. 1. 3. 4. Rara.

List. goed. p. 100. f. 37.

Mer. eur. 2. p. 27. t. 17. gallic. t. 67.

Alb. inf. t. 82. f. C. D. Leopardus sylvestris.

Reaum. gall. I. t. 12. f. 14. 15. 16. 17.
2. t. 2. f. 2.

Petiv. mus. p. 36. n. 330. Papilionoides virescens maculis quinque miniatis ornatus.

Raj. inf. 134. n. 2. Papilio pratensis, alis pendulis, minor; corpore crasso nigro, alis externis ex cæruleo nigricantibus cum maculis sanguineis.

Merr.

Merr. pin. 198. *Papilio minor* cum alis externis nigris quinque maculis, internis rubris.

Vulgo *Leopardus*.

Habitat in *Filipendula*, volitans de die, licet tarde.

DESCR. *Puppa* intra folliculum membranaceum flavum latitat.

Phalæna *mas* gaudet maculis sex rubris in ala exteriore,

fæmina vero maculis quinque, connatis scilicet duabus baseos.

DESCR. Corpus & artus nigra, vestira lana nigra. *Antennæ* antrotsum adscendentes, versus summitatem sensim latiores (non tamen clavatae) ad apicem attenuatae ac depressæ. *Alæ* superiores ex viridi-cæruleo nitentes: punctorum tribus paribus ovatis coccineis, *alæ* inferiores coccineæ margine cæruleo nitido.

815. **PHALÆNA** subulicornis spirilinguis, alis deflexis erosis pallidis: triangulo fuscelcente incarnatum includente, thorace gibbo. *De Geer.*

Merian. eur. t. 34.

Gæd. belg. I. p. 109. t. 56. *Meticulosa*.

List. gæd. 118. t. 44.

Reaum. gall. I. t. 8. f. 25. 26. ♂ 2. t. 14. f. 12. 13.

Vulgo *Meticulosa*.

Habitat in omnibus oleraceis: *Cheirantho*, *Urtica*, *Mercuriali*.

* * *Antennis pectinatis, Lingua nulla.*

816. **PHALÆNA** pectinicornis; alis supra viridibus: fascia transversali sinuato-dentata glauca.

Habitat *Upsaliæ* in *Lupuletis*, lecta ab *O. Celsio*.

DESCR. Est e mediocribus. *Caput* viride. *Alæ* superiores virides: fascia in medio alarum lineari, transversali, glauca: in singula ala denticulo unico antrorsum & alio opposito retrorium spectante, præter denticulum alium ad marginem exteriorem alæ antrorsum proinvenientem. Margo alarum pone simili glauca linea terminatur, quæ in singula ala duos denticulos antrorsum exserit; alarum superiorum margo interior & exterior vix conspicue griseus. Thorax & abdomen villis glauco ferrugineis teguntur. *Alæ* inferiores cinerascentes: *Antennæ* glaucae, filiformes, crenatae seu vix manifeste pectinatae (in nostro, quæ forte fæmina) vel potius ferratae.

817. **PHALÆNA** pectinicornis; alis sublinearibus fuscis.

Act. upf. 1736. p. 26. n. 86. *Papilio apiformis*, ab domine nigricante.

Habitat - - -

DESCR. Figura, magnitudo & facies omnino apis. *Antennæ* nigræ, breves, pectinate. *Alæ* & totum corpus e fusce umbrosa. *Pedes* spinosi.

818. PHALÆNA pectinicornis; alis planiusculis rotundatis nebulofis lutescentibus: inferioribus linea longitudinali albida.

Habitat Upsaliæ rario.

DESCR. Antennæ lanceolato-pectinatae, fuscæ. Alæ rotundatae, cinereæ nebulosæ, utrinque maculis obsolete testaceis seu luteis temere adspersæ, & alæ inferiores subtus linea albicante longitudinali bis fere interrupta notatae.

819. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis deflexis albidis diaphanis: vasis obscuris.

Mouff. lat. p. 183. f. 10. Vinula.

Aldr. inf. p. 268. f. 1. 3. 6. 7. 8.

Mer. europ. 3. p. 59. t. 39. gallice. t. 140.

Gæd. belg. 3. p. 4. t. C.

1. p. 121. t. 65.

2. p. 158. t. 37.

Lift. gæd. p. 59. t. 20. n. 6. c.

Ab. inf. t. 11. f. 15.

Frisch. germ. 6. p. 18. t. 8. Eruca cauda furcata.

Reaum. gall. 2. t. 21.

Raj. inf. 153. n. 5. Phalaena major pulcherrima, alis amplis: exterioribus cinereis mactulis & lineis nigris eleganter depictis.

n. 3. Eruca bicauda elegantissima, vinula dicta.

Vulgo Vinula.

Habitat in Salice, Quercu, Populo, præsertim nigra 821. LARVA XIV-pus, caput sub scutum retrahere potest, dorso cruce notata.

820. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis deflexis: superioribus fuscis: rivulis albis; inferioribus pureis: punctis sex nigris.

Aldr. inf. 245. t. 246. f. 11. 12.

Mouff. lat. p. 93. n. 18. f. supra.

p. 186. f. 2. Ambulo secundus.

Hoffn. inf. t. 14. f. 11. edit. alt. 3. 4. 9.

Gæd. belg. 1. p. 74. f. 17.

Lift. gæd. p. 219. f. 99.

Blank. belg. p. 57. t. 9. f. A. B. C. Eruca ursina.

germ. p. 44. t. 9. f. C.

Merian.

Merian. eur. 1. p. 2. t. 5. ♂ 160.

Alb. inf. t. 20. f. C. D.

Frisch. germ. 2. p. 38. t. 9. *Eruca ursina*.

Reaum. gall. 1. t. 36. f. 7. 8.

Mus. petrop. 1. p. 711. n. 5. *Phalæna alis superioribus fuscis: lituris flavis, inferioribus rubris: maculis nigris ornata*.

Raj. inf. p. 151. n. 3. *Phalæna major: alis amplis oblongis albicante & fusco coloribus pulchre variegatis, interioribus rutilis cum maculis nigris.*

p. 152. n. 7. *Eruca densius pilosa magna, pilis longis incanis fulvis & nigris varia, cum punctorum albentium lineis annularibus.*

Blank. herb. t. 87. f. 10. ♂ t. 76. f. 3.

Vulgo Ursus.

Habitat in *Lactuca* & adfinibus.

Larva XVI ipsi, hirsutissima, dorso nigro, abdomine lateribusque testaceis: punctorum lateralium longitudinalis ordo seu punctum ad latus singulæ incisuræ album.

821. **PHALÆNA pectinicornis** elinguis; alis deflexis atris; superioribus rivulis flavis; inferioribus rubris; maculis nigris.

Alb. inf. t. XXI.

Reaum. gall. 1. t. 31.

Frisch. germ 10. p. 3. t. 2. *Papilio maculis alarum superiorum albis & nigris, inferiorum aurantio-luteis, abdomine rubro.*

Habitat in *Urtica foliis ovalibus* 773.

DESCR. Priori quodammodo similis, sed minor. *Antennæ setaceæ. Ailes nigrae, superiores rivulis flavis, inferiores rubrae nigris maculis: abdomen a tergo nigrum, lateribus coccineis ordine longitudinali punctorum atroximum, collum cingulum coccineum.*

822. **PHALÆNA pectinicornis** elinguis; alis deflexis albis, pedibus antennisque nigris.

Gæd. belg. 1. p. 25. t. 3. Procul spectabilis.

List. gæd. 202. t. 87.

Merian. eur. 1. p. 11. t. 30. *Salix caprea latifolia*.

Blank. belg. p. 44. t. 8. f. A. B. C. D.

Frisch. germ. 1. p. 22. t. 4. f. bona.

Reaum.

Reaum. gall. I. t. 34. f. 4. s. 6.

Att. upf. 1736. p. 124. n. 58. Papilio alis depressis niveis, antennis pennatis, pedibus annulis nigris. Habitat in Salice 812, quam quotannis devastat. item in Populo alba 820.

Larva XVIpus, nigra, verrucis fuscis, pilosis, maculae IX duplicate, longitudinales, flavicantes; mutata 1740: VI. 21-VII: 4. Phalæna est elinguis, nivea, antennis nigris, pedibus nigris; annulis albis. Maris antennæ pectinatae utrinque; Fama hinc tantum.

823. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis deflexis albidis: punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum.

Gæd. belg. I. p. 63. t. 23. Lubricipeda.

List. gæd. 210. t. 93.

Frisch. germ. 3. p. 22. t. 8.

Merian. eur. I. p. 16. t. 46. f. 65.

Alb. inf. t. 21. f. 30.

Reaum gall. 2. t. 1. f. 7-9.

Att. upf. 1736. p. 124. n. 59. Papilio alis depressis albis, punctis nigris, ventre quinque punctorum.

Habitat in arboribus pomiferis, Urtica, Atriplice, Quercu.

Mas flavus ordine transverso punctorum nigrorum obliquorum.

824. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis deflexis pallidis: fascia alarum transversali saturatiore.

Gæd. belg. I. p. 36. t. 10.

List. gæd. 204. t. 89.

Raj. inf. 213. Eruca sepiaria gregaria major, pulchre colorata.

Mouff. lat. 188. Neustria major.

Merian. eur. I. p. 12. t. 33.

Blank. belg. 48. t. 8. f. I. K. L. M. Eruca annularis.

Frisch. germ. I. p. 10. t. 2. Eruca annularis.

Reaum. gall. 2. t. A. f. 1-11.

Vulgo Annularia.

Habitat in Pyro, Pruno, reliquisque fructu esculento, praesertim in summis ramulis.

Larva XVIpus, gregaria. ova numeroosa, contigua, in formam annuli deposita, ramos cingentia.

825. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis deflexis griseis: fasciis duabus obliquis albidis inferioribus prominulis.

Frisch. germ. 9. p. 10. t. 8. Papilio erucæ tithymali secundæ.

Habitat in *Tithymalo*.

DESCR. Color totius cervinus s. lutescens in *alis*; *thorax* valde pilosus, ejusdem coloris, sed paullo dilutioris. *Caput* sub *thorace* reconditum. Lineæ s. fasciæ duæ exalbidæ oblique alas notant: ala inferior margine ultra superiorem prominet. *Antennæ* valde pectinatae instar pennæ.

826. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis cinereo-fuscis: lineis lunulisque glaucis: subtus puncto atro.

Act. upf. 1736. p. 25 n. 75. Papilio alis depressis fuscis: fascia pallida longitudinali ramosa, subtus puncto nigro notatis.

Act. holmens. 1742. p. 40. t. 2. f. A. B. C. D. Vermis gramen depascens.

Habitat in pratis, ubi *Gramen*, futuri proventum fœni, depascitur sœpe omne, hinc rusticis notissima per aliquos annos: 1740, 1741, 1742 non sine damno summo totius regni; relinquit plantas, sed omne gramen consumit. fossis capitur, e quibus adscendere nequit; suibus transit in pabulum; a Cornicibus devoratur egregie.

DESCR. Est e Phalænis mediis. *Tota* latis brevis, hirsuta. *Alæ* superiores cinereo-fuscae, quas lineæ aliquot longitudinales glaucæ exarant. ubi haæ striæ ramosæ evadunt, observant lunula grisea cornibus posteriora respiciens; supra hanc lunulam punctum griseum est. *Alæ* haæ subtus cinereo-fuscae, cum puncto nigro in medio: *ala* inferiores pallide griseæ cum fundine versus marginem, & puncto subtus nigro.

827. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis planiusculis: superioribus macula alba anguli ani; fæmina aptera.

Goed. belg. 1. p. 113. t. 59. Antijk peregrinum.

Lift. goed. p. 191. t. 79. fæmina.

Swam. quart. 183. t. 10. mas & fæmina.

Act. upf. 1736. p. 25. n. 74. Papilio alis depressis cinereo fuscis, antennis pectinatis.

Mer. eur. 84.

Raj. inf. 173. n. 24. Phalæna cinerea ventricosa, corpore brevi, alarum expers.

344. Eruca sublutea pilosa, quatuor in medio dorso agminulis seu penicillis pilorum longiorum luteorum, & longo pilorum nigrotum penicillo in cauda.

Reaum. gall. 1. t. 19. f. 12, 13. 17.

Habitat in *Pruno.*

Mas alis gaudet amplis, cinereo nebulosis: *fæmina* alis caret.

MAS antennis fuscis, plumosis. *Ale* superiores supra flavescentes, fuscovenulosæ, in singula ala versus angulum ani macula alba lunulata: *aleæ* subtus lutescentes s. ferrugineæ, uti & *aleæ* inferiores utrinque. *FÆMINA* pectinicornis cinerea, alis vix manifestis, pallidis.

Larva pedibus XVI, hirsuta, fasciulis 4 dorsalis albidis, fastigatis & scopis ad latera solitariis oppositis ut & in cauda unica; scopæ loco antennarum, brachiorum & cœdæ constant pilis apice penicilliformibus longioribus.

828. **PHALÆNA** pectinicornis elinguis; alis deflexis cinereo-undulatis: fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos.

Merian. eur. 47.

Reaum. gall. 1. t. 33. f. 4. 5. 10. 11. 12.

Goed. belg. 3. p. 33. t. 5.

List. goed. p. 191. f. 81.

Raj. inf. 185. n. 7. Phalæna media cinerea, alis oblongis, exterioribus quatuor lineis nigricantibus transversis distinctis.

344. n. 9. Eruca major pulcherrima pilosa e viridi flavicans, quatuor in medio dorso scopolis e flavo albicantibus, cum purpureo penicillo longiore supra caudam.

Habitat in *Pruno Armeniaca dicta, Castanea, Pyro.* DESCR. Larvam sæpe vidi (nondum Phalænam) quæ scopolis 4 in medio dorso flavo-albentibus, & penicillo cœdæ purpureo.

829. **PHALÆNA** pectinicornis elinguis villosissima cinerea; alis exterioribus lineolis obsoletis nigris maculaque duplii pallida.

Mouff. lat. 189. Antennulata.

Merian. eur. t. 18. Taraxacum.

List. goed. 192. t. 80.

Goed.

Goed. Belg. I. p. 84. t. 36. Eruca fasciculata.

Raj. inf. 186. n. 8. Phalæna obsolete cinerea, alas corpori velut circumvolvens, pedes primores longa & densa lanugine hirsutos antrofum longissime porrigenas.

334. Phalæna e cinereo albicans, corpore habitiore, antennis plumosis rubentibus, primores pedes cum sedet protendens & alas corpori velut circumvolvens.

344. Eruca media nigra, longis pilis hirsuta, quinque medio dorso innascentibus pilorum longiorum scopulis: nigro albo & ex luteo viridi coloribus variis.

Habitat in *Leontodonte, Trifolio.*

DESCR. *Larva* pilosa, fasciculis quinque in dorso, ad aures & caudam solitarios.

830. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis cinereis: exterioribus lineis binis oblique transversis albidis.

Aet. upf. 1736. p. 25. n. 65. Papilio alis depressis cinereo testaceis: lineis binis albis obliquis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Hirsutissima est & satis magna. capite & thorace crasso. Alæ deflexæ, griseo-cinereæ, lineis duabus transverso-obliquis albis, ante posticam lineam umbra quasi exalbida. Alæ inferiores nervis 8. crassioribus exaratae sunt, quorum quatuor exteriore puncto crassiusculo in medio fore notatae. Antennæ filiformes, albicantes, subtus vix manifeste pectinatae (quæ fæmina erat) exclusa d. 1. Junii 1742.

LARVA magna, nigra, pedibus XVI, tota hirsuta, dorso pilis rufo-fuscis, reliquis nigris, exuit Latvian die 16 Maji eodem anno.

831. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis glaucis: exterioribus lineis binis oblique transversis flavis.

Habitat

DESCR. Præcedenti dimidio minor. Alæ superiores incubentes, cinereo-glaucæ, fasciis duabus transversis, curribus posteriora versus flexis, flavis. totum corpus griseum seu dilute testaceum. Alæ inferiores ab quo maculis, sed margine prominulo, versus earum basin, quo margine extra superioribus prominent fere ubi in Quercus folio, sed minus manifeste. Antennæ patvae, levissime pectinatae. Mæs erat.

832. PHALÆNA pectinicornis elinguis: Bombyx dicta.

Aldr. inf. 280 - 282. 246. f. 2. 3.

Jonst. inf. t. 22. Papilio Bombyx.

Mouff. lat. 181. *Bombyx*.

Mer. eur. 1. p. 1. t. 1.

Gæd. belg. 1. p. 93. t. 42.

Lift. gæd. 84. f. 32.

Blank. belg. 60. t. 9. f. D. E. F.

Charl. onom. 40. *Papilio Bombycum*.

Alb. angl. t. 12. f. 16.

Bradl. nat. t. 27. f. 1. E. I.

Reaum. gall. 2. t. 5. f. 2.

Triegwald. act. stockb. 1745. p. . . t. .

Vulgo *Bombyx*.

Suecis *Silkesmask*.

Habitat in *Moro*, ex cuius foliis victitat, apud nos tantum colitur.

OBS. Larva caudata est.

833. *PHALÆNA pectinicornis* elinguis; alis cinereo flavoque rufis: margine laceris.

Gæd. belg. 1. p. 155. t. 67. *Libatrix*.

Lift. goed. 81. t. 30.

Att. upf. 1736. p. 25. n. 63. *Papilio* alis depresso erofis croceo-rufis.

Pet. gaz. 29. t. 19. f. 4. *Phalæna fasciata* perelegans extremitate spiralis?

Vulgo *Libatrix*.

Habitat in variis, præsertim in *Glechomate*.

DESCR. Pedes annulis albis plurimi notantur. Alæ incubentes deflexæ, pone erofæ, supra ruffo & fusco varia; linea oblique transversa albida, cum punculo unico albo ad basin & altero in medio. Alæ subtus nebulosæ. Antennæ parum pectinatae, antice versus basin albæ.

834. *PHALÆNA pectinicornis* elinguis; alis angulato-dentatis fulvis: linea dupli fuscis, thorace flavo.

Goed. belg. 2. p. 161. t. 38. *Terribilis* an?

Raj. inf. 296. n. 21. *Eruca geometra* rubescens terres bacilliformis, cum dupli tuberculo insigni in medio dorso & tribus inferioribus existantibus annulis e tuberculis compositis.

Habitat in *Alno* 775 & cuius foliis pascitur.

DESCR. Larvæ facies adeo exacte refert ramulum *Alni*, præcedentis f. penultiimi anni, ut vix natura quid magis simile unquam effinxerit; crassitie, figura, colore, tuberculis, scabritie, omnibus est enim

lon-

longitudo Larvæ 3 ad 4 digitorum transversorum, crassities fere penne minoris anserinae; color cinereo-griseus; pedes 10: quorum 6 antecedentes prope caput, breves; 2 in cauda; 2 paulo ante pedes ani. versus caudam sensim incrassatur animal, versus caput, quod mirum, attenuatur. Lævis est, variis tuberculis vestigia petiolorum referentibus, ut, qui viderit alni ramulum, non opus habeat descriptione.

Phalæna ipsa prodiit post mensem, magnitudine Bombylium excedens: thorace hirsuto, flavo; abdomen incarnato; alis omnibus angularis, sive erosis fulvis: superioribus lineis duabus obsoletæ fuscis, remotis; inferioribus supra etiam subtus fulvis; sed punctis fuscis, obsoletis, temere sparsis cum macula lunati fusca in medio, & punctis nigris in margine alarum omnium. Os nullum. Antennæ barbatæ: rachi albida villis incarnatis.

Gæd. belg. 2. t. 34. in multis à nostra differt, licet in paucis conveniat, proprius accedit ad Gæd. belg. 2. t. 38. sed hujus alæ inferiores carent fascia ista transversa.

835. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis planiusculis cinereis: singulis ocello fasciaque fusca,
De Geer.

Jonst. inf. t. 8. f. 7.

Reaum. gall. 1. t. 49. f. 7.

Mouff. lat. 20. Phalæna tertia.

Raj. inf. 146. Phalæna major pulchra, maculis ophthalmoidibus in singulis alis singulis.

147. *Eruca viridis rarius pilosa, fulvis s. rubentibus in medio annulis, geranicola* Mouffet.
180.

Pet. gaz. 53. t. 33. f. 12. Phalæna nigrescens, maculis majoribus, subtus flavescens.

Habitat in *Rosa* & *Rubo* in Finspång Ostrogothiæ.

De Geer; ad Staffund Uplandiæ. *B. Kallenberg.*

DESCR. Corpus crassiusculum. Antennæ pectinate lanceolata citerea, late: Alæ omnes luteo ferrugineoque variae, singulae utrinque in medio ocello magno nigro cum annulo griseo eique inducta lineola alba. Infra ocellos fascia grisea fusca linearis undulata versus marginem posticum. *Pulchella avis* & majuscula.

836. PHALÆNA pectinicornis elinguis; alis deflexis griseis: macula duplii albido-flavescente geminata. *De Geer.*

Merian. eur. t. 9.

Goed. belg. 1. p. 116. t. 61. Cæruleo-cephalus.

Lift. goed. 121. t. 47.

Frisch. germ. 10. p. 5. t. 3. f. 4. Eruca cæruleo viridis: striis luteis.

R 2

Re-

Reaum. gall. I. t. 18. f. 7. 8. 9.
Raj. inf. 163. n. 17. Phalæna media habitior, alis exterioribus pullis, duabus tribusque maculis albis, & duobus circellis compositis contiguis notatis.
 Habitat in *Pyro*, *Cratægo*, ad finibus.

* * * *Antennæ pectinatis, Lingua spirali.*

837. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis; alis subdeflexis margine rubro: superioribus fulvis lunula fusca, inferioribus fuscis.

Rob. ic. t. 30. f. 1.

Act. upf. 1736. p. 23. n. 41. Papilio alis planis fulvis: macula rubente.

Raj. inf. 228. n. 75. Phalæna minor, corpore crasso & fuscō & rubro diversicolore, alis exterioribus obscure rufis s. pullis: duabus maculis nigris notatis, interioribus & pullo & rubro variis.

Habitat in Gramine.

DESCR. Antennæ pectinate (in femina minus) rachi coccinea, radiis fuscis. *corpus* pilosum crinibus flavis. *Abdomen* inter pedes rubrum. *Alæ superiores* extus luteæ (in mare flavae, in femina fulva), in medio alæ extus lunula ferruginea seu fulva in macula fusca; subtus fuscō-nebulosæ. *Inferiores Alæ* extus cinereæ, macula in medio fusca, oblonga, & arcu intra marginem fuscō; ergo alæ inferiores extus minimæ alis superioribus a latere interiore. Alæ inferiores subtus pallidæ macula in medio obscura. omnes alas cingit margo e pilis coccineis.

838. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis viridi-cærulea nitens; alis inferioribus fuscis.

Habitat Upsaliæ in Lilieholmen loco campestri d. 3 Junii frequens.

DESCR. Magnitudo Tabani majoris. Color viridi-cæruleus, nitens in alis superioribus supra & toto abdome; at alæ inferiores utrinque & superiores subtus fuscæ.

839. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis; alis planiusculis rotundatis: supra fuscis: antrosum albis.

Habitat in Pratis.

DESCR. Magnitudo media. Antennæ magnæ, nigrae. Alæ omnes supra fuscæ, margine albæ, & versus basin e medio albæ. subtus omnes cinnereo punctatae lineolis undulatis duabus griseis; superiores subtus macula una alterave albicante magna.

840. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis; alis planiusculis angulatis flavis fuscō-nebulosis. *Act.*

Act. upf. 1736. p. 24. n. 48. *Papilio alis planis pal-*
lidis angulatis.
Alb. angl. t. 42. f. 69.
t. 95. f. C, D. varietas vel sexus.
Habitat in Roßagia.

841. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis; tentaculis
 setaceis longitudine antennarum, alis planiusculis
 albidis. *De Geer.*

Habitat

DESCR. *Alæ* planiusculæ, albide; *Phalæna* mediæ magnitudinis: *tenta-*
cula in hac una unica adsunt inter omnes a me vias.

* * * * *Antennis pectinicornibus alis planis sedentes.*

842. PHALÆNA subfeticornis spirilinguis; alis patentibus dentatis: fasciis cupreo-cinereis.

Habitat

DESCR. *Alæ* omnes pone, præsertim inferiores, ipsa substantia (nec
 pilis) dentata, supra fascia ad basin, & lata in medio cupro-cinerea
 in superficie cinerea.

843. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis; alis patentibus cinereis: fasciis duabus fuscis.

Habitat in Umbrosis.

DESCR. *Alæ* superiores cinereæ, fascia ad basin fusca, parva, & alia
 in medio magna, undulata; tota superficies, si lente inspicatur, pun-
 gatis albis adsperrgitur; rachis antennarum alba est: *inferiores alæ* pallida
 fascia unica in medio obsoleta; subtus hæc ala puncto nigro obsoleto
 gaudet in medio, *abdomen* cinerascens.

844. PHALÆNA subpectinicornis spirilinguis; alis patentibus: fasciis albidis fuscisque variis.

Habitat in Pinetis, pini foliis victitans.

DESCR. *Alæ* cinerascentes, fasciis nebuloſis, obscurioribus & albidi-
 cinereis, variis in diversis individuis, ut distinctæ fasciæ vix determinari
 possint; *Inferiores alæ* canæ, excepto postico margine: puncta nigra,
 oblonga marginem tenuiorem cingunt in utraque ala; subtus alæ ci-
 nereæ cum puncto nigro in singulæ medio. Pedes cinerei albis maculis.
Antennæ corpore diuidio breviores tenues, & vix manifeste pectinatæ,
 cinereæ. *Abdomen* albidum immaculatum. *Rostrum* spirale flavum. cha-
 racter nigricans in medio alæ superioris.

845. PHALÆNA pectinicornis spirilinguis; alis patentibus albidis: lineolis quatuor nigris transversis marginalibus.

Act. upf. 1736. *p.* 23. *n.* 44. *Papilio alis planis albidis*, fasciis linearibus nigricantibus.

Gœd. belg. 1. *p.* 23. *t.* 35. *Sompolentus.*

List. goed. 38. *t.* 12.

Pet. mus. 3. *n.* 4. *Phalæna hortensis media cinerea*, maculis fuscis notata.

Raj. inf. 179. *Phalæna minor*, alis amplis e cinereo albicantibus, interdum fusco cinereis, quatuor in exteriorum margine maculis linearibus e rufo nigricantibus.

Frisch. germ. 3. *p.* 15. *t.* 3. *f.* 1. *Eruca spithametra viridi-lutea* maculis nigris.

Merian. eur. *t.* 25.

Vulgo W. littera.

Habitat in *Ribe baccis rubris* 197 & *Grossularia spinosa* 195 *Larva geometra.*

DESCR. *Antennæ* albidae, parum plumosæ. *Alæ* planæ, supra cinereo albide; majores margine exteriore notatae lineolis quatuor transversis nigris, quartum secunda reliquis longior, quarta vero latior. *Alæ* subitus subgriseæ sunt. *Mas* antennæ pectinatis; *fæmina* omnino setaceis, nec ullo modo pectinatis, sed tantummodo setatis etiam lente inspecta observatur.

* * * * * *Antennis simplicissimis, Lingua spirali;*
Alis planis sedentes patentibus.

846. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus albo fuscoque nebulosis, ano flava.

Gœd. belg. 2. *p.* 37. *f.* 13.

List. goed. *p.* 156. *f.* 61.

Alb. inf. *t.* XXXVII. *f.* 60.

Reaum. gall. 1. *t.* 49. *f.* 18. 19.

Pet. gaz. 51. *t.* 32. *f.* 8. *Phalæna minor alba*, maculis nigrescentibus ornata.

Raj. inf. 222. *Phalæna minor*; alis oblongis ex albo & cæruleo nigricante variis, ad exortum flavis.

Habitat in omnibus Pomiferis, Drupiferisque arboribus, uti in *Pyro*, *Malo*, *Ceraso*, folia & flores devastans, integrosque hortos fructu spoliens.

LARVA fumo ex arbore abigitur, descendit per fila tenuia, mox iterum ascendet per corticem arboris, ni visco sit oblinitus, vel a gallinis admisis decretur. Circa Solstitium aestivum descendit & evanescit, in Pupam transitura.

847. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis patentibus supra fuscis pone subtusque flavescentibus.

Hoffn. inf. 4. t. 11. f. 3.

Habitat in pascuis Oestunæ Uplandiæ. *D. Leche.*

DESCR. Facies papilionis 787. *Corpus nigricans. Alæ superiores fuscæ & tristi colore, pone versus imaginem quasi fusco flavescente obsoletæ; macula in medio versus marginem crassiorem una alterave magis obscura. Alæ omnes subtus flavescentes fasciis obsoletis concrescentibus & puncto magno lunari atro in alis superioribus, fere in medio.*

848. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis patentibus canis: fascis cinereis duabus tribusve puncto que nigro.

Habitat in Pratis arboribus consitis.

DESCR. Magnitudo tabani. *Alæ superiores canæ fasciis duabus vel tribus latis æqualibus transversis subcinereis. alæ inferiores canæ versus posticum marginem magis cinereæ. Alæ omnes subtus coloris accipitrini s. cinerei: cum tintura rufescens coloris vix manifesti; punctum nigricans in alis exterioribus utrinque conspicuum. Maris antennæ pectinatae sunt; Fæminæ vero setaceæ uti præcedentis.*

849. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis patentibus albis: maculis inæqualibus nigris plurimis.

Mouff. angl. p. 905.

lat. p. 96. n. 10.

Jonst. inf. p. 89. n. 10. t. 6.

Mer. eur. 1. p. 11. t. 29. (male antennis clavatis.)

Gæd. belg. 1. p. 101. t. 31.

Lift. gæd. p. 24. f. 9.

Blank. belg. p. 41. t. 7. f. E. F. G. H. Geometra.

Frisch. germ. 3. p. 14. t. 2. Spithometra nigro luteo-que maculata.

Pet. mus. 3. n. 4. Phalæna hortensis alba, maculis plurimis nigris insignita.

p. 4. n. 7. Eruca geometrica, pulchre variegata, grossulariis depascens.

Raj. inf. 178. n. 14. Phalæna media, alis amplis albis, maculis crebris nigris & lineis transversis luteis variis.

179. Eruca geometra grossularia majuscula alba rubro & nigro coloribus varia.

373. n. 1. Eruca geometra grossulariam depascens.

Habitat in *Ribes* Speciebus, *Amygdalo*, *Salice*, *Pru-*
no spinosa.

Larva Xpus.

850. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis patentibus
rotundatis niveis: atomis cineralcentibus sparsis.

Habitat in *Lucis*.

DESCR. E majusculis hujus ordinis. Tota nivea, supra. Alæ pulvere vix
conspicuo cinerafcente adspersa. Oculi nigri; Femora primaria nigricantia.

851. PHALÆNA feticornis; alis patentibus albis: omni-
bus nebuloso-reticulatis glabris.

Act. upf. 1736. p. 24. n. 52. Papilio alis planis nitidis
albis: omnibus reticulatis.

Raj. inf. 227. n. 87. Phalæna minor piscinas & sta-
gna frequentans, alis utrisque albo & fusco s. nigri-
cante colore variis?

* Habitat in *Lemma*.

DESCR. Alæ omnes reticulatae sunt, reticulo duplice linea nigricante, in-
tra quas color flavescens, sed admodum obsoletus: intra circulos five
campos retis alba omnino sunt alæ. Alæ utroque latere spectatae concolor-
res sunt.

852. PHALÆNA feticornis; alis patentibus albis, pone
fascia marginali; inferioribus nigra: punctis quatu-
or albis.

Reaum. gall. 2. t. 32. f. 13. t. 16. 17.

Habitat in *Lemma*, ex cuius foliis in cylindrum col-
lectis fil nidus pro puppa supra aquas.

DESCR. Magnitudo fere Tabani. Antennæ corpore $\frac{1}{2}$ breiores, articu-
lis singulis ab altero latere albo triangulo pictis, inde hinc visu annulis
albis cinctæ conspicuntur.

Alæ superiores albæ fascia ad marginem posticum fusca in medio glauca;
punctum fuscum in medio alæ. Lineola flexuosa glauca ante fasciam. sub-
tus cinereæ sunt hæ alæ puncto in medio fusco.

Alæ inferiores albæ: fascia ad marginem posticum nigra, lineola longitudi-
nali superincumbente glauca & punctis quatuor albis, in fascia, secun-
dum ejusdem longitudinem; in medio hujus alæ punctum nigrum & ma-
cula nigricans; subtus hæ alæ albidiotes sunt.

853. PHALÆNA feticornis; alis patentibus albis: inferi-
oribus nebuloso-reticulatis glabris.

Læsel. prussic. 178. Eruca nymphææ.

Reaum. gall. 2. t. 32. f. 1. 11. 8. 9.

Act. upf. 1736. p. 24. n. 51. Papilio alis planis nitidis
albis, inferioribus reticulatis. Habi-

Habitat in *Potamogetone foliis natantibus* 139.
DESCR. Est hæc præcedente duplo major.

854. PHALÆNA seticornis; alis patentibus cinereis: fasciis linearibus fuscis, punctoque nigro.

Habitat in Aquolis.

DESCR. Magnitudo Tabani. Alæ albo-cinereæ fasciis angustis, undulatis & punto in mediis alis nigro, tam supra quam infra.

OBS. Nescio adhuc utrum os lingua spirali instruatur, nec ne.

855. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus albidis obsolete fusco-undulatis nitidis.

Act. upf. 1736. p. 24. n. 50. Papilio alis planis nitidis albidis: fasciis undulatis.

Ream. gall. 2. t. 19. f. 1-5.

Habitat in Urtica.

856. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus fasciis tribus griseis, punctoque nigricante.

Act. upf. 1736. p. 24. n. 47. Papilio alis planis griseis, fascia pallida.

Habitat

DESCR. Alæ superiores plano-patentes, flavæ, nitiduscule, fasciis tribus griseis: quarum prima ad basin, secunda spatio remota, angusta: tertia magis remota, latior, pars undulata. Alæ inferiores albo-flavescentes: singulæ alæ subtus in medio punto nigro notatae: antennæ setæ crassioris instar equinæ, pedum priorum palme albo fuscoque variae, magnitudo mediocris: in alis superioribus inter fascias duas posteriores punctum nigrum; pars postica alarum superiorum immaculata flavescens.

857. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus viridibus.

Habitat in Ostrogothia.

858. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus flavescente - niveis fasciisque linearibus nigris.

Habitat in pratis & Gramine.

DESCR. Alæ omnes concolores, tam supra quam infra niveæ cum tinctura flavescente; nervi nigri ramosi; in superioribus linea transversa nigra, dein similis præcedente cum hamo; tum parum arcuata, demum ex duplice arcu. inferiores lineola transversa, dein parum arcuata, tum ex duplice arcu. margines omnes postici albi dentibus nigris.

859. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus albidis: fascia lata nebula fusa interius & notata.

Mer.

*Mer. eur. t. 120.**Gæd. belg. 3. p. 17. t. K.**Lift. gæd. 39. t. 13.**Vulgo Omicron - ypsilon.**Habitat in Propæolo.*

DESCR. *Antennæ* setaceæ, minus barbatæ. *Lingua spiralis.* *Alæ* supra cinerascentes, nitidæ: exteriore basi fusca macula, in medio ad marginem majorem macula magna, fusca, versus apicem macula minori fusca. *Abdominis* segmenta singula a tergo duobus punctis nigris: margo alarum exteriorum posticus lineola e punctis binatis constructa notatur. punctum nigrum sub singula ala. *Pedes & tibiæ* primores nigricantes albis punctis. *Vel alia accuratior descriptio:* *Corpus* albidum. *abdomen* a tergo duplice ordine punctorum nigrorum. *Alæ* superiores supra albescentes aut albæ, basi obsolete nigricantes aut nigræ. *Fascia* in medio lata inæqualis nebulosa versus corpus omicro-ypsilo notata, corniculis corpus versus respicientibus apicem macula e duplice puncto nigricante.

Alæ inferiores supra albescentes linea transversa cinerea repente. *Alæ* omnes subtus pallidæ, introrsum pallidiores linea e punctis albidis cinetæ punctum nigrum in singula ala subtus. *Mas* albidior est fæminæ.

860. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus albis: margine undique interrupte fuscis.

Act. upf. 1736. p. 23. n. 37. Papilio alis planis albis, maculis fuscis inæqualibus marginalibus.

Habitat.

DESCR. *Alæ* albæ margine postico fusco lato inæquali; fasciæ margine exteriore macula longa versus basin, breviore in medio; versus apicem occurrat macula marginis postici.

861. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus nigro-nebulosis: fasciis duabus albis.

Act. upf. 1736. p. 24. n. 46. Papilio alis planis cinereis, fasciis albis punctatis.

Habitat.

DESCR. Alis sedet planis; *alæ* versus basin nigro-nebulosæ, dein fascia undulata alba, angusta, hinc nigricante nebulosa latiore, tum alba minore præcedente, majore autem insequente alba, punctis quibusdam nigris notata; ultimo fascia nigricans punctis albis. *Antennæ* nigræ. *pedes* albidæ.

862. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus: fascia duplice alba, duplique nigra alterna.

Act. upf. 1736. p. 23. n. 45. Papilio alis planis albidis, fasciis latis cinereis.

Habitat.

DESCR. Facies præcedentis. *Alæ* versus basin nigricantes: mox fascia lata alba, dein fascia lata nigra, ultimo fascia lata alba.

863. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus cinereo-maculatis.
Act. upf. 1736. p. 23. n. 43. Papilio alis planis virescentibus cinereo-maculatis.
Alb. angl. t. 50. f. 86.
Habitat - - -
DESCR. Hæc colore virescente superbit, & unica insuper mæcula versus alarum apices.
864. PHALÆNA seticornis spirilinguis tota atra, alis erectis apice albis.
Act. upf. 1736. p. 23. n. 35. Papilio alis planis nigris: apicibus albis.
Habitat in *Pascuis* mense Junio & Julio frequens.
DESCR. Est e minoribus. Tota atra, exceptis summis apicibus alarum exteriorum margine albis; dum sedet alas erectas, uti *Papiliones* diurni, tenet.
865. PHALÆNA seticornis spirilinguis tota nivea.
Act. upf. 1736. p. 24. n. 39. Papilio alis planis albis.
Habitat in pratis mense junio.
DESCR. Tabano primo paullo major, omnibus suis partibus nivea.
866. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus; fascia dupli fusca albaque alternis.
Frisch. germ. 15. p. 35. t. 14. Papilio erucæ spithame træ lineis utrinque tribus.
Habitat in *Pruno*.
867. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentibus, erucæ viridis bacilliformis.
Frisch. germ. 7. p. 27. t. 19. Papilio erucæ spithame træ luteo-viridis erectæ stantis.
Habitat in *Pruno*.
868. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis patentissimis linearibus ramosis; exterioribus bipartitis; inferioribus tripartitis.
Reaum. gall. I. t. 20. f. 1. 2.
? *Frisch. germ.* 3. p. 20. t. 10. Papilio erucæ florum caprifoli?
Raj. inf. p. 205. n. 101. Phalæna minima, alis amplis,

plis rigidis, membrana connectente facile disrupta a se invicem disjunctis.

Act. upf. 1736. p. 26, n. 87. Papilio alis ramosis.

Habitat in *Lonicera (Xylosteo)*, in insula upsalensi Lielieholmen.

* * * * * *Alis simplicissimis, Lingua spirali;*
nec alis planis sedentes nec fronte prominulae.

869. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis superioribus fuscis: linea punctisque duobus rubris; inferioribus rubris. *It. oel. 120.*

Mouff. lat. p. 98. n. 3. t. 97. f. inter tres infimas superma. & p. 183 flavescentia superior.

Jonst. ins. t. 7. ord. 3. Phalæna minima pratensis 2.

Charl. onom. p. 53. Eruca Jacobæa.

Rob. icon. t. 20.

Alb. inf. t. XXXIV. f. H. G.

Mer. eur. 3. p. 56. f. 28.

Goed. belg. I. p. 56. t. 9.

List. goed. p. 134. f. 54.

Blank. belg. II. t. I. f. G. H. I. K. Eruca arenaria.
germ. 9. t. I. f. I. K.

Reaum. gall. I. t. 17. f. 4. 5. 6. 7.

Pet. gaz. p. 52. t. 33. f. 6. Phalæna umbrica, linea maculisque sanguineis.

Raj. inf. 168. n. 26. Phalæna media, alis exterioribus colore nigro & sanguineo variis, extimo duntaxat margine nigro.

Derrham. physico-theol. I. 8. c. 6. n. 6. Papilio Jacobæa.

Habitat in Senecione 668, Jacobæa 690, minus frequens apud nos, quam in Dunis Belgicis.

DESCR. *Corpus nigrum. Antennæ setaceæ, rostra duo spiralia minima. Ala nigra; superior margine longitudinali linea rubra, macula rubra ad apicem & alia macula ad marginem interiorem; ala inferior rubra margine crassiore nigra.*

870. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis incumbentibus: exterioribus cæsiis nebulosis; inferioribus luteis, fascia atra marginali.

Hoffn.

Hoffn. inf. t. 15. f. 18.

Goed. Belg. I. p. 71. f. 14. *Noctua*.

List. goed. p. 114. f. 41.

Blank. Belg. 35. t. 6. f. D. E. F.

germ. 28. t. 6. f. D. E. F.

Alb. inf. 72. f. C. D.

Mer. pin. 198. *Papilio major*, cum exterioribus alis fuscis, internis aureis nigra linea fimbriatis.

Mer. eur. t. 49. *Papilio major*, alis praelongis:

exterioribus vel rufis vel ex cinereo nigris maculis; interioribus fulvis cum fascia lata nigra prope innum marginem.

Frisch. germ. 10. p. 17. t. 15. f. 4.

Reaum. gall. I. t. 14. f. 8. 9. 6. 7. 8. 10.

I. t. 41. f. 11.

Aet. upf. 1736. p. 124. n. 60. *Papilio* alis depresso griseis, obscure maculatis, inferioribus flavis, margine nigro.

Habitat in *Thlaspi Bursa pastoris* 532 in *Senecione*, *Auricula urſi*, *Primula*, *Cheirantho*, variis.

871. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis incumbentibus griseis: albo fulvoque reticulato maculatis.

Goed. Belg. I. p. 126. t. 68.

List. goed. p. 136. f. 55.

Habitat in *Sambuco*; volitantes copiose Upsaliæ ad Sandwicks Kiållan juxta viam vidi 1742. Junio XI.

DESCR. Magnitudo majoris muscae. alis plano-deflexis, fuscis, variis rotundis & ferrugineo-fulvis maculis undique adspersis.

872. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis ferrugineo-cinereis: maculis alba flavaque, anno barbato ferrugineo.

Raj. inf. 165. n. 20. *Phalæna media*, corpore brevi crasso, alis exterioribus e pulvereo rubentibus, maculis nigris variis?

Frisch. germ. 7. p. 29. t. 21. *Papilio crucæ atriplicinæ* nigræ linea laterali lutea?

Smolandis Alkepiesk.

Habi-

Habitat in *Urtica*, *Spinacia*, *Atriplice*, frequens æstatae in domibus lucentibus candelis seipsam cremans.
 DESCR. Alæ pone lineola alba: maculae due obsoletæ: anterior alba, posterior flava. *Anus* amplissimus, 3 valvis monstruosissimus, barba ruffa testus. Alæ superiores ferrugineo-nigræ, maculis & lineolis obsoletis albidis. Alæ subtus pallida puncto nigricante in medio.

873. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis deflexis: exterioribus fuscis, lambda græco inscriptis.

Reaum. gall. 2. t. 26. & t. 27. f. 4. 5. tom. I. t. 19. f. 2.

Frisch. germ. I. 5. p. 37. t. 15.

Blank. belg. 54. t. 8. f. N. O. P. Geometra secundus.

Pet. gaz. t. 64. f. 6. Phalæna lambda.

Goed. belg. 2. p. 82. t. 21. Philopson.

List. goed. 41. f. 14.

Merian. eur. t. 82.

Raj. inf. 163. n. 16. Phalæna e mediis minuscula, alis exterioribus cinereo & nigro colore variis, media parte linea alba γ literam aliquatenus referente, notatis.

Att. upf. 1736. p. 25. n. 68. Papilio alis depresso litera γ aurea inscriptis.

Vulgo γ. Gamma aureum.

Habitat in *Artemisia Abrotanum dicta*, *Lactuca*, *Borragine*.

DESCR. Alæ fuso-nebulosæ, pulchre variegatae, litera γ vel λ notatae; singula littera in singula ala superiore. alæ inferiores fuscae: linguæ longissimæ sunt.

Variat alatum γ argenteo & aureo colore, forte inde sexu.

Frisch. figura differt situ litteræ γ, cuius crura duo respiciunt marginem exteriorem, in nostra contra ac ille pingit.

874. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis depresso cinereis macula obsoleta: subtus C obscuro, inferioribus albidis.

Habitat in Hortis frequens.

DESCR. Mediae magnitudinis. Alæ superiores supra cinereæ, macula laterali obsoleta ovata & transversim undulatis lineis. Alæ inferiores supra ferre niveæ. Alæ omnes subtus cinerascentes arcu magno obsoleto fusco literam C mentiente. Thorax antice griseus.

875. PHALÆNA feticornis spirilinguis; alis deflexis nebulosis: fascia una alterave aurea. Mer.

Mer. eur. v. I. p. 14. t. 39.

Raj. inf. 182. *Phalæna media*, alis exterioribus dupli area transversa viridi - aurata serici instar splendente insignibus.

Habitat in *Mentha*, volitando mel florum haurit.

DESCR. Magnitudo media. *Caput*, *thoracis* antica pars & *antennæ* exalbito-flavescens. *Alæ superiores* nebulosæ, versus marginem posticum cincteo-obsoletæ, dein fascia pallido-aurata, tum nebulosæ sunt alæ cum tintura aurea, quæ quasi alteram fasciam auram constituit; denum nebuloso cinerafcentes ad basin alæ. *Alæ superiores* subtus fuscæ, ad marginem postice griseæ; *Alæ inferiores* supra fuscescentes & eadem infra subgriseæ cum arcu nigricante reflevo & puncto lunulato.

876. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis depresso-fuscis: linea utrinque ferruginea, humeris gibbis, fasciculoque medii dorsi.

Habitat in *Humulo*.

DESCR. *Phalæna* e majusculis s. *Gammæ* 873 par; *Alæ* supra fuso-nebulosæ: *superiores* ad basin lineola curva subferruginea (ante hanc pallidior alia) transversa, & alia ferruginea transversa versus apicem. *Alæ subtus* pallidae puncto nigro in medio. *Pedes* anteriores longiores barbatæ. Collare a tergo thoracis prominet & fasciculus pilorum a tergo thoracis cinereus, fasciculus minimus pilorum nigricantium in medio dorsi.

Larva glabra, curva, pone oblique truncata, viridis, humeris triangulo flavo notatis.

877. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis depresso-fuscis: superioribus macula dupli pallida, thoracis apice basique gibbis.

Habitat in *Lactuca*, metamorphosin intra terram subiens.

DESCR. Fasciculus duplex thoracis a tergo: altero ad basin thoracis gibbo, altero ad apicem. *Phalæna* tota fusca est, sed in medio alæ exterioris versus marginem crassiorem due maculae pallide: quartum prior rotunda, posterior reniformis. Linea alba intra marginem posticum duplicitate exiens. *Alæ inferiores* cinereæ. *Annis* barbatus.

Larva livida glabra, subtus pallide incarnata latere linea nigricante subtus.

878. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis ferrugineo cinereis: dupli macula cinerea, thoracis apice basique gibbis.

Habitat *Phalæna* hæc frequens inventa in *Carduo* nutante 655 florente. In hoc *Carduo* florente omni nocte variæ *Phalænæ* in copia colligi possunt.

DESCR. Magnitudo e mediis majuscula. *thorax* basi collari expanso, deinceps fasciculo, tum versus apicem alio fasciculo, denum in initio dorsi aliis fasciculus & ultimo in tertio segmento dorsi parvus fasciculus. *Alæ superiores*

superiores supra canæ macula rotunda & obtuse cordata, canæ, cui adjaet regio ferrugineo cinerea, variis lineolis nigris picta; subtus cinerea; *Alæ inferiores* supra albidae, extrofsum fuscescentes; subtus cinerea puncto & lineola fusca. *Abdomen* ovatum arctum, non barbatum.

879. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis canis; maculis ψ -formibus nigris.

Frisch. germ. 2. p. 13. t. 2. *Eruca* dorso saccato.

Reaum. gall. 1. t. 42. f. 5. 6.

Raj. ins. 350. *Eruca* rarius pilosa, cornu in medio dorso erecto.

Goed. belg. 1. p. 62. t. 22. *Admirabilis*.

List. goed. 209. f. 92.

Vulgo litera ψ Psi.

Habitat in *Armeniaca*, *Malœ*, *Quercu*.

DESCR. Magnitudo media. *Alæ superiores* canæ maculis littera ψ inversi adspersæ. Lineæ nigrae per oculos à rostro utrinque solitaria. *Alæ inferiores* exalbidæ subtus puncto nigro. *Mas* notis ψ manifestioribus, *Femina* vero omnino nigro supra alas superiores distinguitur.

880. PHALÆNA seticornis spirilinguis triangularis; alis deflexis flavis: lineis duabus ferrugineis obliquis.

Act. upsi. 1736. p. 24. n. 49. *Papilio* alis planis pallidis nitidis.

Reaum. gall. 1. t. 16. f. 12, 13, 14.

Habitat in *Brassica*.

DESCR. Tota flava est & mediæ magnitudinis seu Tabani majoris. Tibiae posticæ spinosæ. *Alæ* deflexæ & pone quasi forcipata cauda avis à se invicem distantes apicibus, ac parum plicatæ: lineæ tres obliquæ retrofsum descendunt in ala superiori, quarum prima vix conspicua; secunda ferruginea designans quasi in maculam ferrugineam ante marginem; tertia linea adhuc longior; margino etiam parum fuscescit, subtus alæ omnes lineola obsoleta obliqua notatae, fuscescentes. Lineola unica obliqua in superiori latere alarum inferiorum.

881. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis nigricantibus, collari abdome que fulvis. *De Geer.*

Habitat in *Roslagia*.

OBS. Alæ deflexæ, oblongæ, pone plicatae, reliqua fusca.

882. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis incumbentibus flavis: fasciis duabus griseis obliquis; postica interrupta. Habi-

Habitat in Hortis.

DESCR. Phalæna magnitudine muscæ carnivoræ: *Alæ deflexo-* incum-
bentes, breves, late: superiores pallide flavescentes, fasciis duabus
retrosum spectantibus, fuscō - griseis, quarum postica in medio inter-
rupta. *Pedes* spinosi.

883. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis depressis
fulvis: macula marginali argentea triangulari.

Habitat in Pomariis rarius.

DESCR. Magnitudo muscæ domesticae; *Alæ deflexo-compressæ:* superio-
res supra fulvæ seu tufo-luteæ macula ad marginem exteriorem, fere in
medio, argentea, triangulari, basi marginem obtegente; superiores alæ
subtus fuscæ. Inferiores ale albidae. *Antennæ* corpore dimidio bre-
viore, simplicissimæ. *Lingua* spiralis, brevissima. *Oculi* nigri.

884. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis al-
bidis: superioribus dupli fascia obsolete cinerea.

Habitat in Hortis rarius.

DESCR. Magnitudo minoris muscæ, ad nasutas proxime accedit, sed
alæ magis patulae, tamen omnino deflexæ: color totius albus est, sed
in superioribus alis, quæ nuda sunt, fascia duplex cinerea, imo & ci-
neteries versus alarum apices, quasi fascia tertia dimidiata: thorax regitur
villis longisculpis, qui in gibbum fere elevantur. *Antennæ* filiformes, cinerea.

885. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis
pallide griseis: fascia saturatiore.

Habitat in Hortis.

DESCR. Magnitudo muscæ carnivoræ. *Lingua* brevissimæ. *Alæ sup-
erioræ* griseæ s. flavescentes, fascia in medio versus marginem inter-
iorem spectans, saturate grisea; similis macula ad basin alarum &
parva macula ad marginem exteriorem, versus apicem etiam saturate
grisea; alæ subtus in medio fuscæ. *Alæ inferiores* crassiori margine al-
bescentes. Alæ superiores pone retuse. Affinis antepenultimæ 882.

886. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis deflexis: su-
pra fuscis margine albam lineolam emitte.

Habitat Stockholmiæ inter arbusta.

DESCR. Magnitudo Tabani. *Alæ superiores* supra fuscæ margine cras-
siore albæ, in medio linea seu ramulo posteriora respiciente albo, &
fascia transversa exalbida vetus marginem posteriorem; *ale inferiores*
cinereæ; omnes subtus glaucæ.

* * * *Antennis simplicissimis; lingua spirali; fronte
prominula.*

887. PHALÆNA seticornis spirilinguis; corniculis duo-
bus recurvis basi cristatis, alis plano-incumben-
tibus.

Reaum. gall. i. t. 18. f. 11. 12. 13. 14. 15.

Habitat in Domibus, frequens vere.

DESCR. Figura oblonga, planiuscula: magnitudo muscae carnariae. *Rostrum* spirale. *alæ superiores* nitidæ, cavitatibus longitudinalibus striatae, griseæ, punctis obsoletis minimis sparsis; *alæ inferiores* albæ, nitidæ: omnes pone ad marginem villosæ. *Pedes* spinosi. *antennæ* setiformes, in fronte loco maxillarum prominularum Cornicula duo subulata, parva, acuta, recurva versus antennas, basi verrucosa sive cristata. *Abdomen* subtus utrinque punctis 5 nigris, versus latera sitis, longitudinalibus. *corpus* alias totum alis superioribus concolor. Color alarum parum variat; hinc aliis griseus, aliis glaucus: singulis exterioribus punctis albis cum antecedente nigro.

888. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis; corniculis duobus subulatis recurvis, albis nigricantibus supra alis maculatis.

Habitat in Nemoribus.

DESCR. Minima est, oblonga, nigricans. *alæ superiores* in dorso albidis maculis tribus longitudinalibus nigricantibus. Alæ pone barbatæ nigrae, ad latera fuscæ; maculæ s. fasciæ tres in medio dorsi longitudinaliter dispositæ nigricantes. *cornicula* recurva subulata non cristata.

889. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis; corniculis duobus subulatis recurvis, alis incumbentibus nigro cinereoque nebulofisis.

Habitat in truncis *Populi tremulae* 819, cujus foliis larva vivitat, eaque convolvit.

DESCR. Magnitudo muscae carnariae, antice acuminata, corpore depresso. *alæ superiores* incumbentes, fuscæ canoque nebulosæ, pone punctorum ordine nigro. *cornicula* simplicia recurva; *Antennæ* fere corporis longitudine.

890. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis; alis superioribus pone unguiculo curvo terminatis.

Habitat.

DESCR. Magnitudo muscae majoris. *Antennæ* nigrae, filiformes. *corpus* totum fusco-nigricans; *alæ superioribus* punctis lunulato-linearibus, transversis adspersis; hinc ex albo & nigro quasi undulatæ sunt alæ. apex alarum superiorum sive margo exterior & crassior definit in unguiculum curvum sive arcuatum sursum; margo alarum exteriorum crassior, magis niger lineolis curvis albisque pulchre variegatus.

891. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis nasuta; alis superioribus albis: punctis nigris, inferioribus fuscis.

Albin. inf. t. 60. f. A. B. C.

Merian. eur. 2. p. 2. t. 2. in medio intra folliculum.

p. 43. t. 44. in lana.

gallice t. 52. & 94.

Reaum.

Reaum. gall. 2. t. 12. f. 1-9.

Raj. inf. 196. Phalæna parva, alis longis, lividis s. plumbeis, exterioribus punctis nigris crebris stictois. obsf. (bis in eadem pagina).

Act. upf. 1736. p. 26. n. 81. Papilio alis depressis argenteis nigro punctatis.

Habitat in *Evonymo*, *Ceraso*, *Pruno spinosa*, *Pado*; præsertim in *Evonymo* 133, cuius folia quotannis ita devastat, ut inde Germanis *Spinnelbaum* dicatur arbor ob hujus fila.

DESCR. Extus tota nivea. Alæ superiores extus punctis atris quatuor aut quinque ordinum longitudinaliter digestis. Caput & thorax etiam punctis nigris adspersa. Alæ superiores subtus ut & inferiores utrinque plumbeæ five fusæ. Venter subtus albus supra niger. Os proboscide spirali. Antennæ setaceæ. Alæ convolutæ in formam teretiæculam. Pedes spinosi.

Larva exalbido-flava, pilis rarioribus. caput & annulus corporis primus nigra: ordo punctorum nigrorum in utroque latere ex punctis decem. pedes XVI.

Præ reliquis hæc Larva, quæ maxime gregaria, fila net & inembranas texit albâs, magnas, intraquas habitat.

OBS. Phalænas nasutas voco, quarum maxillæ prominent; corpus his angustum, alæ complicate in semicylindraceum: spiculas communiter in pedibus habent: rostrum spirale: antennæ his setaceæ.

892. PHALÆNA feticornis spirilinguis nasuta nigra, capite niveo, alis pone albidis.

Raj. inf. p. 204. n. 98. Tenia vestivora major, alis oblongis acutis: exterioribus ad scapulas nigricantibus, inferius albentibus; interioribus fuscis five cinereis.

Habitat in *vestimentis*, *pellibus*, *trapeziis* & omnibus a lana vel villis animalium confectis; præsertim delectatur *vestimentis Rhangiferinis Lapponum*.

DESCR. Tota oblonga, angusta, versus apicem alæ elevatae. Caput albitum. Alæ superiores nigrae, sed a medio ad apicem albæ, albedine punctis viæ conspicuis fuscis parum inquinata. Alæ inferiores cinereæ; Corpus & attus nigra. antennæ setaceæ.

Larva facit cucullos cylindraceos e villis, quos radit: hinc hi cuculli gaudent eodem colore ac vestimenta, quæ consumunt; si hæc variegata sunt, fit & cucullus variegatus. incedit cauda elevata, quam tegit cucullus, in quo se recondit terrefacta; cum crescat quotidie crassitie, evadit & quotidie cucullus angustior, hinc a latere dissecatur & lacinia nova ampliatur; hinc si varie coloratas vestes illi objicias, variegatus erit cucullus initio histrio.

893. PHALÆNA feticornis spirilinguis nasuta cinerea, thoracis puncto utrinque albo.

Reaum. gall. 3. t. 20. f. 2. 3.

Habitat in Vestimentis, cuius larva cylindros conficit, iisque se vestit & occultat.

DESCR. Parva est; *Alæ cinereæ*; abdomen, pedes, caput & tota pars inferior albida.

894. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta cana, capite subgriseo, puncto nigro in medio alarum.

Habitat in vestimentis pilosis, quæ corrodit & depilat intra cucullum latitans.

DESCR. Minima est & præcedentibus duabus affinis, noxia & vulgaris.

895. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta viridis.

Frisch. germ. 3. p. 18. t. 8. Papilio viridis erucæ sativæ.

Habitat in Salicibus.

DESCR. Latior est aliis, sed ratione latitudinis admodum brevis & pone obtusa. *alæ superiores* extra dilute virides, nullo autem modo ad cæruleum vergentes, sed albido virides. *maxillæ albidae*, *alæ inferiores* (& superiores subtus) albidae ad plumbeum inclinato colore. venter albus. *pedes* spinosi & tota Phalæna subtus albida. *caput* album.

896. PHALÆNA seticornis spirilinguis; alis incumbentibus griseis: inferiorum margine crassiore albido.

A Et. upf. 1736. p. 25. n. 77. Papilio alis depresso brevissimis testaceis.

Habitat in Rosis 406, ubi legi Propolin.

DESCR. Congeneribus latior est, verum ratione latitudinis admodum brevis & pone obtusa. *Alæ* omnes griseæ seu dilute testaceæ, tam supra, quam infra, ut & totum animal, sed *superiores* alæ lineolis transversis, inæqualibus obscurioribus, vix conspicuïs; *inferiores* Alæ margine crassiore versus basin albido-flavescentes; *alæ superiores* pone emarginatae margine nigricante.

897. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta nigricans: fasciis duabus albis tessellatis.

DESCR. E maximis hujus ordinis hæc est, *tota* nigro-fusca; *fascia* alba, linearis duplex alas superiores transversim secat, quarum altera juxta basin, altera versus alarum apicem; harum singula alba est, sed maculis parvis nigricantibus quasi tessellata.

898. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta grisea nigro-nebulosa.

Habitat in Domibus rariis.

DESCR. Parva, semicylindracea, alis margine superiore villosis; *alæ supra* griseæ sunt, sed nebulosæ colore fusco-nigricante. *pedes* grisei. *oculi* nigri: *nasus* minus prominens. *antennæ* alis breviores, testaceæ, nigrae.

899. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta nigra: lineis argenteis transversis quatuor.

It. gotl. 260. nomen præcedens.

Habitat in monte *Hoburg* Gotlandiae copiose, ubi pulveris volatilis instar terram occupat.

DESCR. Est inter minimas hujus ordinis, oblonga, nigra, semicylindrica. *Caput & Antennæ* albae. *alarum* margo tenuior villis terminatur. *Lineæ* quatuor transversæ argenteæ alas distinguunt, quarum prima medietate retrosum flexa, secunda recta, tertia & quarta medietate antrorum flexa.

900. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta nigra: lineis argenteis transversis tribus.

Act. upf. 1736. p. 26. n. 84. *Papilio* alis depressis oblongis argenteis: lineis tribus transversis aureis: media bifurca.

DESCR. Est inter minimas hujus ordinis, oblonga, nigra, semicylindrica, *alarum* margo tenuior villis terminatur, ut in omnibus hujus ordinis. *Lineæ* tres transversales argenteæ alas distinguunt, ita tamen, ut interjacens nigrum non latius sit lineis argenteis, quarum prima medietate retrosum, ultima antrorum flexa; intermedia vero transversalis, utrinque extremitates versus bifida. Si asservatur *Phalæna* hæc mortua perit nigredo, & ejus loco deauratus prodit color.

901. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta fusca: linea aurea oblique transversali.

DESCR. Differt in paucis admodum a duabus præcedentibus, linea scilicet unica oblique transversali, cuius medium a tergo antrorum fletitur; hinc utrinque diriguntur; linea crura oblique retrosum.

902. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta nigra; alis exterioribus deauratis, antennis corpore longioribus.

Habitat Upsaliae in *Salice*.

DESCR. Magnitudo muscae; tota nigra; antennæ setaceæ corpore longiores; nigra annulis minimis albis. alæ exteriores extrorsum nigrae.

903. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta alba; alis exterioribus linea dupli fusco argentea: pone vago - undulatis.

Habitat in sylvis acerosis.

DESCR. Minima magnitudine culicis, nivea, alis exterioribus ad bafin utrinque lineolis duabus longitudinalibus fusco - argenteis; pone characteribus vagis nigro - argenteis obsoletis notatis.

904. PHALÆNA seticornis spirilinguis nesuta flava planiuscula: lineis quatuor transversis fusco-angenteis.

Habitat in sylvis.

DESCR. Magnitudo musæ; linea 4 transversæ fusco-argenteæ, quam
tertia introrsum bifida; ultima in ipso margine postico alarum.

905. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta cinerea;
alis antice albidis, pone fascia linearis albicante.

Habitat - -

DESCR. Puppæ pallidæ intra rete album, oblongum, tenacissimum,
piures simul.

Phæna nasutis fere major. Pedes spinosi; Alæ longæ, cinereæ ad vi-
ride vergentes, antice versus basin albidæ, quæ albedo pone lincola
nigricante terminatur; fascia albida, linearis, transversa; curva versus
apicem; intra apicem lineola undulata, nigra. Alæ inferiores pallido-
albidæ, margine fusco, terminatae villis longiusculis, albidis, paralle-
lis. Oculi nigri.

906. PHALÆNA seticornis, spirilinguis nasuta atra:
linea alba transversali.

Att. apf. 1736. p. 23. n. 38. Papilio alis planis ni-
gris: linea transversa alba.

DESCR. Est inter minores, precedentibus 903. 904 paulo major; tota atra,
sed linea a ba, minime argentea, angustissima, transversa alas in me-
dio notat.

907. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta albida:
striis longitudinalibus albis punctulo nigro ter-
minatis.

Raj. inf. 229. n. 106. Phæna minor pascuorum
gemina proboscide, alis oblongis, cum sedet cir-
cumvolutis, exterioribus ex argenteo lutescenti-
bus vel argenteis vel plumbeis.

Att. apf. 1736. p. 26. n. 82. Papilio alis depresso-
neiformibus oblongis striatis.

Habitat copiosissima per totam æstatem in lætissi-
mis Pratis roriferisque graminosis, insidens gra-
mini capite semper deorsum spectante; inter o-
mnes in pratis nostris frequentissima.

DESCR. Corpus oblongum, lineare, alis circumvolutis albo-plumbeis
ad argenteum nitorem inclinantibus, cum striis concavis pallidioribus
longitudinalibus, terminatis antequam marginem attingunt alarum; in-
tra harum striarum fines & marginem punctorum nigricantium mini-
morum & vix conspicuorum ordo transversus. Pedes spinosi.

908. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta albida;
linea longitudinali argentea postice ramosa.

Habitat in lætissimis pascuis cum praecedente.

DESCR.

DESCR. A præcedente parum & vix differt; major hæc est, in iisdem tamen locis occurrit, eodem modo sedet & quiescit; ut pro una eadem que facile haberetur, ni sola figura differret. Si alæ probe inspiciantur, quæ alias plumbœ-albæ, in his observatur linea argentea in medio, longitudinalis, pone emittens ramos simplices striarum instar.

909. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis nasuta cinerea, dorso vitta alba.

Habitat in Hortis oleraceis frequens mense Majo in Junium.

DESCR. Magnitudo Culicis; sedet *alis* compressis, oblongis, versus anum altioribus magisque compressis subcinereis; *dorsum* seu alarum complicatarum latus cœlum recipiens est album, vittæ instar longitudinalis utrinque duobus tribusque denticulis instruētæ. *Antennas*, dum sedet, recta antrorsum protendit; volitat juxta terram.

910. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis nasuta fusca: macula utrinque nigra.

Reaum. inf. 2. t. 15. f. 7. 8?

Habitat in sylvis.

911. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis subnasuta nebuloso-fusca; macula duplicato-triangulari dorsali alba.

Habitat in Senticetis & juniperetis frequens Fahlunæ.

DESCR. Parva est, & prateni 907 minor, fusca & quasi simul nebulosa; in medio dorsi duplex macula triangularis alba, seu distinctius macula simplex triangularis alba, cuius apex caudam respicit & basis caput; huic immersa quasi est alia alba triangularis macula ad medium, ut solum basis versus caput conspicatur ac si esset prior prolifera macula.

912. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis nasuta cinerea: puncto utrinque nigro.

Habitat in Hortis.

DESCR. Hæc inter majores nasutas numerari debet. *Alæ* supra canæ parum nebulosæ. Punctum parvum nigrum in medio *alæ* exterioris utrinque. *Alæ* inferiores canescentes non nebulosæ. *Lingua* spiralis brevissima.

913. **PHALÆNA** seticornis spirilinguis nasuta nigricans: lineolis luteis margine albis undulatis.

Habitat in Padò.

DESCR. Magnitudo musæ domesticæ. *Antennæ* nigrae, corpore dimidio breviore. *Alæ* superiores supra nigricantes lineolis undulatis luteis tam copiose pictis, ut quisnam color prævaleat, difficile determinatur; margo alarum crassior pone 5 vel 6 lineolis parvis albis vel argenteis undulatus. *Alæ* inferiores nigricantes margine crassiore latere albo.

914. PHALÆNA seticornis spirilinguis nasuta fusca albi-do-undulata; alis inferioribus fuscis margine albis.
Frisch. germ. 10. p. 11, t. 9.
 Habitat in strobilis *Abietis*, quos perforat, & in iis excluditur primo vere.

DESCR. Est magnitudine Culicis. *Antennæ* corpore paulo breviores. *Lingua* non videtur. *Alæ exteriæ* griseo-fuscæ, lineolis transversis albi-do-argenteis, inaequalibus. *interiore* alæ superne fuscæ margine pone albo & margine laterali exteriore albo: qui duo albi margines non coenunt. *Alæ inferiores* subtus albae; omnes alæ pone villis quasi ciliatæ, qui in superioribus fuscæ, in inferioribus albi: margo alarum superiorum exterius & posterius ater. *nasus* minus quam in reliquis prominet.

* * * *Antennis simplicissimis. Lingua nulla.*

915. PHALÆNA seticornis elinguis, capite bicorni, alis albidis: fasciis marginalibus transversis nigris.
 Habitat in domibus, præsertim *D. Olai Celsii*, trapetzia devastans.

DESCR. Est nasutus major, *alis* patenti-deflexis, *exterioribus* obsolete cinereis; in margine exteriore variis fasciis transversis nigris notato. *Alæ inferiores* cinereo-albidae. *frons* appendiculis duobus reflexis, ut in 887. 888. 889. villosis; apice vix majore conspicuo obtuso erecto (non recurvo & acuto ut in 887) nudo, lœvi, glabro, qua nota a reliquis manifeste distinguitur. *Antennæ* setaceæ.

* * *

916. PHALÆNA seticornis elinguis; capite bicorni, thorace flavo, alis incumbenti-planis griseo-fuscis.
 Habitat in umbellis *Heraclii* 231, cuius umbellas quotannis devastat & involvit sub metamorphosi.

DESCR. Phalæna nocturna alis planis incumbentibus: *thorax* a tergo albicans, pone quasi trilobus; *Caput* albicans, maxillis duabus recurvis erictatis, apice subulatis, nigris, erectis; *subtus* tota albicantis-fusca est.

917. PHALÆNA seticornis elinguis; antennis brevissimis rufis, thorace flavo, alis deflexis.

Aet. upf. 1736. p. 124. n. 57. Papilio alis depresso: supra argenteis, subtus obscuris.

Raj. inf. 157. n. 3. Papilio media alis longis, in fæmina flavis cum lincis rubentibus, in mare albis.
 Habitat in radicibus *Humuli* s. Lupuli, quam valde devastat non sine summo possessoris damne, præsertim Upsaliae in prato Regio frequens sub nocte, minus agilis; observatur i Junii.

DESCR.

DESCR. Phalæna inter nocturnas nostras maximas locum tenet. Oculi nigricantes. Antennæ teretæ, thorace longe breviores hinc brevissimæ. thorax ipse flavus. Abdomen flavo-rubens. Alæ subtus nigricantes sive fuliginosæ. Alæ supra colore maxime differunt sexu.

MARIS enim alæ supra summe niveæ, ut quid albidius me non vidisse meminerim; pedes politi lana grisea valde barbati.

FEMINÆ alæ autem supra flavæ, nunc immaculatæ; nunc duplii obliqua linea, nunc simplici linea obliqua fulva notata, hinc eandem dicere cum *Gæd. belg. 1. p. 47. t. 12. & List. gæd. 195. t. 82.* Nisi antennæ in nostra tam mare, quam fæmina omni barba carerent.

* * * *Lingua non dum examinata.*

918. **PHALÆNA** seticornis; alis incumbentibus: superioribus exteriore margine inferioribus totis flavis.
Act. upf. 1736. p. 25. n. 76.

Habitat Upsaliæ & in Prædio Cronstedtiano, Fullerö, prope Arosiam.

DESCR. Est hæc e minoribus, non autem minimis, oblonga. Alæ exteriore dilute cinereæ, sed margine exteriore secundum totam longitudinem flavo. Alæ inferiores etiam totæ flavæ.

919. **PHALÆNA** seticornis; alis incumbentibus linearibus pilosis.

? *Reaum. inf. 1. t. 12. 13.*

Habitat ad paludes, uti Stockholmiae ad *Brahelund* & Friedrichshof, ubi culicum instar volitat supra aquas circa vesperam.

DESCR. Antennæ feracæ, longæ. Magnitudo & facies culicis vulgarissimæ pungentis. Alæ superiores lineares, inferiores subulatæ, omnes pilis longis hirsutæ: dum alæ clauduntur observatur utrinque ad latera macula alba. Pedes pilosi.

920. **PHALÆNA** alis luteis: punctis minutissimis nigris.
Act. upf. 1736. p. 25. n. 78. Papilio alis depressis luteis; corpore nigra.

Habitat Stockholmiae.

DESCR. Est hæc inter parvas numeranda, magnitudine Tabani majoris. corpus nigrum. Alæ majuscule, luteæ, punctis nigris, æqualibus, distinctis, sparsis.

921. **PHALÆNA** seticornis; alis griseo-fuscis: inferioribus albidis; fæmina aptera.

? *Reaum. gall. 2. t. 30. f. 89.*

Raj. inf. 369. n. 9. Eruca geometra parva pallide seu

seu ex flavo virens, lineolis albicantibus, tum secundum longitudinem, tum transversis.

Habitat in Pyro, Malo, Pruno, Carpino LARVA.

DESCR. Alæ maris amplæ, griseo-fuscæ, fascia transversali vix manifesta dilutiore. Fæminæ alæ admodum parvæ, cinereæ, maculis nigris. Pedes longi, annulis nigris.

LARVA viridis, pedibus 10, linea utrinque laterali, longitudinali, alba, parva; annuo spatio intra puppam latitans antequam excludatur, licet minor musca sit.

922. PHALÆNA albo-virescens: alis planiusculis.

Habitat Upsaliæ.

DESCR. Tota ejusdem coloris inter album & viride medii, magnitudine ad Urticariam 774 facile accedens.

V. HYMENOPTERA.

Tenthredo.

923. TENTHREDO antennis clavatis, atra; segmentis abdominalibus 3. 4. 5 ferrugineis.

Goed. belg. I. p. 119. t. 64.

Lift. goed. 179. f. 77. a.

Frisch. germ. 4. p. 42. t. 25. Eruca salicina viridis, rugis sexaginta duabus.

Habitat in Salice, Alno, Betula.

DESCR. Larvi glabra, viridis, pedibus 28; saepe jacet spiralis cochlear depresso instar. Linea dorsalis longitudinalis nigra, utrinque flava. Tenthredo ipse magnitudine Crabonis niger hirsutus, articulis 3. 4. 5. abdominalibus ferrugineis, reliquis nigris. Femora & tibiae nigrae, palmis flavis. Antennæ clavatae, flavæ, infimo articulo nigro. Alæ venis atro-ferrugineis, margine postico fuscis.

924. TENTHREDO antennis clavatis, atra; abdome ovato, alis ferrugineis.

Att. upf. 1736. p. 29. n. 9. Ichneumon ater, alis testaceis, antennis clavatis.

Habitat in Lapponia Uhmensi & Pithoë in Alno.

DESCR. Magnitudo vulgaris Bombylii, obtusissima; abdumine subrotundo, depresso, villoso, atro, holosericeo. Thorace & capite nigro. Antennæ clavatae, nigrae, articulis sex, obtusissimæ. Alæ ferrugineæ, puncto marginali nigro, oblongo, venis rufis reticulatae.

925. TENTHREDO nigra; artubus ferrugineis; an corniculo cylindrico.

Att.

Act. upsi. 1736. p. 28. n. 1. Ichneumon flavus, ab-domine medio nigro, cauda acuta, aculeo um-bilicali triplici exerto.

Reaum. gall. 6. t. 31. n. 1. 2.

Act. stockb. 1739. t. 3. f. 7.

Habitat passim,

DESCR. Differt hæc manifeste a reliquis omnibus nobis notis specie-bus. 1:0 *Magnitudine*, utpote reliquis duplo major. 2:0 *Ale* pone obruso sed corniculo terminato. 3:0 Insertione nigri *Aculei* in medio ab-dominis subtus. 4:0 Colore: *Caput* nigrum, pone oculos flavum. *Thorax* niger rotus, hirtus, basi utrinque flavescente puncto prominulus. *Ale* ferrugineæ. *Antennæ* corpore dimidio breviores, luteæ, 2: articulorum. *Abdomen* cylindrico-oblongum, incisuris tribus posticis, duabusque pri-mis, luteis; at 3. 4. 5. 6. maxima ex parte nigris; ultimum segmentum obrusum, terminatum corniculo recto, tereti, acuto; abdomen subru-strum, e cuius medio rima versus posteriore fissa, e qua exit aculeus rectus, niger, ano & corniculo abdominalis longior, rigidus, compotitus et tribus setis conjunctis. *Femora* brevia, nigra: *tibiæ* & *palmæ* omnes luteæ.

926. TENTHREDO atra; pedibus ferrugineis: ani api-ce depresso acuto.

Habitat *Stockholmiae*, ubi lectus a L. Klase, Med. Stud.

DESCR. Magnitudine cum præcedenti certat. *Tota atra*. *Thorax* & *Caput* hirsuta: *Abdomen* glabrum, novem articulis; extimus articulus five ani terminatur spina crassa, acuta, depressa, non vero, ut in præce-denti, cylindrica. *Aculeus* triplex incipit sub medio abdominis & pro-tenditur ultra ani spinam. *Ale* subfuscæ. *Antennæ* nigræ, versus ba-sin fuscæ, articuli 20. *femora*, *tibiæ*, *palmæ* ferrugineæ.

Ergo differt a præcedenti colore toto nigro, spina ani difformi; reliqua satis convenienter.

927. TENTHREDO antennis septinodiis, flava; capi-tis vertice thoracisque medio nigris, macula ala-rum ovata.

Habitat in *Salicibus*.

DESCR. *Abdomen* absque petiolo thoraci adnatum, totum flavum. *The-rax* flavus, sed in medio tergi macula magna nigra, & subtus inter pe-des primarios & secundarios macula magna nigra. *Caput* pone oculos nigrum. *Antennæ* fuscæ, 7 articulis, subulatæ. *Ale* incumbentes, mem-branaceæ, reticulatae, cum puncto marginali nigro. *Pedes* flavi, sed pal-mæ posteriores nigricantes,

928. TENTHREDO antennis septinodiis, abdомине flavo: pone nigro.

Frisch. germ. 2. p. 12. t. 1. f. 21. 22. 23. 24.

Habitat frequens in *Pratis Upsaliensibus* mense Mayo.

DESCR. *Ale* incumbentes, nigricantes, diaphanæ. *Abdominis* tres vel quatuor anteriores articuli rufescentes: *Corpus* reliquum nigrum: *pedes* rufi.

929. TENTHREDO antennis septinodiis, corpore flavo, macula alarum longitudinali sternisque nigra.
Aet. upf. 1736. p. 29. n. 14. Ichneumon alis planis luteis: margine exteriore nigris, collari nigro.

Habitat in Hortis & Pratis.

DESCR. Hæc facie & coloribus convenit cum duabus proxime præcedentibus omnino, ut an certo specie differant, hærem, ni diversas in copula diversa conjunctas observassem. Huic *Abdomen* flavum; *Thorax* flavus, in medio tergi & medio sterni niger: *Oculi & caput* pone nigra; *pedes* flavi, sed palvæ omnes articulis nigris. *Antennæ* subulatae, fuscæ, 7 articulis, singulare est, quod punctum marginalis alarum, non ut in præcedenti ovatum sit, sed extensum longitudinaliter cum margine exteriore alæ ad ipsam basin.

930. TENTHREDO flava; alarum macula ferruginea.
 Habitat in pratis vere.

DESCR. Magnitudo formicæ minoris; ventricosa; tota quanta flava, exceptis solis oculis. Alæ flavo-griseæ, in medio macula ferruginea obsoleta.

931. TENTHREDO nigra: pedibus flavis, thoracis characteribus flavis.

Habitat in pratis & sylvis.

DESCR. Caput nigrum, pone duabus lineolis flavis: maxillæ rufo-bidentatae. Thorax niger, apice flavo, laterisque basi tuberculo flavo. Abdomen nigrum, Pedes flavi, sed femori 1. 2. versus basin nigra. Alæ nigro-nitide venis atris: macula marginali ovata, atra. Antennæ setaceæ, articulis plus quam triginta.

932. TENTHREDO atra; antennis undecim - nodiis alis nigro alboque maculatis.

Habitat ad arcem *Drottningholm.* C. Kallenberg.

DESCR. Magnitudo mediocris. Corpus totum, uti ab *abdomen*, thorax, caput, artus nigra. *Antennæ* simplices, undecim articulis. Alæ membranaceæ, venosæ: superiores macula duplice nigra notatae, quarum macula thoraci propior lunulata; altera vero subrotunda est; hanc excipit ad apicem alarum macula alba.

933. TENTHREDO falicina: Larvæ cæruleo-viridis, pectore caudaque fulva.

Frisch. germ. 6. p. 9. t. 4. Ichneumon flavus larvæ viridis nigro punctatae.

Goed. belg. 1. p. 65. t. 18.

Lift. goed. 125. t. 49.

Reaum. gall. 5. t. 11. f. 3.

Habitat in *Salice* tam glabris 812, quam hirsutis foliis 811. (Sælg & Pihl.)

DE

DESCR. *LARVAM* solam vidi, quæ frequens est. Totum *Corpus* cœruleum sive viridi-cœruleum, 9 ordinibus longitudinalibus macularum nigrarum; sed tria segmenta prima corporis, & tria postrema, fulva sunt, tamen nigro punctata. *Caput* nigrum, glabrum: *Pedum* tria paria in fulva pectoris parte, dein 6 paria in parte corporis cœrulea, tum upum par in cauda fulva: summa 20 pedes.

934. TENTHREDO populnea.

Habitat in *Populo tremula* 819. J. Moræus.

DESCR. Tenthredinem non vidi, sed Larvam Fahlunæ. *LARVA* virens capite atro, collo ante pedes & cauda flavescens. Macularum longitudinalium nigrarum 4 ordines e maculis f. punctis XI in singulo late-re cum impari terminatrice. β minores duplicate supra singulos pedes. Pedes secundarii, præter caudæ obliquæ, sex paria. Præcedenti valde si-milis.

935. TENTHREDO antennis septinodiis, nigra; segmen-torum abdominalium marginibus, excepto se-cundo & tertio, flavis.

Blackwell. herb. t. 87. f. 10.

Habitat in *Scrophularia* omni, præcipue in *fætida* 520, quam omni anno devastat in horto academico *Up-saliensi*, & per plurimos retro annos devastavit.

DESCR. *ANIMAL* prodiit prima Junii. *Caput* nigrum. Maxillæ nigrae, dentatae; Oris labium superius flavum, sub singulo oculo lineola flava. *Antennæ* ferruginea sive fulvae, clavatae, septem articulis, excepto infimo. *Thorax* niger a basi ad alas utrinque linea flava. ad latera baseos punctum utrinque flavidum, & sub alæ insertionem macula flava; apex thoracis puncto flavo gemino, altero post alterum ad basin femoris tertii paris macula flava. *abdominis* nigri segmenta 1 4 5 6 7 8 9 lineis flavis terminantur, non vero 2 3, ergo spatium latius inter lineam primam & secundam flavidam tergi; subtus omnia segmenta margine flava sunt. *femora* omnia nigra, sed tibiæ rufæ. *Alæ* subaqueæ, puncto marginali ferrugineo, & margine exteriore alarum majorum ferrugineo. *Facies* & *magnitude* vespa.

PUPPA pedibus instructa jacet intra terræ glebam (ad radices *Scrophulariæ*) excavatam uti *Scarabæi* Puppa, ubi delitescit a præcedenti anno per hyemem in primum Junii.

LARVA nivea, longitudine digitii transversi, crassitie pennæ anserinæ; capite nigro; pedibus 6 & 16 seu 22; tota superna superficie punctis nigris notata, quorum intermedia dorsalia paulo majora.

936. TENTHREDO antennis septinodiis, dorso nigro li-neis pallidis transversis arcuatis recurvis.

Habitat in *Ostrogothia*. Fr. Hasselquist.

DESCR. *Alæ* membranacea: majores margine exteriore nigro puncto que nigro oblongo. *Femora* & *Tibiae* pallide, pone nigra. *Oculi* arri, *Ab-domen* subtus flavidum, a tergo nigrum lineis ad latera retrorsum flexis pal-lidis f. singulo segmento macula magna semicirculari testo, margine postico & lateralí pallido. *Scutelli* apex flavo-albicans infra quæ macula flava &

286 INSECTA. HYMENOPTERA.

ad ejus latera puncta duo minima pallida. *Antennæ* nigrae, septem articulis.

937. TENTHREDO antennis octodecim-nodiis, pedibus ferrugineis: posticis albo nigroque annulatis.

Reaum. gall. 5. t. 14. f. 1. 2. 3. &c.

DESCR. inter parvas est; *Facies* ichneumonis. *Abdomine* lineati, totus ter; sed femora & tibiae & palmæ omnes ferrugineæ, exceptis posticis albo nigroque vatis; *Antennæ* atræ 18 articulis.

Habitat in *Rosarum* foliis.

938. TENTHREDO antennis duodecim-nodiis nigris, abdomine subtus ferrugineo, pedibus flavis, alis immaculatis.

Reaum. gall. 3. t. 46. f. 5. 6. 7. 8. &c. t. 47. f. 1. 4.

Act. upsi. 1736. p. 29. n. 3. Ichneumon bedeguaris.

Blank. belg. 187. t. 16. f. v. x. y. z. mala.

Suecis Sömnontorn.

Habitat in *Rosa* 406, ubi excrescit tuber in modum Lichenis ramosissimi rufi, officinis Bedeguar in *Cotula fastida* 703. gibbus, extimo pollicis articulo similis, produxit eandem.

DESCR. Magnitudo pediculi. *Antennæ* nigrae, testæ, 12 circiter articulis; caput & thorax gibbus, niger. *Abdomen* subovatum, alis brevius, carinatum, subtus ferrugineum, versus anum nigrum. *pedes* ferruginei. *Ala* albæ absque macula marginali singulati.

939. TENTHREDO thorace viridi-æneo; abdomine aureo.

Blank. belg. 188. n. 12. t. 16. quoad descr.

germ. 142. t. 16. f. 5.

Act. nat. cur. ann. 12. obs. 10.

Habitat in *Bedeguar Rosa* 406, licet rarius.

DESCR. Omnia hujus generis pulcherrima, magnitudine minimæ formicæ. *Antennæ* cylindraceæ, nigrae, corpore dimidio breviores. *Thorax* æneo-viridis. *Abdomen* deauratum, ignei coloris. *pedes* incarnati. *aculeus* triplex setæ instar, longitudine corporis, niger, intermedio rubro.

940. TENTHREDO cæruleo-ænea, pedibus pallidis, alis immaculatis.

Frisch. germ. 4. p. 39. t. 22. Ichneumon viridis in *Eruca rubra Salicis.*

Habitat in variis excrescentiis *Salicis* inter alios vermiculos.

DESCR.

DESCR. *Corpus* magnitudine pediculi, totum cæruleum, nitens, absque ulla rubedine abdominis. *Antennæ* corpore dimidio breviores, nigrae. *Pedes*, præsertim versus extremitates &c ad genua, albido-pallidi. *Cauda* acumine setaceo trifido. *Aë* absque ullo puncto marginali, aquææ.

941. TENTHREDO atra, thoracis tergo virescente, pedibus saltatricibus.

Habitat in Salice 804. cuius ramuli terminantur *Rosula imbricata*, magnitudine & figura coni Humuli, intra squamas, dum separantur, in intimo apice unicum sedet insectulum, arcte inclusum, conniventibus numerosis foliolis, quod prodiit a latum Junio ♂.

DESCR. Magnitudo pulicis. *Corpus* totum, pedibus & antennis atrum. *Antennæ* filiformes, apicem versus minime acutiores sunt, tamen corpore dimidio breviores. *abdomen* ovatum, acutum. *pedibus* saltat, licet figura pedum crassiore non gaudeat. *caput* & *thorax* a tergo virescentia sunt.

942. TENTHREDO thorace viridi nitente, abdome fusco: basi cingulo pallido, pedibus flavescentibus.

Habitat in *Salice floribus pentrandris* 712, ubi *Gallæ glabrae* irregulares ramos terminantes intus lamellosæ, inter quarum lamellas jacet hoc insectum; prodit fine Aprilis.

DESCR. Magnitudo vix pulicis. *Caput* & *thorax* nitide viridi-fericea. *abdomen* ovatum, fuscum, basi pallido cingulo cinctum. *pedes* pallidi. *Antennæ* minus pallidæ, corpore breviores.

943. TENTHREDO nigra; femoribus flavis.

Habitat in *Salice floribus pentrandris* 712, ubi *Gallæ nudæ*, irregulares ad ramorum apices excrescentes, & proxime insequente vere, emarcido terminatrici ramulo, terminatrices sunt hæ gallæ magnitudine ovi columbini, duræ, & plane lignosæ, figura pyri exsiccati, quas dum aperio, in earum centro cavitates oblongas, majores, farina grossiore repletas reperio, inque farina hujus Tenthredinis puppam; ad latera vero, quæ ex lamellis constant, alios vermiculos minutissimos observo, qui proxime antecedentes sunt. Ambæ exeunt fine Aprilis.

DESCR. Magnitudo muscae nigrae, alis incumbentibus, nigra. *antennæ* subulatae, corpore breviores, oculo articulis nigris. *Pedes* omnes pallidi. *punctum* marginale nigricans alarum.

944. TENTHREDO atra, tibiis femoribusque albis.
 Habitat in foliis *Padi* 396, quæ subtus edendo cri-
 bri instar perforat.
 DESCR. Antennæ, caput, thorax, abdomen atra. Aëre glaucæ puncto mar-
 ginali ciblongo atro. femora & tibiae albæ, sed palmae, præsertim
 posticæ, nigrae. Antennæ antrotsum exsertæ, vel 8 articulis acuminatae.
945. TENTRHEDO gallæ foliorum Salicis.
Welsch. hecst. 1. p. 128. t. 128. Verrucæ foliorum
Salicis.
Frisch. germ. 4. p. 22. t. 4. Ichneumon foliorum Sa-
licis.
Reaum. gall. 3. t. 37. f. 1 - 5.
 Habitat in *Salicibus* variis, in quartum foliis nodi seu
 gallæ nodosæ intra quas habitat.
946. TENTHREDO gallæ foliorum Fagi.
Frisch. germ. 2. p. 24. t. 5. Ichneumon foliorum ulmi.
 Habitat in *Fago* & *Ulno*.
 DESCR. Aëre corpore longiores, ut in *Phalænis* deflexæ, puncto margi-
 nali terram spectante.
947. TENTHREDO gallæ glabrae foliorum Querci.
Frisch. germ. 2. p. 22. t. 3. f. 5. Ichneumon gallarum
foliorum Querci.
Rhed. ins. p. 115. 157.
Leuwenh. arcan. p. 217.
Blank. belg. 181. t. 16. f. A - H.
Reaum. gall. 3. t. 39. f. 14. 15. 16.
Suec. Gallæples.
 Habitat in *Smolandia*, frequens in foliis *Querci*, præ-
 sertim in fruticibus, ubi a latere terram spectan-
 te plures sæpe Gallæ globose, rubicundæ, gla-
 brae, quæ non indurescunt, in medio larvam con-
 tinentes, ex hac conficiunt cives atramentum. In-
 sectum perfectum non vidi; in *Uplandia* rarer est.
948. TENTHREDO gallæ imbricatae.
 Habitat in *Quercu* ubi fructificatio monstrosa in gal-
 lam imbricatam inæqualem & pedunculatam tran-
 sit, quæ insectum fovet.

949. TENTHREDO gallæ Glechomæ.

Blank. belg. 186. *Hedera terrestris.**Welsch. hectast.* 1. p. 127. t. 127. f. 1. *Strumulæ Chamaecissi.**Reaum. gall.* 3. t. 42. f. 1. 2. 3. 4. 5.Habitat in *Glechoma* 486 ubi globus durus in ipso folio, subhirsutus; insectum tamen non dum vidi.

950. TENTHREDO Hieracii.

Rupp. jen. 163. *Hieracium myophorum.**Chemn. brunsv.* 43. t. 7. *Pulmonaria gallica murem referens.**Valent. virid.* t. 328. f. 1. *Hieracium murorum folio pilosissimo vulgo Pulmonaria gallica.**Heuch. hort. wittenb.* 1. t. 1. *Hieracium myophorum.**Act. upf.* 1723. p. 415. *Hieracium myophorum.*Habitat in *Hieracio (637) murorum* C. B. causans varietatem 637 ß. gallis singularibus, cuius insectum dum haec scripsi non dum visum mihi erat, sed galla faciem muris hirsuti gerit.

OBS. Species hujus antea sub *Ichneumonum* genere militarunt, omnes nunc ob diversissimam metamorphosin & Larvam proprium constituantur nonnullæ difficile, ab ichneumonibus sola ex facie externa distinguuntur hodie, præfertim males. Qui posthac species examinent, observent accurate numerum articulorum in antennis, quæ notam specificam primariam subministrabunt, hoc olim nescius ipse prætervidi.

Ichneumon.

951. ICHNEUMON serico conglobato albo.

Journal. sc̄avant. 1713. p. 474. *Mouche à cotton.**Derrb. physico-theol.* l. 8. c. 6. n. 21.*Raj. inf.* 255. n. 13.*Frisch. germ.* 6. p. 24. t. 10.*Reaum. gall.* 2. t. 35. f. 6.*Act. upf.* 1736. p. 29. n. 10. *Ichneumon tophos sericeos exstruens.*Habitat in *Graminum* culmis circa autumnum in pratibus non infrequens.

DESCR. Tophi magnitudine ovi columbini, solitarii, albi.

952. ICHNEUMON serico conglomerato-flavo.

T

Goed.

Goed. lat. I. p. 59. n. II.

Lift. goed. I7. n. 7. Alterum experimentum.

Wagn. belvet. 226. Vermiculi ex crambide.

Raj. Cantabr. p. 35.

inf. 254. n. 12. & p. 260. Musca brassicariae erucæ.

Derrb. physico-theol. I. 8. c. 6. n. 21.

Reaum. gall. 2. t. 33. f. 2. 7. 8.

Mer. europ. t. 45.

Act. upf. 1736. p. 29. n. II. Ichneumon parasiticus erucarum minimus.

Habitat in Larvis *Papilionis brassicariae*; quumque Larva hæc ad metamorphosin sese accingat moritur, ex ejus corpore prodeunt plurimi hujus vermiculi, a matre antea intra corpus Larvæ sepulti; hi tum nent & deinde mutantur.

DESCR. Non uti præcedentes unum communem nent tophum, sed singulum parvum; Lana huic non alba, sed flava est. *Corpus* nigrum, magnitudine pulicis. *Antennæ* nigrae, corpore longiores; *pedes* flavi.

953. ICHNEUMON Aphidum. *It. gotl. 307.*

Habitat in *Aphidibus* 714. *Serratulæ foliis spinosis.*

DESCR. Ambulat hic super Aphides, magnitudine pulicis, præcedenti similis, totus niger; *abdomine* ad basin, ut & pedibus, flavis; sed *pedes postici* modo ad genicula flavi. *Antennæ* attrae; cum ova deponat anum versus thoracem inflebit & incurvat aratri instar, eoque pungit vel anum aphidis vel appendiculi apicem.

954. ICHNEUMON nigro-cærulescens subhirsutus, abdomine sessili, pedibus flavescentibus. *De Geer.*

Habitat in *Roslagia.*

DESCR. Mediae magnitudinis Vespa. *Alæ* longitudine abdominalis, latiores, margine exteriore fusco.

955. ICHNEUMON ater, femoribus testaceis, antennis medio albis.

Habitat *Upsalæ.*

DESCR. Est mediae magnitudinis, *abdomine* longo & fere subulato; *pedes* longi, nigri, sed *femora* longa, testacea: totum *corpus* atrum, etiam *Antennæ*, quas in medio annulus albus cingit, rectæ. *Alæ* fuscae.

956. ICHNEUMON niger; pedibus ferrugineis: palmis anticis nigris, antennis unicoloribus.

Habitat in *pascuis.*

DESCR.

DESCR. Hic inter' non maximos habendus est. *Antennæ, caput, thorax, abdomen* atra. *Antennæ* longitudine fere abdominalis, omnino nigrae. *Aculens* longitudine abdominalis, setaceus, niger. *pedes ferruginei* cum femoribus, tibiis, palmis, exceptis pedum anteriorum tibiis, apice nigris.

957. ICHNEUMON ater; femoribus pedibusque testaceis, antennis subtus pallidis.

Act. upf. 1736. p. 50. n. 21. Ichneumon antennis spiralibus, corpore atro, ventre falcato, pedibus luteis.

Habitat in Pupis sive Chrysalidibus Papilionum.

DESCR. Magnitudine & facie omnino praecedentis penultimi s. 954, sed in eo sola femora testacea, in hac vero & femora & pedes testacei coloris, solum tali seu apices tibiarum nigri. *Antennæ* etiam nigrae, sed subtus secundum rotam longitudinem dilute testacea ad nigrum inelimantes. *femora postica clavata.* *Abdomen* sessile, oblongum, acuminatum.

958. ICHNEUMON ater; tibiis femoribusque ferruginea, tibiis posticis nigrae, antennis medio albis.

Habitat ad arcem Drottingholm. E. Kallenberg.

DESCR. Est mediae magnitudinis. *Totus* antennis, capite, thorace, abdominali, ater, at tibiae & *femora* pedum anteriorum ferruginea sunt; sed in postico pari pedum sola femora ferruginea & longa sunt, in his autem tibiae & plantae pedum nigrae. *Antennæ* in medio albæ sunt.

959. ICHNEUMON ater; pedibus rufis.

Raj. inf. 256. Vespa Ichneumon tota nigra; præter pedes, qui crocei sunt.

ib. Musca tripilis corpore tenui admodum & praelongo, setis a cauda, omnium, quas unquam vidi, longissimis, excentibus.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 3. Ichneumon cauda tripili, abdominali, tereti atro, pedibus filiformibus rubris.

Habitat passim apud nos in hortis & pratis.

DESCR. *Corpus* totum antennis, capite, thorace, abdominali, aculeo nigrum. *Aculens* filiformis, niger, constans setis tribus, (intermedio rubro,) corpore longioribus. *Abdomen* cylindricum. *Pedes* longi, toti rufi. *Ale* macula nigricante marginali.

960. ICHNEUMON ater, tibiis apiceque thoracis albis.

Habitat in pratis.

DESCR. Mediae est magnitudinis, *totus* ater; *antennæ* etiam nigrae; apex thoracis in tergo solus albus. *femora* nigra. *Tibiae* omnes albae, uti & palmæ in priinis pedibus. *Abdomen* sublunulatum, punctum marginale alarum pallidum.

- 961. ICHNEUMON** niger; fronte pallida, pedibus rufis.
Att. upf. 1736. p. 50. n. 20. Ichneumon cauda iner-
 mi, abdomine tereti atro, pedibus filiformibus
 rubris.

Habitat apud nos frequens.

DESCR. praecedentibus minor. *Antennæ* nigrae. *frons* pallida. *puncta* nul-
 la ante alas, nec ulla in incisuris abdominalis. *Alæ* rufæ; *pedes* postici tibiis
 apice nigrescentibus: *Alæ* membranaceæ cum puncto marginali, mi-
 nimæ glaucæ, sed aquei coloris. *Abdomen* cylindricum est.

- 962. ICHNEUMON** ater; pedibus rufis, tibiis posti-
 cis apice nigris, antennis medio albis.

Att. upf. 1736. p. 50. n. 21. Ichneumon antennis
 spiralibus, corpore atro, ventre subfalcato, pe-
 dibus luteis.

Habitat passim ruri.

DESCR. *Abdomen* atrum, minime cylindricum, sed lanceolato-depres-
 sum. *Caput & thorax* nigra. *Alæ* subglaucæ, puncto marginali pallido. *Antennæ* spirales, longitudine fere corporis, nigrae, annulo in medio albo. *Femora*, *tibiae* & *palmæ* omnes ferrugineaæ, sed *tibiae* posticæ
 versus apices præsertim & harum *palmæ* nigrae sunt; *femora* autem,
 quæ longiuscula, ferruginea sunt in *pedibus* posticis, ut in reliquis.

- 963. ICHNEUMON** niger; pedibus ferrugineis, tibiis
 posticis albo nigroque variegatis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Culice paulo major. *Antennæ* pallidæ. *Frons* flava. *Caput*, *tho-
 rax*, *abdomen* immaculate nigra. *Abdomen* cylindricum. *Pedum* duo pa-
 ria priora ferruginea; par tertium femoribus obscure ferrugineis: *tibiis*
 duobus annulis albis totidemque nigris alternis notantur.

- 964. ICHNEUMON** niger; fronte punctisque abdomi-
 nis albidis, pedibus rufis.

Att. upf. 1736. p. 29. n. 19. Ichneumon niger, abdo-
 mine cylindraceo punctato; pedibus rubris, alis
 albidis.

Habitat apud nos rarius.

DESCR. *Antennæ* nigrae. *Caput* nigrum, fronte flavo-albida. *Thorax* niger,
 m. cula linearis albida supra insertionem alarum. *Abdomen* cylindricum,
 longum, nigrum, punctis duobus ovalibus transversis ad margi-
 nem singulæ incisuræ abdominalis a tergo. *Pedes* rufi, sed postici tibiis
 nigri. *Alæ* parum glauca cum puncto marginali oblongo atro. Quibus-
 dam *Aculeus* niger, longitudine corporis vel longior.

- 965. ICHNEUMON** ater; tibiis nigris, abdomine ma-
 culis utrinque quatuor albis.

Habitat *Upsaliæ*. R. Hast.

DE-

DESCR. *Corpus* totum nigrum sive atrum, sed macula utrinque ante oculos alba; duo alba puncta supra os. ante alarum basi utrinque linea alba a capite ducta cum puncto albo, & subtrus puncto albo. *Apex thoracis* albus cum lineola alba transversa. *Abdomen* longum, segmentis 1. 2. 3. 4. utrinque macula sive puncto albo: horum 1. segmentum petiolus est. *Aculeus* nullus manifestus.

966. ICHNEUMON niger; abdomine tibiisque ferrugineis, antennarum medio albo.

Habitat rarius in arvis.

DESCR. Est inter maximos nostrates. *Abdomen* totum ferrugineum est, excepto petiolo nigro, quo peiori anneditur. *Tibiæ* omnes ferrugineæ, at femora nigra. *Thorax* niger, sed scapularum regio versus alas a collo linea flava utrinque notatur. *punctum* itidem flavum sub basi alarum: *lineola* flava supra oculos. *Antennæ* spirales, in medio albæ, cæterum nigrae.

967. ICHNEUMON luteus totus.

Gæd. belg. 2. p. 135. f. 37.

Lift. gæd. 59. f. 20. C.

Raj. inf. 253. n. 6. *Vespa ichneumon* major tota fulva, alis amplis: anterioribus nota fulva circa medium marginem anteriorem insignibus.

Aet. upf. 1736. p. 29. n. 15. *Ichneumon* flavus, abdomine falcato, alis erectis.

Habitat frequens in viis & plateis nostris.

DESCR. *Totum* corpus, caput, thorax, abdomen, antennæ, pedes, unius ejusdemque coloris flavi, vel dilute lutei. *Alæ membranacei* coloris, puncto marginali luteo. *Abdomen* arcuatum, basi angustius petiolo adfixum. *antennæ* longitudine fere corporis infinitis articulis. *oculi* foli nigricantes.

968. ICHNEUMON niger; abdomine tibiisque ferrugineis, antennis annulo albo.

Habitat Upsaliae.

DESCR. Est hic e majoribus generis. *Caput* nigrum: oculi nigricantes: *Antennæ* nigre, spiraliter inflexæ, in medio albi instar annuli, licet vix perfecti, cingit albedo antennas. *Thorax* niger; a capite versus alas utrinque linea albida; sub alarum insertionibus punctum albicans. *femora* nigra omnia, sed *tibiæ* & *palme* omnes pallide ferrugineæ. *Abdomen* ferrugineum totum, sed petiolus abdominalis niger est. *Alæ membranacei* coloris, puncto marginali ferrugineo.

969. ICHNEUMON totus luteus; abdominis apice nigro.

Raj. inf. 253. n. 7. *Vespa ichneumon* præcedenti congener, sed minor, tum corpore tum alis, verum imo abdomine seu cauda nigra.

Habitat rarius in nemoribus.

DESCR. Corpus totum luteum, duo tantum segmenta extima abdominis nigra. Alæ membranacei coloris. Antennæ longitudine corporis.

970. ICHNEUMON niger; abdomine ferrugineo apice nigro, antennis annulo albo.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 7. Ichneumon aculeo triplici, pedibus abdomineque testaceis, apice nigro.

Habitat inter flores passim, nec non in sylvis.

DESCR. Caput & thorax nigra. Antennæ nigrae, annulo albo. pedes omnes rufi. abdomen obverse ovatum, ferrugineum, ultimo articulo nigro, aculeo parvo triplici, alæ membranaceæ.

971. ICHNEUMON niger; abdomine ferrugineo: apice nigro, antennis nigris.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 5. Ichneumon niger, cauda exserta triplici, pedibus anterioribus abdomineque luteis.

Habitat in Pinetis.

DESCR. Antennæ, caput, thorax nigra. Abdomen obverse ovatum, ultimo articulo nigro. Pedes ferruginei, sed femora postica nigra. Aculeus triplici longitudine fere abdominis. Alæ glaucae. Præcedenti duplo major est.

972. ICHNEUMON niger; abdomine toto ferrugineo.

Act. upf. 1736. p. 29. n. 6. Ichneumon aculeo triplici erecto, collari nigro, abdomine pedibusque testaceis.

Habitat cum præcedentibus duobus.

DESCR. Caput, antennæ, thorax nigra. Alæ membranaceæ. Abdomen obverse ovatum, ferrugineum. pedes omnes ferruginei; præcedente pâulo minor.

973. ICHNEUMON ferrugineus; abdominis apice pectoreque inferiore nigro.

Habitat rarius in sepibus.

DESCR. Antennæ, capitî latera, pedes, abdominis antica pars, ferruginea; at Thorax subitus & abdominis tria extima segmenta nigra.

974. ICHNEUMON niger; abdomine antice luteo, pedum geniculis nigris.

Habitat Upsaliæ, R. Haft.

DESCR. Caput nigrum: linea circum oculos fulva: macula frontis flava, & labium flavum. Antennæ ferrugineæ. apex Thoracis macula flava. Pedes ferruginei, sed postici basi ovati, nigri. femora & tibiæ apice nigra. abdomen flavo-ferrugineum, compressum, sulcatum, sed apice nigrum. in dorso abdominis linea longitudinalis nigra.

975. ICHNEUMON niger; abdomine antice luteo, pedibusque luteis.

Raj. inf. 255. Vespa ichneumon major & longior, abdomine multo tenuiore ligamento pectori adnexo.

Aet. upf. 1736. p. 29. n. 16. Ichneumon niger, abdomine falcato superne luteo, alis erectis.

Habitat vulgaris Upsaliae, frequens in viis.

DESCR. Convenit facie cum proxime precedentibus, est tamen paulo minor. *Abdomine* anterius luteo & posterius duobus tribusque segmentis nigro convenit cum prioribus duobus; *thorace* undique nigro & petiolæ abdominis etiam nigro a predictis differt. *pedes* maxima parte nigri sunt. *aculeo* pungit & dolorem excitat.

976. ICHNEUMON niger; abdominis segmentis duabus anticis ferrugineis, apice thoracis flavo.

Habitat Upsaliae.

DESCR. Antennæ, caput, thorax nigra, sed apex thoracis albido flavus. *abdominis* petiolus niger, duo segmenta prima ferruginea, ita tamen, ut margo prioris ferruginei segmenti nigricans sit; hinc pars abdominis ferruginea quasi linea transversa notata: quatuor reliqua abdominis segmenta nigra sunt. *femora* nigra sunt, sed tibiæ maxima ex parte ferruginea. *Abdomen* semicylindricum.

977. ICHNEUMON ater; abdominis sessilis segmentis anticis rufis, alis fuscis.

Frisch. germ. 2. p. 11. t. 1. f. 13.

Raj. inf. 254. n. 9. Vespa ichneumon major, capite, thorace & pedibus nigris, abdominis anteriore parte rubra, posteriore nigra.

Aet. upf. 1736. p. 50. n. 25. Ichneumon ater, alis nigricantibus, abdomine medio superiore testaceo.

Habitat sat frequens in Uplandia.

DESCR. E maximis generis sui est, totus ater, uti antennæ, caput, thorax, pedes & alæ. *abdomen* ovatum, vix petiolatum, ferrugineo-rufum sive fusco-rufum, exceptis ultimis tribus segmentis nigris. *antennæ* breves, arcuatae, articulis decem.

978. ICHNEUMON abdomine antice ferrugineo: postice nigro: punctis quatuor albis, antennis albo annulo.

Aet. upf. 1736. p. 30. n. 22. Ichneumon abdomine testaceo: apice nigro: punctis quatuor albis.

Habitat frequens circa Upsaliam & alibi.

DESCR. Hic sequenti simillimus. *Antennæ* nigrae annulo albo in medio, cum in sequenti antennæ nigrae, secundum totam longitudinem hinc al-

bt. Pedes rufi in hoc, sed femora postica nigra; in sequenti femora postica, ut reliqua, rufa. Caput nigrum absque macula, cum in sequente frons flava. Thorax in hoc niger; in sequenti apice & ad insertiones alarum lateus. Abdominis primum segmentum nigrum, secundum ac tertium ferrugineum, reliqua nigra, a tergo alba macula singulari notata; in sequenti segmentum abdominis primum & secundum flavum, reliqua nigra a tergo majori macula flava notata. Alæ utrinque glaucæ.

979. ICHNEUMON abdomen antice ferrugineo: postice nigro: maculis flavis quinque, antennis hinc albis.

Habitat cum praecedente.

DESCR. Vide praecedentis descriptionem & ibi datas differentias.

980. ICHNEUMON abdomen antice ferrugineo: postice nigro immaculato, antennis annulo albo.

Act. upf. 1736. p. 50. n. 23. Ichneumon antennis spiritalibus, abdomen nigro, articulis duabus superioribus testaceis.

Habitat cum praecedentibus.

DESCR. Facie convenient cum penultimo, ut an pro varietate sola habendum sit, dubitem, convenient cum eo antennis nigris, singulo albo, capite nigro, thorace nigro apice flavo; pedibus luteis, sed femoribus gaudet nigris; alis glaucis. abdomen nigro, segmento secundo & tertio ferrugineo, reliquis immaculatis.

981. ICHNEUMON abdomen antice ferrugineo: postice nigro: incisuris flavis, antennis annulo albo.

Act. upf. 1736. p. 50. n. 24. Ichneumon antennis spiritalibus, abdominis articulis nigris margine flavis, secundo toto testaceo.

Habitat cum praecedentibus.

DESCR. Convenient facie cum tribus proxime praecedentibus, praesertim cum ultimo; nam. *Corpus* nigrum. *antennæ* albo annulo; *apex* thoracis flavius; *abdominis* primus articulus niger, secundus ferrugineus, reliqui nigris marginibus flavis. Alæ glaucæ cum punto marginali.

982. ICHNEUMON niger; abdomen medio pedibusque anterioribus rufis, palmis posticis albis.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Medicis magnitudinis est. caput, antennæ totæ nigræ. *abdomen* rufum, basi & apice nigro. *pedes* 4 anteriores rufi; pedes posticii duo longiores, nigri, foliis pedum plantis albis. Alæ membranaceæ puncto marginali nigricante.

983. ICHNEUMON niger; tibiis segmentoque secundo tertioque abdominis flavis.

Habitat *Upsaliæ*. R. Haft.

DESCR.

DESCR. Caput, thorax, antennæ nigra, ante oculos utrinque macula flava. apex Thoracis flavus. *abdominis* prima segmentum est petiolus niger; reliqua segmenta depresso, quorum secundum & tertium flavum, reliqua nigra, sed quartum tribus maculis obsoletis ferrugineis. *femora nigra*; *pedes* flavi, geniculis nigris.

984. ICHNEUMON niger; alis albis: fascia duplici nigra: posteriore majore.

Habitat in pratis.

DESGR. parvus est, magnitudine culicis, angustus, totus niger, *antennæ* tenuissimis rectis. Totum *corpus* atrum est, sed *femora* primora rufescunt; *alæ* aqueæ cum macula magna nigricante postice; & ante hanc linea transversa nigra.

985. ICHNEUMON tibiis posticis clavatis.

Mouff. lat. 64. f. 121. Musca tripilis 1.

Reaum. gall. 4. t. 10. f. 14.

*Act. upf. 1736. p. 28. n. 2. Ichneumon cauda tripli-
ci, abdome superne flavescente, pedibus clavatis.*

*p. 29. n. 17. Ichneumon cauda inermi,
abdome falcato, pedibus clavatis.*

Habitat in *Arena*.

DESCR. Caput, thorax, pedes, antennæ nigra. *Aculeus* in fæmina triplex, niger (intermedio rubro,) piliformis, longitudine corporis vel longior, apice albus. *abdomen* falcatum, petiolo thoraci adfixum, nigrum, sed versus basin rufum. *pedes* posteriores constant femoribus parvis, his proximus articulus est tibia nigra, minus crassa, & tertius articulus sive tibia inferior crassissima, nigra, clavata; ultimus articulus tenuis basi albus.

986. ICHNEUMON linearis; antennis longitudine cor-
poris, tentaculis setaceis, femoribus clavatis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Est longitudine Culicis, valde tenuis & oblongus. *Pedes* testacei, *femora* clavata. *Abdomen* clavatum. *antennæ* longitudine corporis, in cauda tres seræ longitudine corporis. *alæ* complicatae sive incumbentes, macula ferruginea marginali, duæ seræ sive tentacula ad os longitudine tho-
racis, albae. alter sexus caret fetis in cauda.

987. ICHNEUMON viridi-æneus; antennis nigris spi-
ralibus.

Habitat in juniperi Triglochide, cuius Tipulam deva-
stat. vide Tipulam antepenultimam.

DESCR. *Corpus* totum viridi-æneum magnitudine pediculi; *Antennæ* ni-
graæ spirales. *Alæ* aqueæ: puncto marginali rubro. *Larva* rubra. *Puppa* o-
vata pellucida aquæ coloris.

Apis.

* Vespa.

988. APIS thorace nigro: antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplice contiguo.

Mouff. lat. 50. Crabro.

Merr. pin. 196. Crabro.

Raj. inf. 250. Crabro vulgaris.

Frisch. germ. 9. p. 21. t. 11. f. 1. Crabro.

Swamm. bibl. t. 26. f. 9.

Suecic Bolgetting.

Habitat in arboribus sub arborum radicibus & in domibus vacuis, vietitat raptu aliorum insectorum, etiam apum domesticarum.

DESCR. Labium superius luteum: Caput rufum. Thorax niger, antice rufus. Pedes grisei. abdominis incisurae extrorsum luteæ, introrsum nigrae, punctis duobus in segmento 3 4 5, sed basi connatis cum nigredine interiore incisurarum.

989. APIS thorace lineolis trium parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum liberis.

Mouff. lat. 52. Vespa.

Merr. pin. 196. Vespa flava major.

Raj. inf. 250. Vespa vulgaris.

Frisch. germ. 9. p. 23. t. 12. f. 2.

Swamm. bibl. t. 26. f. 8.

Suecic Vespa. Getting.

Habitat sub tectis frequens apud nos, muscarum prædatrix.

DESCR. Antennæ nigricantes. Thorax ater: lineis duabus anterioribus lateralibus, lineolis duabus transversis posticis; duabus aliis adhuc minoribus posterioribus: Insegmenta abdominis nigra, omnia margine flava, in singulo duo puncta nigra connexa cum nigredine in prioribus incisuris, in posterioribus vero distincta. Pedes flavi.

990. APIS nigra; abdome fasciis quinque flavis: prima remotissima.

Frisch. germ. 9. t. 12. f. 1.

Habitat paucim.

DESCR. Antennæ clavatae, nigrae, infimo articulo subitus flavo, puncta flava 2 ad basia maxillarum a latere, 2 ad apicem labii superioris, 2 in fronte, 1 intra cornua, 2 in medio tergi thoracis, 1 ad singulam alam. Thoracis basis linea flava. tibiae omnes flavae. segmenta abdominis omnia quinque margine flava, quorum primum remotius, latius, semibifida lineola. Alæ minus explicate.

991. APIS nigra; thoraci basi flavescente, abdomine fasciis quatuor flavis: prima remotissima.

Frisch. germ. 9. p. 24. t. 12. f. 8. 9.

Habitat ruri.

DESCR. Nigra tota est. *antennæ* fere clavatae; a tergo ad basin *Thoracis* duæ maculae trigonæ, versus apicem thoracis macula nulla. *Abdomen* cingitur quatuor flavis fasciis, quarum prima maxime a reliquis remota est. *Tibiae* etiam flavæ sunt.

992. APIS nigra; thorace basi apiceque flavescente, abdomine fasciis quatuor flavis: tertia interrupta.

Habitat in campis & arvis.

DESCR. Vespa vulgari minor. *Antennæ* nigrae; *Corpus* nigrum, sed a tergo ad marginem *thoracis* anteriorem lineola flava, & in medio thoracis a tergo punctum flavum. *abdomen* tribus fasciis transversis flavis a tergo notatur, quarum secunda ac tertia remotissima; his duabus interiacet ab utroque latere punctum oblongum flavum. *Pedes*, exceptis femoribus rufis, nigri sunt.

993. APIS nigra; abdomine fasciis quatuor flavis: tribus primis interruptis.

Habitat passim.

DESCR. *Corpus* nigrum, ape minus. *Tibiae* omnes flavæ. *thorax* immaculatus. *abdomen* a lateribus pingitur utrinque tribus lineolis transversis flavis, & pone has lineola transversali flava. *antennæ* breves, nigrae, basi flavæ.

994. APIS nigra; abdomine fasciis quatuor undique flavis.

Frisch. germ. 9. t. 12. f. 5. an?

Habitat Fahlunæ juxta viam publicam in arena, cuniculos formans ad latus arenæ juxta Capellum.

DESCR. Tota nigra est, ape domestica minor. *antennæ* nigrae, in medio latiores. *Caput* nigrum; *thorax* niger, a tergo pari punctorum transversorum flavi coloris. *abdominis* primus articulus niger, puncto utrinque flavo; segmento 2. 3. 4. 5. nigro, margine circum totum abdomen flavo; segmento ultimo, seu ani, toto nigro. *Pedes* nigri, hinc inde pallidi.

995. APIS glabra nigra; abdomine fasciis tribus flavis: prima remotissima.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Media hæc magnitudinis, tota nigra, sed frons inter *antennas* puncto albo. *thorax* niger, sed in apice duo puncta albida. *Abdominis* tria segmenta margine flava, quorum duo postica approximata, primo magis distante; horum linea flava intermedia subtus conspicitur, non vero reliqua. præter hæc observatur & in thorace utrinque ad basin, ut & utrinque sub aliæ insertionem, punctum album minutissimum.

996. APIS glabra nigra; abdomine fasciis tribus flavis: tertia remotissima; primo articulo infundibuliformi.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. *Antennæ nigrae*, basi flavæ: linea flava ante singulos oculos: linea flava ad basin thoracis, & punctum flavum in medio thoracis, ut & sub alarum insertionem. *Abdomen* adnexitur pedunculo pyriformi supra puncto flavo notato, qui *primus* articulus est; *secundus* articulus & *tertius* cingitur a tergolata linea flava singulus; *quartus* articulus caret linea flava, sed ad latera maculam flavam habet; *quintus* articulus margine flavo est. *Pedes* flavi.

997. APIS glabra nigra; tibiis flavis, abdominis fasciis tribus flavis: primis interruptis.

Habitat passim inter flores.

DESCR. *Caput* atrum. *Antennæ* atræ, basi flavescentes. *Thorax* niger, basi pone caput punctis duobus linearibus flavis. *Abdomen* glabrum, atrum: segmentum 1 immaculatum; 2 macula utrinque ovata; 3 immaculatum; 4 linea flava a tergo interrupta; 5 linea flava contigua; 6 immaculatum. *Abdomen* subtus totum atrum est. *Tibiæ* extrosum flavae, introrsum fulvæ. *Palmæ* nigrae & femora nigra, exceptis prioribus. *Vespa* hæc longitudine est muscæ domesticæ, sed angustior.

998. APIS thorace nigro: lineolis flavis, abdominis segmentis nigris: margine flavis; primo secundoque ferrugineo.

Habitat rarius in hortis.

DESCR. Magnitudo & facies vespæ vulgari simillima. *Caput* nigrum, fronte flava cum macula hastata; maxillæ flavæ, punctum flavum inter antennas, capitis latera flava utrinque lineola. *Thorax* niger cum linea ante singulam alam flava; puncto flavo sub ala, & linea transversa pone singulam alam. *Abdominis* segmenta nigra, marginibus flavis, sed primum segmentum omnino ferrugineum margine flavo; secundum segmentum basi in medio nigro. *femora maxima ex parte nigra*, sed *tibiæ ferrugineaæ*. *Antennæ* nigrae.

999. APIS pedibus maxillisque flavis: apice nigris, incisuris abdominalibus glabris: margine nigris.

It. gotl. 246. Jord - bij.

Habitat in monticulis arenosis *Gotlandiæ*, ubi in singulo nido unicus pullus.

DESCR. Oculi, os, pedes flava. *Thorax*, *abdomen* nigra: segmento abdominalis singulo intra margines flavo; margo enim baseos & extimus niger est. primum segmentum macula utrinque unica notatur. *Alæ* glaucæ, venosæ. *thorax* subhirsutus, macula flava pone singulam alam. linea flava interrupta ad apicem thoracis. *Oris labium* superius cornuum, in flexum, magnum, acuminatum, concavum. *Dentes* utrinque solitarii, flavi, apice nigri. *Crabronis* magnitudo.

Difert sexu: *Aliæ* abdomine luteo maculato (ut supra); antennis supra nigris, subtus flavis; aculeo corneo brevissimo, rigido; *Aliæ* albo-

pi-

pietæ, ubi prior luteo. antennæ fere ex toto nigra, aculeo pungente, longo, flexuoso, ut in ape.

1000. APIS nigra; pedibus maxillisque flavis. *It. gotl.* 336.

Habitat in *Wifingsö* insula Wetteri, in ipsis antiquissimis tumulis sepulchralibus.

DESCR. Magnitudo $\frac{1}{6}$ muscæ vulgaris; *toto* corpore nigra exceptis pedibus & maxillis pallide luteis. *Antennæ* filiformes, corporis fere longitudine, subtrus pallidiores.

1001. APIS nigra; pedibus fronteque flavis.

Habitat in antliis & siphonibus cariosis *Scaniae*.

D. Leche.

DESCR. Magnitudo præcedentis. *Tota nigra*, sed inter *antennas* flava: pedes (exceptis femoribus,) rufo-pallidi, præsertim quatuor posteriores. *Antennæ* dimidio corpore fere breviores, rectæ.

1002. APIS nigra; abdominis primo articulo infundibuliformi, secundo campanulato maximo.

Frisch. germ. 9. *p.* 17. *t.* 9.

Habitat in *Salicetis*.

DESCR. Facies apis domestica quodammodo; tota atra, margines segmentorum abdominis omnes flavi; articulus abdominis primus tenuis, parum ventricosus, secundis maximum, ut omnes reliquos intra se retrotractos occultare possit, huic articulo utrinque macula flava (apud nos non uti *Frischii*) linearis obliqua. *thorax* niger: macula flava unica ad basin, ad singulam alam unica, ad apicem unica, sed hæc bifida est. *Frischii* descriptio optima est.

* * Apes proprie dictæ.

1003. APIS gregaria.

Mouff. lat. 2. *Apis*.

Merr. eur. 2. *p.* 19. *t.* 1.

Aldr. inf. 20.

Jonst. inf. 1. *t.* 2.

Charl. exerc. 6.

Merr. pin. 106. *Apis domestica* f. *vulgaris* *alvearium*.

Raj. inf. 240. *Apis*.

Dal. pharm. 386. *n.* 15. *Apes*.

a *Mouff. lat.* 37. *Fucus*.

Merr. pin. 196. *Fucus*.

Suecis Bii.

Habitat apud nos in sylvarum cavis arboribus rarius, communiter rusticis colitur.

Cibus

Cibus harum est mel e vasis nectariis florū, præfertim autumno e floribus Ericæ, sed mel inde rufescit; Provinciæ itaque Erica deslitutæ, ut Oelandia, mel album suppeditant, at Cera e farina antherarum conficitur.

Apum genus ab Ichneumoniis differt lingua membranacea longa inflexa. D. De Geer.

1004. APIS nitida; thorace viridi-cæruleo, abdomine inaurato.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 5. Apis parietina nitida, collari cæruleo, abdomine aureo.

Frisch. germ. 9. p. 19. t. 10. f. 1. Vespa argillacea variegata s. superbe colorata.

Habitat in parietibus & muris, præfertim argillaceis.

DESCR. Ape domestica minor. pulcherrima sane in genere suo Apis est; caput & thorax cyanea nitidissima; abdomen igne coloris nitens auro, pungit & vulnerat uti apis. Alæ fuscæ. Abdominis ultimum segmentum (exceptis ani) dentatum est, uti & thorax aliquatenus pone. Antennæ nigrae, articulis 12.

1005. APIS glabra, nigro-aenea immaculata; pedibus ferrugineis.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Lechei hoc est. Vespa parva, prannia: antenæ latis, capitatis, æqualibus, uno angulo deorsum pendentibus. Caput thorace latius. thorax longior, medio crassior, abdomen latum, deppresso-rotundum, cum umbone in medio inferius. Alæ abdomine longiores, sine colore, cum unico rivo marginali nigro non exente. Pedibus fuscō-fulvis, patuis magnitudo pediculi; antennæ vespa; nulli circuli colorati abdominis.

1006. APIS subhirsuta cinerea, abdomine conico, segmentorum marginibus albis.

Raj. inf. 262. Vespa sylvestris caudata, abdomine nigro: annulis flavis distincto?

Habitat in terra & minis.

DESCR. Ape domestica paulo minor est. antennæ nigre, subclavatae. Caput & thorax pilis cineteis. abdomen conicum, acutissimum, incisurarum marginibus albidis, adeoque 5 a tergo, 4 vel 3 subtus lineolæ albæ. Frons nigra.

1007. APIS subhirsuta cinerea; abdomine nigro: segmentis albidis, fronte flavescente.

Habitat in terra. P. Kalm.

DESCR.

DESCR. Ape domestica minor, nigra, villis albidis seu canis adpersa. *Abdomen* nigrum, segmentis villoso-canis, vel 6. *Frons* flavescens tota. *Antennarum* infimus articulus flavus, reliqua nigra. Tota facies praecedentis, a qua differt ab domine minus conico & fronte flava.

1008. APIS hirsuta; capite thoraceque nigro, abdome-
ne rufo, fronte bicorni.

DESCR. Sequente paullo major. Thorax, caput, oculi, antennae nigra. *abdomen* rufum. Pedes rufescentes, ad minimum posteriores. *frons* nigra, minime alba, ad basin maxillarum in fronte duo *Cornicula* incurva, rigida, nec mobilia, prominula, hirsutie vix longiora, nigra infra apicem: a parte exteriore denticulo notata. facies & magnitudo apis domesticae.

1009. APIS hirsuta, capite nigro, abdome rufo, fron-
te alba.

Att. upf. 1736. p. 28. n. Apis fusca, fronte alba, col-
lari testaceo.

Raj. inf. 242. Apis sylvestris parva, abdome bre-
viore, toto supina parte lanugine rufa vestito, tho-
race lanugine albicante.

DESCR. Tota hirsuta; facies apis domesticae, seu proximae antecedentis, sed minor. Caput & antennae nigrae. *frons* pilosa, albida, femora albis pilis. *thorax* fuscus. *venter* pilis rufis tuber.

1010. APIS nigra; abdome supra lineis quatuor albis,
subtus lana fulva.

Raj. inf. 242. Apis sylvestris corpore longo angusto, par-
va nigra, dorso lanugine rara fulva obsito, abdome-
ne supino nigro glabro splendente, prono lanugi-
ne rufa densa vestito.

DESCR. Ape domestica minor. *caput* nigrum. *frons* cinerea. *thorax* niger, hirsutie subcinerea. *abdomen* ovatum, nigrum, acutum, incisuram mar-
ginibus albis; subtus lana rufa seu ferruginea valde pilosum. *pedes* nigri:
postici palmis rufescentes.

1011. APIS nigra; tibiis ferrugineis, abdome maculis
utrinque quatuor flavescentibus.

Habitat passim in hortis. Licet minima sit, saepe ta-
men muscam domesticam se triplo vel quadruplo
majorem occisam secum trahit.

DESCR. *Caput* & *thorax* nigra, immaculata. *abdomen* nigrum, cuius incisurae quatuor primariae a tergo notantur singuli pari macularum albo-fla-
vescentium, quarum par thoraci proximum maculam habet utrinque o-
vatam, reliqua paria constant maculis linearibus. *Femora* nigra; sed Pe-
des ferruginei. *antennae* non capite longiores, nigrae, deorsum inflexae &
apicibus obsoletae.

* * * *Bombyli hirsuti.*

1012. APIS hirsuta nigra; thoracis cingulo flavo, ano albo.

Jung. verm. 51. Bombylius.

Mouff. lat. 53. f. 2. Bombylius.

Goed. belg. 2. p. 174. f. 46.

Lift. goed. 233. f. 105.

Frisch. germ. 9. p. 24. t. 13. f. 1.

Raj. inf. 247. n. 5. Bombylius.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 12. Apis hirsuta, nigra, collari abdominisque cingulo nigro, apice albo.

Reaum. gall. 6. t. 3. f. 1.

Suecic Jord - Humbla. Uplandis. Mömus.

Habitat in ipsa Terra, ubi copiosum mel colligit.

DESCR. Inter Bombylios dictos haec maxima est. Totum Corpus undique hirsutum & nigrum; Abdomen antice flavum, pone album, medio nigrum est. thorax antice flavo colore cingitur.

1013. APIS hirsuta atra.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 15. Apis hirsuta, tota nigra.

Habitat in Terra, minus frequens.

DESCR. Precedenti similis, sed minor; toto Corpore nigro, immaculato, exceptis setulis quibusdam circa collum sulphureis.

1014. APIS hirsuta atra; ano fusco.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 14. Apis hirsuta nigra, abdominis apice fusco.

Habitat in Terra, minus frequens.

DESCR. Precedenti similis, solo apice Abdominis minus nigro.

1015. APIS hirsuta atra; ano fulvo.

Reaum. gall. 6. t. 11. f. 1. 2.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 13. Apis hirsuta nigra, abdominis apice rubro.

Frisch. germ. 9. p. 25. n. 2. (sed nostra minor.)

Suecic Sten - Humbla.

Habitat in acervis lapidum, copiose mellificans.

DESCR. Tota atra est, excepto apice abdominis tribus incisuris igneis sive rufo-filvis.

1016. APIS hirsuta; thorace nigro abdome luteo.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 12. Apis hirsuta maxima Alpino-lapponica, collari nigro, abdome luteo.

Habi-

Habitat in *Alpibus Lapponicis*, ubi modo unicam legi.
 DESCR. Magnitudine ad Scarabaeum cornibus cervinis 332 aecedit, tota hirsuta & atra, excepto abdominaline toto luteo seu ferrugineo, folaque abdominalis basi nigra.

1017. APIS hirsuta fulva; abdomine flavo.

Frisch. germ. 9. p. 26. n. 8.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 18. Apis hirsuta, collari fulvo, abdomine flavo.

Suecic Moss - Humbla.

Habitat sub *Hypnis* & *Muscis* aliis, in pratis frequens, parum mellificans.

1018. APIS hirsuta fulva; abdominalis medio nigro: ano albo.

Act. upf. 1736. p. 28. n. 17. Apis hirsuta, collari fulvo, abdominalis basi fulva: medio nigro, ano albo.

Habitat sub *Muscis*.

Formica.

1019. FORMICA magna. It. gotl. 232.

Raj. inf. 69. Formica maxima hippomyrmex.

Act. stockb. 1741. p. 39. Haest - Myror.

Habitat in *Truncis putridis* cavis.

DESCR. Caput nigricans, in occipite puncta tria. Thorax ferrugineus ad tergum nigricans apice albo, pedes ferruginei. Squama inter thoraceum & abdomen ovata integra acuto - rotundata. Abdomen fuscum constans 5 segmentis.

1020. FORMICA rufa.

Raj. inf. 69. Formica media rubra.

Act. stockb. 1741. p. 39. Piss - Myror.

Habitat ubique in sylvis acervos e foliolis acerosis exstruens.

1021. FORMICA fusca.

Raj. inf. 69. Formica media, nigro colore splendens.

Act. stockb. 1741. p. 40. Swart - Myror.

Habitat in terra glareosa.

1022. FORMICA rubra.

Raj. inf. 69. Formica minima rubra.

Aet. stockb. 1741. p. 40. Etter-Myror.

It. gotl. 246. Etter- Myror.

Lewenb. epist. 1687. p. 97. f. 8.

Swam. quart. p. 181. t. 9.

Habitat in *cespibus* graminofis.

1023. FORMICA atra.

Raj. inf. 69. *Formica minor e fusco nigricans.*

Aet. stockb. 1741. p. 41. *Sma- Myror.*

Habitat in terra.

OBS. De propagatione Formicarum, earumque sexu plurima scripsi in *Aet. stockb.* 1741. p. 140. seqq. ubi *Mares* alatos dixi, *Fæminas* maximas pennatas, *Neutras* minimas impennes; neutra cohabitant per annum, acer- vosque exfruunt; *Mares* & *fæminæ* quam primum prœdeunt, generant, & vaque deponunt, mox his peractis expelluntur ambo a neutris.

VI. DIPTERA.

Oestrus.

1024. OESTRUS thorace flavo: cingulo nigro, alis ni- gra fascia, pedibus pallidis.

Raj. inf. 271. *Musca bipennis Oestrum dicta*, alis membranaceis punctis crebris nigrioribus velut ad- spersis.

Derrb. physico-theol. l. 8. c. 6. n. 11. *Vormils.*

Frisch. germ. 5. p. 21. t. 7. *Vermis in stercore vac-
cino.*

Reaum. gall. 4. t. 38. 37. 36.

Suecis Styng. Brömskula.

Habitat in dorso *Boum* per totam hyemem, Julio exi-
ens.

DESCR. Magnitudo muscae majoris, os nullum: rimæ absque dentibus & proboscide. oculi nigri. antennæ articulo lentiformi cum seta. Thorax fla-
vus, cingulo nigro inter alas conspicuo. apex thoracis a tergo nigris pilis,
intermediis fulvis reflexis. abdomen fulvum, segmentis. margine & basi
nigricantibus, ultimo articulo abdominis nigro. Pedes pallidi. Halteres
sub alis albi. cauda exserta inermis, sub abdomine valde inflexa. ale-
albae, incumbentes, in medio fascia lata transversa fusca puncto fusco in
apice alarum, & alio paulo infra versus marginem tenuiorem, & tertio
puncto infra fasciam & corpus versus marginem tenuiorem.

1025. OESTRUS thorace flavo: cingulo nigro, alis im- maculatis, pedibus nigris.

Fl.

Fl. lapp. 360. n. 517. Oestrum Rhangiferinum Lapponicum, ventre fulvo.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 23. Oestrum idem.

Act. stockb. 1739. p. 121. t. (ad paginam 84.) 3. f. 5. 6.

Lappis Curbina.

Habitat in dorso Cervorum *Rhangiferorum* 39, præsertim mansuetorum.

DESCR. Præcedenti duplo major, alis immaculatis: *abdomine* magis hirsuto, ipsa tunica nigra, sed lana fulva, excepta basi abdominis, flava lana.

Pedes nigri.

Larva per totam hyēmen latet sub cute Rhenonum in dorso, cauſans tuberculā illa, quibus emaciāntur Rhangiferi & cicatrices quibus contaminantur eorum coria. Dicitur & *œstrus* & *œſtrum*:

1026. OESTRUS niger; thorace flavo.

Flor. lapp. 363. p. 517. Oestrum Rhangiferinum Lapponicum, ventre nigro.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 24. Oestrum idem.

Lappis Trompe.

Habitat in Lapponia.

DESCR. Magnitudo & facies præcedentis, a quo differt, quod minus piñosus: *corpus* totū nigrum, sed *thorax* solus villis pallide flavis vestitus. Hunc eundem esse, qui in Lapponia ova sua Rhenonum sinu frontis infigit & quem in itinere, veeno tempore, s̄epe evomunt, me docuit nobilis Carol. Gustav. Friedenreich.

1027. OESTRUS sinus frontis ruminantium.

Reaum. gall. 4. t. 35. f. 21. 22. 23. 24.

Suecic Noosmatiken.

Habitat in *nasu* sive *sinu* frontis animalium ruminantium.

1028. OESTRUS ani Equorum.

Reaum. gall. 4. t. 35. f. 1 - 5.

It. gotl. 277. Vermes hæmorrhoidum cæcarum facie.

Habitat in recto ani Equorum, instar hæmorrhoidum cæcarum hærens; hujus volatile animal nondum perfectum a me observatum est dum hæc scribo.

1029. OESTRUS aquæ.

Gæd. belg. 1. p. 128. t. 70. *Chamæleo.*

List. gæd. 355. t. 144.

Frisch. germ. 5. p. 28. t. 10. *Tabanus aquaticus.*

U 2 *Swamm.*

Swamm. quart. 138. t. 4. Tabanus.

Habitat in paludibus & piscinis frequens.

OBS. Larva mihi notissima, muscam autem non dum vidi, forte unica ex enumeratis in hoc Catalogo? incertus hæreo, utrum cœstri, asili, tabani aut muscæ generis.

Afilus.

1030. ASILUS antennis capite longioribus clavatis acuminatis, segmentis abdominalibus glabris: margine flavis, fronte glabra. *De Geer.*

Reaum. gall. 4. t. 33. f. 12. 13.

Habitat in pascuis.

DESCR. Facies vespæ: abdomen obtuso; totus glaber: fronte nuda, lutea.

1031. ASILUS ferrugineus; abdominis articulis tribus prioribus atris; posterioribus quatuor flavis.

Mouff. lat. p. 46. Vespæ species, figura exterior.

Jonst. inf. t. 10. f. 2. Musca boaria aldr. tab. 1.

Hoffn. inf. t. 16. f. 10.

Raj. inf. 267. Musca maxima crabroniformis.

Frisch. germ. 3. p. 38. t. 8. Musca rapax magna, abdome luteo maculato.

Reaum. gall. 4. t. 8. f. 3.

Aét. upf. 1736. p. 29. n. 8. Ichneumon collari gibbo, abdome ovato acuto.

Habitat in pascuis, volitat juxta terram; a rusticis creditur hoc esse, quod boves currere cogat violento raptu ad aquas, ne pedes inter ungulas spuriias vulneret; quo jure haec noverint, me latet.

DESCR. Facies crabronis: Thorax magnus, gibbus: Rostrum nigrum, fulbatum. alæ, pedes, venter subtus ferruginea: abdominis tres articuli primores nigri; proxime insequentes flavi; anus seu cauda ipsa rufa.

1032. ASILUS flavus hirsutus, pedibus nigris, alis glaucis. *It. gotl. 327.*

Habitat in Smolandia.

DESCR. Magna est, in cauda quasi ungula caprina intra quam varii aulei innoxii.

1033. ASILUS lividus, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris.

Habitat in floribus.

DESCR.

DESCR. Magnitudo muscae. Abdomen & Femora longa, pallida s. livida. thorax lividus, a tergo lineis tribus longitudinalibus nigris. oculi grisei. Rostrum nigrum, sub pectore inflexum, longitudine thoracis. Alæ aquæ. Antennæ nigrae.

1034. ASILUS niger hirsutus; abdominis articulis tribus postremis albis.

Flor. lapp. 360. Oestrum bovinum, cauda alba.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 25. Oestrum bovinum, cauda alba.

Habitat in *Nericia*, unde 1731 a Profess. Strömero allatus.

DESCR. Magnitudine & præced. 1031 & Crabronem ipsum superat. Totus oblongus, niger & hirsutus est. Frons pallescit. Alæ griseæ segmenta abdominis tria ultima alba. anus ipse corneus, niger, unguæ capriæ instar latus; Fæmina ergo est. alium habeo, cui cauda simplex & abdomen dilutius flavum, qui *Mas* est.

1035. ASILUS ater hirtus, alis albis, femoribus ferrugineis.

Fl. lapp. 359. n. 517. Musca atra villosa oblonga, pedibus longis, femoribus rubris.

Act. upf. 1736. p. 34. n. 64. idem.

Habitat in nemoribus *Lapponiæ Lulensis*.

DESCR. Magnitudo muscae domesticæ, sed angustior. totus ater, pilis hispidus, nec nitidus. femora ferruginea. alæ albæ venis nigris.

1036. ASILUS niger; abdominis segmentis tribus a tergo rufis.

Habitat cum præcedentibus.

DESCR. Totus ater, parum hirsutus; macula magna a tergo abdominis rufa, alæ fuscæ.

1037. ASILUS corpore atro glabro; alis nigris, femoribus halteribusque ferrugineis. *It. æl. 155.*

Reaum. gall. 4. t. 22. f. 7. 8.

Habitat in *Oelandia*.

DESCR. Tonus glaber. abdomen clavatum, atrum, nitidum. caput & thorax atra. pedes five femora ferruginea, plantis nigris. claviculæ ferrugineæ. alæ angustæ, nigrae.

1038. ASILUS niger; alis subrotundis ferrugineis.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 15. Culex fuscus; alis subrotundis.

Habitat in *Lapponiæ Umeniæ & Lulensiæ* frequens, ubi circa

circa vesperam choreas in aëre ducit, uti reliqui culices; non vero mordet.

DESCR. Ore gaudet culicis longiusculo nigro. *Corpus nigrum. Pedes nigri, femoribus ferrugineis. Alæ subrotundæ, fuscæ seu ferrugineæ, valde obtuse. Magnitudine alarum muscam domesticam superat, corpus tamen angustius est.*

1039. ASILUS niger, abdominalis margine maculisque tribus dorsalibus albis.

Habitat in Urtica rarius.

DESCR. Facies muscae domesticae sed dimidio minor. *Caput nigrum, pone antennas lineola seu duo puncta oblonga alba. Thorax glaber, niger, nitidiusculus puncto & lineola alba lateraliter ante alas. Halteres albi. Abdomen nigrum; margine acuto albo maculis tribus triangularibus longitudinalibus in dorso abdominalis. Femora nigra. Pedes albidi. proboscis acuminata est, hinc ad hoc genus, potius quam ad muscas hanc speciem refero.*

1040. ASILUS alis albis; fasciis duabus fuscis.

Act. upf. 1736. p. 33. Musca minima atra, ventre acuminato, alis incumbentibus; fasciis tribus cinereis.

Habitat in foliis Salicis.

DESCR. *Corpus vix majori pediculo majus, oblongum, totum atrum unum cum pedibus. Alæ incumbentes, fasciis duabus lati fuscis, apice & basi tamen albae. pedes longiusculi. Caput rostro prominulo, incessu elevatus, thorax niger, nitidus. Abdomen atrum. femora alba.*

1041. ASILUS niger glaber; alis cinereis.

Habitat in hortis.

DESCR. Musca domestica dimidio fere minor; totus ater; *abdomine non ovato, sed admodum attenuato; pedes postici admodum longi respectu animalis. Alæ nec fuscæ, nec cinereæ, sed medio horum,*

1042. ASILUS cinereus glaber ovatus.

Suecæ Sting - Fluga.

Habitat ubique. Hic tibias nostras ingruente præsertim pluvia pungit; hic, ut continuo calcitrant boves, nec pedibus quiescant, facit; ubi pungit, macula saepè rubra in medio coccinea, diu durans.

DESCR. *Facies & magnitudo & Color Muscae domesticae vulgatissime adeo similis, ut quis eandem absolute dicteret, nisi rostrum subulatum, atrum, cornuum distingueret.*

Hippobosca,

1043. HIPPOBOSCA pedibus tetradactylis. Mouff.

Mouff. lat. 59. *Hippoboscus.*

Frisch. germ. 5. p. 43. t. 80. *Ricinus volans.*

Act. up. 1736. p. 31. n. 27. *Musca equina tenax.*

Reaum. gall. 6. t. 48.

Suecic. Hæft-Fluga.

Habitat in Equis, Bobus, præsertim ad inguina & perineum; vulgus itinera instituens maxime metuit, ne aures intret.

DESCR. Notissima ubique est, tota glabra, grisea, tenacissima, capite privata vivit adhuc diu, pedes posteriores longiores sunt.

Character generis consistit in dente simplici cylindrico, obtuso; proboscide brevissima, alis duabus cum halteribus sub alis, pedibus ungulatis pluribus quam duobus,

1044. HIPPOBOSCA pedibus sexdactylis.

Reaum. gall. 5. t. 11. f. 1. 2. 3. 4. 5.

Habitat in pullis hirundinum & in nidis, observata a nobiliss. De Geer.

DESCR. Precedenti minor. Abdomen pone emarginatum; alæ angustæ, in tergo abdominis spatio remotæ. pedes singuli sex unguibus.

Tabanus.

1045. TABANUS griseus; abdominis segmentis singulis triangulo albo.

Jonst. ins. t. 8. ord. 2. f. 22-21.

Reaum. gall. 4. t. 17. f. 8.

Fl. lapp. 363. *Tabanus vulgaris griseus*, incisuris dorsi macula trigona albicante notatis.

Act. up. 1736. p. 31. n. 17. Nomen idem.

Suecic. Bröms.

Habitat frequens in Suecia australi, *Equis* æstate molestus.

DESCR. In genere suo hic maximus est. Alæ diaphaneæ, venis ferrugineis. Corpus griseum. thorax cinereus. oculi nigricantes. dorsum abdominis sub alis magis flavescit, extra eas magis fuscum. In medio dorso, in singulo segmento, macula triangularis albida, acumine thoracem spectante. femora nigricantia: tibiae luteæ.

1046. TABANUS niger; abdominis segmentis margine luteis, pedibus rufis.

Fl. lapp. 363. *Tabanus flavus.*

Act. up. 1736. p. 31. n. 18. *Tabanus flavus.*

Habitat frequens in Lapponia Norvegiae contermina, Rhangiferis molestus.

DESCR. Magnitudine ad proximum precedentem accedit. Oculi, thorax, abdomen nigra, sed incisuram marginis pilis seu margine flavo, tam in dorso, quam in ventre, cinguntur. Pedes & antennae rufæ sive obscure luteæ sunt. Alæ subgriseæ.

1047. TABANUS fuscus; lateribus abdominis ferrugineis, oculis lineis tribus fuscis.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 19. Tabanus fuscus, abdominis lateribus testaceis.

Habitat frequens apud nos æstate, Equis molestus.

DESCR. Magnitudo Bombylii, totus hic glaber: latera abdominis versus basin ferruginea, margines segmentorum abdominis, praesertim in dorso, albidi. femora nigra, tibiae rufæ. Alæ albide, incisuræ abdominis tres priores testaceæ, tres posteriores nigricantes. oculi virentes; lineis tribus transversis fuscis. antennæ lunulatae.

1048. TABANUS cinereus; oculis linea transversa.

Habitat apud nos frequens, equis & boibus molestus.

DESCR. Alæ albae, totum corpus cinereum. oculis linea transversalis, singularis coloris notat, qua manifeste distinguitur a reliquis, & praesertim a precedente, cui valde affinis, tibie pallidæ.

1049. TABANUS fuscus; alis maculis fuscis albisque variis, oculis fulvo-viridibus: punctis nigris.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 21. Tabanus fuscus; alis cinereis: maculis albis nigrisque.

Act. upf. 1736. p. 22. Tabanus fuscus; alis fuscis: maculis nigris.

Raj. inf. p. 272. Musca bipennis pulchra; alis maculis albis amplis pictis.

Habitat in Suecia, praesertim Smolandia, frequens.

DESCR. Magnitudine vix insecam domesticam superat. Totus fuscus. latera abdominis juxta basin sub alis flava. Alæ magnis maculis albis & nigricantibus variegatae. Antennæ subulatae sive filiformes, versus basin pilosæ, nec ullo modo lunulatae. Oculi virides fulvescentesque nitidissimi; maculis aliquot distinctis nigris.

1050. TABANUS fuscus; alis cinereis: punctis minutissimis albis, oculis viridibus; lineolis quatuor undulatis fuscis.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 20. Tabanus fuscus, alis cinereis punctatis.

Smolandis Blindknagg.

Habitat apud nostrates frequens, Pecoribus molestus.

DESCR. Magnitudo muscae domesticae; totus cinereo-fuscus: Alæ cinereæ, punctis minutissimis albis, cum puncto marginali majori nigricante. Oculi virescentes, lineolis transversis undulatis. Thorax cinereus, lineis longitudinalibus striatus, duo puncta nigra inter oculos. Antennæ nigre, filiformes, tibie variegatae.

Musca.

* *Alis variegatis.*

1051. MUSCA alis nigris: apice albis.

Att. upf. 1736. p. 33. n. 50. Musca nigra, alis fuscis: apicibus albis,

Habitat in hortis rario-

DESCR. Rarissima haec musca parva est, tota nigra, alis nigricantibus summo apice alba macula.

1052. MUSCA alis albis: apice nigris.

Att. upf. 1736. p. 33. n. 49. Musca nigra vibrans, alis albis apicibus nigris,

Habitat frequens in arborum plantarumque foliis, in primis in hortis:

DESCR. Tota nigra est, exceptis Alis albis, summo apice macula rotunda nigra notatis: corpus nigrum est, non admodum longum, sed obtusum. Caput rubrum est. dum sedet continuo alas elevat, extendit ac vibrat.

Magnitudine admodum variat, dantur enim quædam alis triplo aut quadruplo majores.

1053. MUSCA alarum punctis duobus nigricantibus.

Habitat Fahlunæ in prædio Sweden, supra aquas fontium cursitans. J. Moræus.

DESCR. Musca domestica paullo minor, magis oblonga, nigricans. Thorax niger, setis adspersum, latere aureum, basi ad pedes canum. Abdomen oblongum alis tamen brevius, latere auro nitens. Pedes longi nigri. Alæ incumbentes, in singulis nervi circiter 4 nigri, & puncta duo atra versus marginem tenuiorem, quorum posticum minus est, sed magis atrum; alterum vero cum alterius alæ pari coiens latior. Halteres lividi.

1054. MUSCA alis albis: apice puncto nigro.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Penultima longe minor, vix pediculi magnitudine. Tota nigra, alæ versus apicem ad marginem majorem puncto nigro notatae.

1055. MUSCA alis unguiculatis albis medio puncto nigricante.

Habitat solitaria inter plantas, rarius in horto Academic.

DESCR. Magnitudo fere pulicis. *caput & thorax cærulea*, *abdomen nigrum*. *Pedes ferruginei sive testacei*. *Alæ albæ*, puncto obsolete nigro in singulæ alæ disco, fere in medio, vel paulo propius ad marginem interiorem. exterior margo denticulo sive ungue instruitur, ut in *Musca majali* 1058. *Halteres albi*. *alas non vibrat*. *oculi fusco-pallidi*. *antennæ testacea*. *seta nigra*.

1056. MUSCA nigricans; alis antice albo nigroque variis.

DESCR. *Facies Tipulæ, corpus nigricans*. *abdomen tenue*; *pedes longi*. *Antennæ subulatae*. *Alæ membranacei coloris*, *nervis 7 vel 8. nigricantibus*: *maculæ juxta marginem anteriorem*, *præsertim in medio*, *albo nigroque variegatae*. *Oculi nigri*. *nullus denticulus in margine alæ*.

1057. MUSCA alis unguiculatis griseis nigro-maculatis.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 46. *Musca alis griseis nigro maculatis.*

Aldr. inf. 346. t. 1. f. 5. *Musca quinta.*

Habitat in Floribus, *præsertim in pratis foecundissimis.*

DESCR. *Musca domestica vulgari minor*, *corpus subgriseum*. *Alæ griseæ*, *terminatæ macula marginali nigra*, & aliquot maculis majoribus nigris sparsis, & plurimiis minoribus obsoletis, *denticulus in alæ margine crassiore*.

1058. MUSCA cinerea; alis unguiculatis albis fusco maculatis.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 47. *Musca alis albicantibus nigro maculatis.*

Habitat in floribus, *sæpe Hyoscyami & Cardui crispi* 658.

DESCR. *Præcedenti paulo minor*, sed *Alæ albæ*, non griseæ, *tamen maculis adspersæ nigro-cinereis s. fuscis & quasi erosis majoribus*, & *aliis minimis vix conspicuis*, *Thorax & Abdomen cana*. *Oculi virides*. *pedes pallidi*. *cauda aculeo rigido*, *subulato*, *obtuso*, *in fæmina*. *In alarum margine crassiore inque ejus medio denticulus setæ instar prominens.*

1059. MUSCA alis albis: margine maculisque nigris.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 48. *Musca alis albicantibus nigro punctatis.*

Habitat in foliis arborum vere.

DESCR. *Hæc musca domestica dimidio minor*, *facie ad 1052 accedit*, *sed alarum margines extorsum & apice nigricantes*; *discus albus*, *punctis aliquot vagis nigricantibus*.

1060. MUSCA alis albis: fasciis tribus punctoque terminatrici fuscis.

It.

It. gotl. 245. *Musca alis vibratibus.*

Habitat in Scania & Gotlandia, s^epe in *Urtica*.

DESCR. Magnitudo fere muscae domesticae, thorax niger absque macula. Oculi fuscui aut rufi. Frons fulva. Abdomen nigrum Alae albæ, fasciis tribus transversis fuscis, quarum prima recto - curva, secunda recta, tertia etiam retrocurva, & præter has macula fulca ad apices alarum.

1061. MUSCA alis albis : fasciis quatuor griseis totidemque minoribus obsoletis alternantibus.

Rhed. 1671. *p.* 262. *t.* 264.

Blank. belg. 185. *t.* 16. *f.* L.

Reaum. gall. 2. *t.* 38. *f.* 17 - 22.

Habitat in nucleis Cerasorum, præsertim Bigaraux dictorum.

DESCR. Magnitudo antecedentis. Descriptio Rhedi bona.

1062. MUSCA alis albis: fasciis quatuor fuscis, dorso abdominis punctis quinque parium.

It. oel. 118. *Musca pallida*, oculis viridibus.

Habitat in Oelandia.

DESCR. Musca domestica longe minor. Oculi virides. Abdomen a tergo ordinibus punctorum attrorum quatuor; in singulo ordine punctis quinque. Alæ albæ, fasciis quatuor fuscis, versus marginem inferiorem angustioribus, Cauda acuminata.

1063. MUSCA alis albis : linea geminata littera S fusca, oculis viridibus.

Blank. belg. 189. *t.* 16. *f.* F.

Goed. belg. 1. *p.* 102. *t.* 50.

Lift. goed. 313. *p.* 102. *t.* 129.

Habitat in *Cardui gallis*. Goedart.

DESCR. Magnitudo muscae fere domesticæ. Oculi virides, Corpus fulvum. Alæ linea duplice serpentino - flexuosa, (quarum crassior exterior est,) fusca, in formam litteræ S. ducta, ac si pedes pellucerent. Tota subitus obsoleta flava; ani apice albo.

1064. MUSCA alis unguiculatis albis : fasciis quatuor fuscis, thoracis apice flavo.

Habitat in floribus & foliis *Cardui crispi* 658 frequens, rarior in *Cerasi foliis* mense Junio.

DESCR. Est e muscis parvis, thorax cinereus, apice a tergo flavus. Pedes testacei, alæ albæ, versus basia margine exteriore flavescentes. Alas transversim pingit fascia quadruplex, quarum prima omnino recta sive transverfa, 2. 3. 4. parum arcuata, harum ultima alas ipsas terminat. alas gerit ubi Musca domestica. Oculi virides. Abdomen nigrum, feminæ mucrone subulato, acuto, terminatur, denticulus in margine crassiore alas.

1065. MUSCA alis pallidis: venis nigricantibus; lineis transversis duabus undatis apiceque fuscis.

Act. upf. 1736. p. 34. n. 65. Musca oblonga flavescentis, dorso longitudinaliter punctato, alis nigromaculatis.

Habitat in Hortis.

DESCR. Musca domestica major est, oblonga, similis rapacibus. abdomen flavum: ordo duplex punctorum atrorum a tergo abdominis: in singulo segmento punctorum atrorum par. Alæ pallidæ, venis nigricantibus, longitudinalibus; apices alarum cinereæ; linea duplex, undulato-nigricans in medio alarum, transversa.

1066. MUSCA alis membranaceis nigro maculatis, abdominis triplici ordine punctorum nigrorum.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Musca domestica major, longior. Caput & thorax cinerea; in thorace striæ tres, fuscæ. Alæ albescentes fasciis quatuor nigris, magnis. Abdomen flavescentis cum ordine longitudinali macularum nigrarum a tergo, & utrinque ordine laterali ad latera; hæ maculae majuscæ. pedes pallidi. oculi fuchi. anus nigricans. Facies asili, sed os muscæ,

* * Hirsutæ dictæ.

1067. MUSCA atra; alarum margine tenuiore sinuato-albicante.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 35. Musca atra, alarum margine inferiore albescente lacerato.

Aldr. inf. 348. t. 2. f. 13.

Jonst. inf. t. 8. muscarum aldrovandi t. 2. f. 13.

Habitat in Hortis passim.

DESCR. Tota atra cum capite, thorace, abdomine, pedibus, alis; sed margo alarum tenuior albus est, vel potius exalbidus; dum hæc albedo sinus format, alamque quasi obtuse ferratam reddit, & in abdomine a tergo duo vel quatuor puncta nivea ad margines segmentorum.

1068. MUSCA hirsuta grisea; alis puncto obscurio.

Merr. pin. 200. Musca stercoraria.

Charl. onom. 42. Musca merdivora.

Reaum. gall. 4. t. 27. f. 1. 2. 3.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 28. Musca stercoraria.

Habitat ubique in stercore humano, equino, bovino.

DESCR. Oculi rufi. Frons flavescentis. Antennæ nigrae. Thorax cinereus. Abdomen hirtum, flavescente-lividum. Pedes hirti. Alæ basi & margine crassiore flavescentes cum puncto in medio obscuriore. Mas magis hirsutus est, magisque luteus. Femina magis glabra, magisque cinerea.

1069.

1069. MUSCA hirsuta; thorace, abdominis apice, alarumque basibus fulvis.
Habitat in nemoribus rarior.

DESCR. Inter muscas maximas locum tenet. *abdomen* ovatum, nigrum, pone pilis fulvis hirsutum; *thorax* similiter fulvis pilis vestitus. *caput & pedes* nigri. *alæ* aqueæ versus basin, præsertim versus earum marginem exteriorem macula magna ferruginea notatæ.

1070. MUSCA pilosa nigricans; abdominis basi alba, apice fulvo.

Habitat in sylvis.

DESCR. Facies Bombylli: magnitudo muscæ domesticæ, sed angustior. *caput* nigrum. *Thorax* niger, apice albido; *abdomen* in medio nigrum, basi albis pilis, apice vero fulvis vestitum. *Pedes* nigri. *alæ* membranaceæ, venis ferrugineis, tenuissimis, & macula obsoleta ferruginea in medio alæ, eaque satis magna.

1071. MUSCA pilosa; thorace griseo, abdominis apice albo, alis macula ferruginea.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 32. Musca fusca, abdominis apice villis albo, alis pallidis macula lunata ferruginea.

Habitat in hortis.

DESCR. E maximis muscis hæc est, corpore toto nigro, sed frons pilis flavis. *thorax* pilis griseo-flavis, at *abdomen* versus basin nudum, nigrum, versus apicem autem seu posteriora pilis albis vestitum. *tibiæ* versus genicula, quibus femoribus junguntur, exalbidæ. *alæ* exalbidæ venis fuscis, in medio macula transversali ferruginea notatæ.

1072. MUSCA pilosa, thorace griseo, abdomine nigro, alis macula obsolete ferruginea.

Habitat in hortis.

DESCR. Est e maximis muscis. Nigra est, sed frons & thorax pilis griseis vestiti. *abdomen* nigrum, minus pubescens. *alæ* membranaceæ, venarum anastomosi juxta medium marginis anterioris ferruginea. *oculi* nigri, linea duplice perpendiculari fuscæ. *Pedum* posteriorum par temore & proximo articulo seu tibia nigrum est, hæc tibia etiam pone gibba observatur. Facies apis domesticæ.

1073. MUSCA abdomine anterius albo, posterius nigro: alis albis: nigra macula.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 30. nomen idem.

Habitat rarius in horto academico.

DESCR. Certe hæc, si non maxima muscarum nostratrum sit, inter maximas tamen omnino est. fronte gaudet alba flava cornea. *alæ* albæ, præsertim versus basin, in medio alarum macula magna nigra: intra hanc maculam & apices alarum veræ fuscæ. *abdomen* dimidiatum, versus basin supra & subtus album pellucidum, versus apicem nigrum. *pedes* nigri;

gri; mintis pilosa est, quam præcedentes. oculi fusci. antennæ flavæ setæ nigra pilosa.

1074. MUSCA hirsuta; thorace fulvo, alis macula fusca.
Habitat in floribus Scaniæ. D. Lechæ.

DESCR. Est inter magias. oculi fusci. frons flavæ. antennæ fulvæ. thorax valde pilosus, fulvus. Abdomen nigrum, pilis flavis vestitum. Pedes nigri. abdomen subitus nigrum, marginibus incisuratum albidis: lateta abdominis margine luteo prominent, extra inferioris superficie latitudinem.

1075. MUSCA pilosa cinerea; alis ferrugineis macula fusca.

Aet. upf. 1736. p. 32. n. 34. Musca fusca; alis testaceis macula ferruginea.

Habitat in nemoribus.

DESCR. E maximis generis sui, facie quodammodo Tabani. Alæ pallido-ferrugineæ cum macula in medio, præsertim versus marginem exteriorem, saturatius ferruginea seu fusco-ferruginea. Corpus villis cinereis, & parum magis in abdominē griseis testum. tibiae superne albidae inferne nigrae.

* * * Variegata.

1076. MUSCA nigra; lateribus abdominalis testaceis.

Aet. upf. 1736. p. 32. n. 31. Musca nigra, abdominalis lateribus flavis, alis albis.

Raj. inf. 271. Musca bipennis major diversicolor, cauda setis nigris obsita.

Reaum. gall. 4. t. 31. f. 8.

Habitat passim locis uliginosis.

DESCR. Hæc e maximis generis sui est, adspersa toto corpore setis ratis, vagis, nigris. latera abdominalis utrinque testacea seu macula unica utrinque maxima pallida notata.

1077. MUSCA atra; basi alarum ferruginea.

Reaum. gall. 4. t. 26. f. 10.

Habitat passim.

DESCR. Est hæc simillima præcedenti, & e magnis in suo genere. Toti nigra, sed ante oculos macula utrinque deaurata. pili nigri seu potius setæ sparsæ per totum corpus. pedes nigri. abdomen ovatum. alæ aqueæ, sed versus basin flavæ sive potius ferrugineaæ.

1078. MUSCA thorace griseo; abdominalis basi fascia lutea interrupta, marginibus incisurarum exalbidis.

Aet. upf. 1736. p. 32. n. 37. Musca abdomine fusco, annulis luteis, lateribus flavis.

Alb.

Alb. angl. 13. f. M. L.

Reaum. gall. 3. t. 31. f. 8.

Merian. eur. t. 2. *Accordéon* *Adel.*

Habitat in horto academico ubique in floribus.

DESCR. *Musca domestica* major est. *thorax* villis luteis adspersus. *abdomen* nigrum, utrinque juxta basin seu in primo segmento luteum, dein tribus transversis angustissimis albicantibus notatum, que orientur a segmentorum omnium abdominis margine albicante. *femora* nigra. *Tibiae* superius albidae. *frons* pallida. *oculi* nigri. punctum marginale nigrum minimum in medio alae.

1079. MUSCA nigra; segmentis abdominalibus, excepta prima, flavis: medio nigris. *De Geer.*

Habitat in Ostro-Gothia.

DESCR. Magnitudo muscæ domesticæ. segmenta abdominis numero 6, flavæ, linea transversa nigra, at primum totum nigrum. In thorace utrinque duæ maculæ flavæ.

100. MUSCA thorace flavo, abdomine fasciis quatuor luteis transversis: prima majore interrupta.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 36. *Musca subhirsuta*, ab-
domine annulis luteis nigrisque variegato.

Albin. angl. 17. f. I.

Habitat in horto academico ubique in floribus.

DESCR. Facies fere Bombylii. Thorax flavis pilis vestitus. *abdomen* ovatum, in segmento 1:mo par macularum majorum, quod fere coit a tergo; in segmento 2:do par macularum angustiorum, quod coit a tergo; margo hujus segmenti in medio flavus. Segmentum 3:m versus basin transversaliter flavum, ut & margo, hinc exsurgit a tergo abdōminis primo macularum majorum lutearum par, dein tres fasciæ transversæ angustiores, omnes pilis luteis compositæ.

1081. MUSCA thorace striis quatuor flavis, abdominalibus segmentis tribus interrupto flavis.

Reaum. gall. 4. t. 31, f. 1-11.

Frisch, germ., 4, p. 26, t. 13.

Habitat in aquis stagnantibus, ubi Larva longo filo pendula.

DESCR. oculi fusci. Thorax a tergo 4 striis flavis, & tribus nigris latioribus alternantibus. abdominis segmenta fusca, singula fascia flava magna interrupta (posterioribus minoribus) subtus est totum primum & maximum segmentum maxima ex parte flavum. femora postica crassa.

1082. MUSCA nigra, abdomine niveo fasciis duabus nigris.

Habitat in *Potentillæ* floribus aliisque rarius.

DESCR.

DESCR. Musca domestica dimidio minor. oculi fusci. Thorax atter nitidus. abdomen ovatum, niveum, segmento primo in medio versus basin nigro, secundo toto albo, tertio & quarto margine postico nigris, ani albo apice nigro. tota subitus atra; sed tibiae pallidæ, & segmentum primum abdominis subitus album.

1083. MUSCA fusca subhirsuta, abdominalis margine acuto lineis utrinque tribus flavis, quaesta triangulari.
Hoffn. inf. 3. t. 7.

Habitat in Plantis.

DESCR. Musca domestica major. thorax fusco cinereus villosus apice flavus. oculi fusci, lineola transversa obscuriore. Alæ subferrugineaæ. Abdomen ovatum, nigricans segmento singulo apice utrinque (non in medio) flavo, excepto 4:to quod terminatur triangulo flavo. Halteres albi. Antennæ nigrae clavato-subulatae. Femora nigra, tibiis ultimis flavis. facies singularis.

1084. MUSCA fusca; segmentis abdominalibus tribus margine albidis: primo latere flavo, thorace vix maculato.

Goed. belg. 1. p. 20. t. 2. Vermiculus Porcinus.

List. goed. 307. t. 126.

Mer. eur. t. 20.

Blank. belg. 78. t. 10. f. F.

Swamm. bibl. t. 38. f. I-C.

Reaum. gall. 4. t. 20. f. 7.

Raj. inf. 272. Musca apiformis, tota fusca, cauda obtusa, ex ejula caudata in latrinis degente orta.

Habitat in Aquis stagnantibus, cloacis, limilibusque impuris.

DESCR. Musca apiformis fusca hirsuta; abdominalis segmentis margine albidis. Alæ in medio ferrugineaæ. Pedes nigri; tibiæ extrosim albæ. frons albida villosa. segmentum abdominalis primum pallidum, subitus primum abdominalis segmentum ad latera pallidum. Thorax tribus maeulis longitudinalibus obcurioribus notatum. Mira proprietas. larva quæ inter raimenta papyracea aquæ immersa, dum pappus conficitur a bibliopegis, malleis ligneis tunditur, fortissimo prelo comprimitur, tamen vivit incolumis.

1085. MUSCA atra; abdome holofericeo; fasciis quatuor pallidis interruptis.

Habitat frequens vere in floribus *Mali* & *Pyri*, præsertim circa vesperas.

DESCR. Facies muscae domesticæ, sed dimidio minor. Tota atra est. apex Thoracis a tergo duobus punctis pallidis. abdomen atrum, holofericeum. fasciis tribus pallidis seu glaucis in medio dorso interruptis. artus ottimes nigri, alæ membranaceaæ, immaculatae.

1086. MUSCA atra; abdomine cingulis duobus a tergo flavis.

Habitat inter flores.

DESCR. Magnitudo musca domesticæ, vel paulo major. *corpus* totum atrum, glabrum. *abdomen* superne lineis duabus transversis flavis, subtus vero unica transversa flava, quæ aternat cum dorsalibus, notatum. frons lineis duabus flavis; ad basin *thoraci* utrinque macula parva lutea. *pedes* versus apices flavi. *ala* fulcæ, macula obscura.

1087. MUSCA nigra; alis ferrugineis, abdomine cingulis tribus albis: a tergo interruptis.

Habitat inter flores.

DESCR. Est e majoribus, non maximis muscis. *Corpus* totum nigrum, sed *ala* & *pedes* omnino testacea seu ferruginea. Linea alba utrinque ad oculos; circuli tres cingunt æqualiter abdomen, albi, a tergo in medio interrupti, seu cultro dissecti.

1088. MUSCA fusca; marginibus incisurarum abdominis cinereis, alis ferrugineis.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 38. Musca glabra, abdome annulis fuscis pallidisque cincto.

Habitat in floribus, præsertim in hortis obvia.

DESCR. Musca domestica longe major, fuscocinerea, at segmenta abdominis incana, hinc annuli tres abdominis quasi incani; tibiae versus apices nigrae, alias albae. Alæ ferrugineaæ, apicibus aqueis. vix hirsuta est.

d. Aphidivore.

1089. MUSCA abdome ovato nigro: lunularum pari, cingulisque tribus flavescentibus.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 41. Musca nigra glabra, abdome cingulis luteis: superioribus dimidiatis cincto.

Gæd. belg. t. p. 111. t. 41.

List. goed. 315. f. 133.

Habitat in hortis, victans *Larva* aphidibus præsertim Ribis 704.

DESCR. Hæc sequenti facie, magnitudine, figura, simillima; differt solum abdome a tergo duabus lunulis in primo segmento, & dein tribus cingulis transversis flavescentibus, in medio dorso fere angustioribus. *Apex thoraci* a tergo etiam flavescens. Os, pedes, abdomen subtus, flavescentia; in margine exteriore *ala* linea fusca obsoleta.

1090. MUSCA abdome ovato: tribus paribus lunularum albantium.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 39. Musca fusca glabra,
X dor-

dorso abdominis tribus paribus albarum lunularum notato.
Goed. belg. I. p. 99. t. 47. *Proboscis elephantis.*
Lift. goed. 319. f. 134.
Alb. angl. 66.
Mer. eur. t. 89.
Blank. belg. t. 10. f. P.
Reaum. gall. 3. t. 31. f. 9.
Frisch. germ. II. p. 17. t. 22. f. 1.
Habitat Larva in foliis arborum, praesertim Pyri, victitans aphidibus.
DESCR. Nosceatur ab aliis sex lunulis albis per tria paria dispositis in tergo abdominis. Facies praecedentis.

1091. MUSCA oblonga; abdomen flavo: characteribus nigris transversalibus.

Aet. upf. 1736. p. 33. n. 45. *Nomen idem.*

Habitat in floribus: Larva Aphidibus victitans.

DESCR. Reliquis longior & angustior est, tota glabra. *pedes* flavi. *Alae* albæ, nitidae. *Abdomen* tenui, flavum, segmentis primis duobus apice & basi fuscis; reliquis versus marginem exteriorem & posteriorem punctis tribus acutis fuscis, velut characteribus notatis. A sequentibus duabus vix nisi abdominis colore differt.

1092. MUSCA abdomen oblongo: paribus tribus te-tragonorum lutescentium.

Habitat in plantis aphidibus victitans.

DESCR. Sequenti adeo similis, ut facile pro eadem haberetur. *Oculi* fusco-ferruginei. *thorax* æneo-nigricans, nitidiusculus. *Alæ* aquæ, nitentes. *apex thoraci* non flavus, sed thoraci concolor. *pedes* primores 4 flavi, postici 2 nigri, geniculis luteis. *Abdomen* oblongum, lineare, nigrum; macularum flavescentium par in primo segmento minus; in secundo segmento par macularum flavescentium majus exacte te-tragonarum; in tertio etiam simile, sed minus secundo; in reliquis nulla macula; an sexu solummodo a sequenti diversa? abdomen subtus eburneum sive albicans.

1093. MUSCA abdomen oblongo: paribus tribus trigonorum lutescentium.

Aet. upf. 1736. p. 32. n. 43. *Musca fusca, dorso tribus paribus trigonorum luteis notato.*

Habitat in plantarum foliis frequens; ubi *Larva* inter aphides degit. *Pupa* flava, oblonga, hinc acuminita.

DESCR. Inter minores est & oblongas. *frons* flava. *Oculi* fusco-ferruginei.

ginei. thorax æneo-nigricans, nitidiusculus, apice flavo. Alæ aquæ. Abdomen nigro-cærulescens, lineare; In primo segmento par punctorum lutescentium; in segmentis 2.3.4. singulis scilicet horum, par macularum lutescentium, rotundarum, quarum posticum par magis triangulare, angulo posteriora spectante; ultima duo segmenta flava puncto nigro in medio. Abdomen subtus flavum. thorax a lateribus flava irregulari macula. Pedes flavi.

1094. MUSCA abdomine subcylindraceo; tergo tribus paribus lunarum albicantium.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 40. Musca fusca, abdomine oblongo pubescente, dorso tribus paribus albarum lunularum notato.

Habitat inter flores.

DESCR. Corpus incanum. Abdomen pubescens, lunulis minoribus sive thoracem respicientibus; harum lunularum posticum par cohæret cum albedine, qua abdomen subtus tingitur.

1095. MUSCA grisea; abdominis tergo punctis quatuor nigris.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo muscae domesticae. facies Afili vel Musca stercorea, caput nigricans. Alæ membranaceæ, margine anteriore pallidiore. thorax canus. Abdomen tenue, lividum, versus anum fuscum. puncta quatuor longitudinaliter disposita a tergo abdominis, nigra, in singulo segmento singula, femora livida, tibiis pedibusque fuscis.

1096. MUSCA oblonga; femoribus posticis majoribus.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 45. Musca oblonga nigra, abdominis lateribus inæqualiter albis, pedibus posticis longis.

Habitat in floribus.

DESCR. Corpus totum nigrum, angustum, longum, glabrum. Alæ albæ segmenta tria abdominis versus basin utrinque alba sunt. femora posticia saltatoria, reliquis longiora, sed & multo crassiora validioraque, abla utrinque macula. (non tamen semper). Abdominis ultimum segmentum subtus nigrum est, reliqua subtus pallida. frons & thoracis latera albida.

1097. MUSCA abdomine arcubus tribus luteis reflexis.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 42. Musca fusca; abdomine acuminato, circulis luteis retrorsum flexis cincto.

Habitat in floribus.

DESCR. parva est, & musca domestica dimidio minor, angusta & vespa forma. Pedes flavi; frons flava. thorax nigricans, lateribus linea lutea & apice flavus. in abdominis tergo tres lineæ flavæ, arcuatae, arcuum pedibus versus posteriora flexis; primus arcus flavus, in medio interruptus est; secundus vero integer; tertius semi-interruptus; quartus

tus vero interruptus est; quintum segmentum abdominis flavum est, punctis tribus nigris. Abdomen subtus flavum.

e. Auratæ.

1098. MUSCA thorace abdomineque viridi - nitente.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 54. Musca carnivora viridiæneæ, abdomine obtuso.

Mer. eur. t. 49.

Reaum. gall. 4. t. 8. f. 1. & t. 19. f. 8. t. 24. f. 13-15.

Raj. inf. 272. Musca bipennis, carnariæ vulgaris ferre magnitudine, thorace & abdomine supino cæruleo colore pulchro nitente, capite nigro.

Habitat ubique in *cadaveribus*, carnibus & putridis.

DESCR. Musca domesticæ duplo major. totum *corpus*, thorace & abdomine, concolor, scilicet e viridi sericeum sive viridi æneum, valde nitens & politum. *pedes* atri. *oculi* fusci. linea duplex transversim insculpta thoraci. *Abdomen* quatuor articulis, ovatum.

1099. MUSCA thorace cæruleo nitente, abdomine vi-

ridi - nitente.

Goed. Belg. I. p. 233. f. 54.

List. goed. 305. f. 123.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 56. Musca carnivora, pectore cæruleo - æneo, abdomine viridi - æneo.

Habitat in *cadaveribus*.

DESCR. Facies præcedentis, sed minor, muscæ domesticæ æqualis. differt & colore thoracis cæruleo a præcedenti.

1100. MUSCA thorace viridi - nitente, abdomine cæruleo - nitente.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 55. Musca carnivora viridiæneæ, abdomine acuminato.

Habitat in *cadaveribus*.

DESCR. Præcedenti minor. *pedes* longiores. *alæ* magis obscuræ. *caput* & *thorax* viridi - ænea. *Abdomen* cæruleum, nitidum, angustius.

1101. MUSCA thorace nigro, abdomine viridi.

Habitat in *cadaveribus* & putridis.

DESCR. facies omnino sequentis, a qua solum differt, quod paulo maior sit, quod *abdomen* e cæruleo - viridi nitet cupri instar, quodque *frons* inter oculos, una cum antennis & ore, albo aurata sit seu membrana, quod in sequenti non obtinet.

1102. MUSCA thorace nigro, abdomine cæruleo.

Goed. Belg. I. p. 132. t. 53.

List.

Lift. goed. 304. f. 122.

Raj. inf. 271. *Musca carnivora*, abdomine colore cæruleo nitente.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 57. *Musca abdōmine cæruleo obtuso.*

Suecic Spy - Fluga.

Habitat in *cadaveribus & carnibus* calori expositis.

Ubicunque carnes recentes in loco calidiori ad-servantur, semper se fistit, ova deponit, vermiculi sive Larvæ dein carnes putridas consumunt.

DESCR. *Musca domestica* duplo major, *capite & thorace nigro*, solo *abdomine cæruleo* nitido.

1103. MUSCA oblonga; capite viridi, thorace aureo, abdomine cupreo, alis macula fusca.

Habitat in pratis Fahlunæ.

DESCR. Longitudo muscæ domesticæ, sed angustior. *corpus* totum nitet seri instar, glabrum. *caput* viridi-nitens. *thorax* rubro aureus. *abdomen* cupri sive æris colore. *Alæ* albæ, macula fusco absque ferruginis colore.

1104. MUSCA oblonga; thorace æneo, abdomine anterius flavo; posterius nigro.

Act. upf. 1736. p. 32. n. 33. *Musca nigra*, abdomine anterius fulvo, alis immaculatis.

Habitat in pratis nemorosis.

DESCR. Magnitudo muscæ domesticæ, sed magis oblonga figura. *Oculi* fulci. *thorax* viridi æneus. *abdomen* oblongum, in aliis pallido-albescens, in aliis ferrugineum, pone autem semper nigrum unico altero-ve segmento, ita tamen ut luteus color majorem locum semper occuper. *femora* nigra; *tibiæ* annulis albis. *Alæ* aquæ.

5. *Vulgares.*

1105. MUSCA nigra; abdomine nitido tessellato, tho-race lineis pallidioribus longitudinalibus; major.

Aldr. inf. 348. t. 2. f. 16.

Jonst. inf. 70. t. 8. t. 2. f. 16. *Musca decima sexta.*

Frisch. germ. 7. p. 21. t. 14.

Raj. inf. 270. *Musca carnaria vulgaris.*

Habitat in *carnibus* recentibus.

DESCR. Eadem cum sequenti, quam vide.

1106. MUSCA nigra; abdomine nitido tessellato, tho-race lineis pallidioribus longitudinalibus; minor.

X 3

Aldr.

Aldr. inf. 348. t. 2. f. 23. *Musca vulgaris domestica.*
Fl. lapp. 359. n. 517. *Musca domestica.*

Act. upf. 1736. p. 33. n. 58. *Musca domestica.*

Raj. inf. 270. *Musca bipennis major, (minor,) thorace glabro striato, abdomine supino nigro toto: maculis albis punctato.*

Suec. Fluga. *Stugo - Fluga.*

Habitat per totam Sueciam vulgatissima in domibus rusticorum; rara avis in Lapponia; at in Finmarchia Norwegiae integras domos fere replet.

DESCR. Nigra est; oculi rubent, sub his linea alba. Abdomen nigro & incano tessellatum; thorax tribus canis lineis. differt a praecedente, quod dimidio minor; quod non, uti prior, sub volatu bombos edat; quod non ita putrida querat; quodque alter generetur. Sola magnitudo in facie externa distinctam reddit, vix eandem speciem crederem.

1107. MUSCA nigra; fronte alba.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 60. *Musca atra obtusa, fronte alba.*

Habitat rarius in pratis.

DESCR. Magnitudo & facies omnino muscae domesticae, at color magis niger. Abdominis latera parum ferruginea. frons alba, pilis quibusdam nigris. Magis etiam glabra est, quam musca domestica.

1108. MUSCA nigra; abdomine atro glabro.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 59. *Musca abdomine atro obtuso glabro.*

Goed. belg. I. p. 33. f. 55.

List. goed. 305. f. 124.

Habitat cum praecedenti.

DESCR. Facies praecedentis, & magnitudo & color idem; sed frons albedine caret, & abdomen magis atrum, glabrum.

1109. MUSCA atra glabra, oculis ferrugineis, femorum basi pallida.

Goed. belg. I. p. 132. t. 73.

List. goed. 314. f. 132. *Vermiculus casei.*

Frisch. germ. I. p. 30. t. 7. *Vermiculus casei.*

Habitat in Caseo, cuius Larva caseum consumit.

DESCR. Musca parva est, magnitudine culicis. tota glabra, nitida. Oculi ferruginei; Alæ immaculatae; os pallidum; pedes nigri basi pallidi.

1110. MUSCA atra glabra, margine alarum crassiore nigro.

Habi-

Habitat in fmetis copiosissime & instar grandinum, an Præcedentis varietas? sic certe videtur.

DESCR. Musca parva est magnitudine culicis. tota glabra nitida; oculi subferruginei. & omnino præcedentis. *Alis* albis margine crassiore nigra linea. *Os* nigrum. *Pedes* toti atri. *Halteres* soli albi.

1111. MUSCA nigra subpilosa; oculis ferrugineis, alis nervosis.

Habitat in cellulis cerevisia & vino refertis ad potum.

DESCR. Musca parva nigra, pilis quibusdam vagis adspersa. *Abdominis* segmenta sex, nigricante basi pallidiora. oculi ferruginei. *Alæ* albae tribus longitudinalibus nervis, margine crassiore solidiore.

1112. MUSCA cinerea; thorace quinque maculis nigris, abdomine maculis tridentatis.

Habitat in viis frequens, & in plantis vulgaris, tædiosissima sub instante pluvia.

DESCR. Facies muscæ domesticæ omnino, sed dimidio minor. oculi rufi. thorax cinereus, maculis duabus parvis ad basin, tribus longioribus majoribus in medio, & supra apicem thoracis macula nigra, bipartita. abdomen ovatum, canum, 4 segmentis: quorum 1 immaculatum; 2 ad basin fascia retrorsum tridentata; 3 simile secundo; 4 etiam simile secundo ac tertio, sed denticulus maculae intermedius vix conspicuus.

1113. MUSCA flava; abdomine supra fusco, thorace tribus striis nigris.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Magnitudo pediculi. caput flavum. oculi nigri. vertex macula triangulari nigra testus. Thorax a tergolineis tribus longitudinalibus nigris, quarum intermedia cum capite cohaeret, laterales vero a capite distinctæ; apex thoracis flavus. alæ aqueæ. abdomen flavum, a tergo fuscum. antennæ fuscae.

1114. MUSCA flava; oculis nigris.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Hæc parva est, magnitudine feminis oryzæ. Tota flava; abdomen ovato. alæ aqueæ, parum flavescentes. oculi soli nigri.

Culex.

1115. CULEX fuscus; rostro bifurco.

Raj. inf. 74. n. 4. *Tipula domesticæ* forte fæmina, prima furcula e fronte.

Reaum. gall. 4. t. 40. f. 1. 2.

Habitat hujus Larva in aqua; Culex non vulnerat.

DESCR. Culice sequente duplo major; color cinereus, alæ absque puncto. anterius minus plumosæ in mare. Rostrum prominens, ut in reliquis,

ubi vagina apice bifurca, dilatata in duo foliola patula, lanceolata, villosa, intermedio rostro fetaceo.

III16. CULEX cinereus; abdomen annulis fuscis octo.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 10. *Culex vulgaris.*

Flor. lapp. 363. *Culex vulgaris.*

Reaum. gall. 4. t. 43. f. omnes. ♂ t. 44. f. omnes.

Swamm. quart. 95-99. t. 2. 3. *Culex.*

Blank. belg. 171. t. 15. f. A. B. C. D. *Culex.*

Flor. Lapp. 364. *Culex alpinus.*

Suecic Mygg. *Ostrobotnienibus* Kranck.

Habitat Larva in aquis, *Culex* ipse in *sylvis*, præsertim *Lapponia*, nec non rarius in alpibus, ubi *major* est, sed una eademque species. Hominibus & animalibus sono alarum & sanguinis suetu molestissimus, præsertim noctu. Dum vulnerat sanguinemque haurit pedes posteriores erigit.

DESCR. *Corpus* oblongum, cinereum, *abdomen* octo zonis fuscis. *Rostrum* rectum, sericeum. *Alæ* albicantes, vasculosæ, ad lumen nitentes. *Thorax* subitus hirsutus.

III17. CULEX alis aqueis: maculis tribus obscuris.

Flor. lapp. 365. *Culex Lapponicus minimus.*

Act. upf. 1736. p. 31. n. 12. *Culex Lapponicus minimus.*

Derrham. physico-theol. l. 4. c. 11. n. 20. f. 5. 6. 7.

Culex minimus nigricans maculatus. an?

Suecic Swidknott.

Habitat in *sylvis*, copiosissime in *Norlandia*. a moratu macula pulicis instar nigricans, diutius hærens, dolens.

DESCR. *Corpus* magnitudine minoris pulicis, fuscum. *Alæ* angustæ, albae, incumbentes, margine exteriore tribus punctis obscuris notatae; hinc clausis alis & conniventibus punctis, fasciæ tres transversæ fuscæ in alis.

III18. CULEX niger; alis aqueis, pedibus nigris: annulo albo.

Lapponicus Mockere.

Suecic Knott.

Habitat in *Lapponia*, ante vesperam præsertim copiose infestans; minus in *Suecia* frequens. Legio horum infestat homines occidente sole, tædiosissimi sono

sono & reptatu per cutem, os, oculos, nasum inquietantes; non pelluntur, uti reliqui, oris flatu aut manuum agitationibus.

DESCR. Minimus est, facie muscae, magnitudine pulicis, vix lineam longus, satis angustus. *thorax* cinereo-ceruleo; *caput* nigrum. *antennæ* filiformes, pallidæ. *oculi* nigri. *abdomen* ovatum, fuscum. *Halteres* albi. *pedes* nigri medio geniculo niveo. pars thoracis postica sape albicans. *Alæ* aquæ incubentes, ut unicam modo aliam species, sed pone parum dehiscentes.

Utrum genuina sit species culicis, vel an *Tipula*, vix adsevero, cum ad rostri apicem sint duo tentacula seu antennæ, uti in *Tipulis*; mordet vero, quod *Tipulæ* non faciunt.

1119. CULEX lanigerus; alis semifuscis.

Aldr. inf. p. 350. f. 10. Musca X.

Mouff. lat. 64. f. 5. a sinistris.

Hoffn. inf. t. 8. f. 5.

Pet. gaz. 56. t. 36. n. 5. Musca apiformis, proboscide porrecta, alis maculatis.

p. 67. t. 42. n. 9. Musca apiformis, proboscide porrecta, alis non maculatis.

Raj. inf. 273. Musca bombyliformis dense pilosa nigra, abdome obtuso, ad latera rufo.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 14. nomen Petiveri.

Habitat in hortis, *floribus inhians*, quorum mel haurit volitando, nec sedendo, animal non mordens.

DESCR. Differt hæc a reliquis facie, & in quibusdam etiam ore, tamdiu locum hic concessi, usque dum certiora innoteuant. *Rostrum* longum, semper exsertum. *alæ* dimidium longitudinaliter fuscum, quod scilicet margini crassiori adjacet; album, quod teneriori proximum. *Toruum* corpus nigrum, sed hirsutæ & lana albida undique vestitum *Bombyllii* instar, unde facies exsurgit singularis.

1120. CULEX ater; abdomine fusco, fronte alba.

Flor. lapp. 359. Musca minima atra sanguisuga, alis albis.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 51. nomen idem.

Habitat ætate in *Equis*, præsertim *Norlandiae*, currendo inter crines & audacter sanguinem sugendo, mire Equos vexat, non adeo homines; celerrime currit, nil timens.

DESCR. Utrum pro specie muscae aut culicis sit certo habendus, vix novi, qui os non examinavi. *antennæ* filiformes & modus sanguinem hauriendi culicis est, facies licet muscae. *caput*, *pedes*, *thorax* atra; thoracis latera tamen cinerascant; supra & infra oculos regio alba est. *antennæ* filiformes, ovatus & minimus est.

Tipu-

Tipula.

* Majores, proprie *Tipulæ dictæ, alis patentibus.*

1121. TIPULA alis exalbidis: macula nivea: rivulis fuscis.

Raj. inf. 72. n. 2. Tipula maxima, alis majoribus ex fusco & albo variegatis.

Act. upf. 1736. p. 50. n. 1. Tipula lapponica cinerea, alis albis: rivulis fuscis.

Act. stockb. 1739. t. 3. f. 8. ubi hanc delineavi.

Habitat *Ubmœ in Wcstro-Botnia, ubi eam quoniam invenimus.*

DESCR. Maxima est, vel reliquis nullis minor. *Corpus & abdomen cinereo fuscum: cauda bifida. alæ aqueæ seu exalbidæ; rivulus fuscus secundum marginem exteriorem longitudinaliter extenditur, qui ramum versus marginem interiorem oblique emittit, & inde oblique extrorsum, ubi coadunatur cum eodem, a quo ortus; macula magna nivea occupat spatium sub ramificatione maculæ fusca. Adeoque inter omnes nostras speciosissima est.*

1122. TIPULA alis fusco-variegatis.

Habitat - - -

DESCR. Mediae magnitudinis est; *corpus totum cinereo fuscum. alæ subcinereæ, versus marginem anteriorem fasciis quatuor vel quinque fusca; versus marginem posteriorem circulis tribus fusca, cum puncto in medio fusco. Pedes grisei. femora versus apices annulo nigro cincta. antennæ 14 articulis, quorum 1 rectus, oblongus, niger, 2 globoso-gibbus, 3-13 subrotundi, 14 acuminatus.*

1123. TIPULA corpore nigro fulvoque variegato.

Raj. inf. 72. n. 4. Tipula elegans, dorso & scapulis nigris, ventre croceo, alis macula fusca notatis, lævis & splendens.

Act. upf. 1736. p. 30. n. 2. Tipula abdomine annulis luteis nigrisque alternantibus.

Habitat in *Roslagia.*

DESCR. *Corpus atrum & saturatissime nigrum est. articuli abdominalis, excepto exteriore margine, croci seu fulvi; variae liture fulvae in ipso thorace. alæ subfulvescentes, venis fusca, puncto marginali obscuro. Femora versus basin lutescentia.*

1124. TIPULA alis exalbidis: linea marginali fusca.

Gœd. belg. 2. p. 165. t. 44.

Lift. gœd. 331. f. 139.

Bradl. natur. p. 25. f. 3.

Frisch.

Frisch. germ. 4. t. 12. ~~fig. 1~~

Reaum. gall. 4. t. 11. f. 7.

Leeuwenh. epist. 1693. dec. 20. f. 4. 5. & 1714. oct. 26. f. 4.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 6. *Tipula cinerea*, alis cinereis margine exteriore fusco.

Habitat in terra inter radices olerum ipsa Larva.

DESCR. *Tota cinerea.* *alæ membranacei coloris*, margine exteriore longitudinaliter (non tamen usque ad summum apicem) linea lata, longa, fusca pictæ, quæ linea quasi ex plicis constat; sub hac linea ala albidior est.

1125. **TIPULA** alis exalbidis: maculis albis sparsis obsoletis.

Act. upf. 1736. p. 30. n. 3. *Tipula cinerea*, alis cinereis: vasis fuscis maculisque albis.

Raj. inf. 72. n. 6. *Tipula vulgari* similis, sed multo minor, alis fuscis: maculis albidioribus & nervis magis opacis.

Alb. inf. t 61. f. F. mas. G. fæmina.

Suecic Harkrank.

Habitat ubique communis.

DESCR. *Tota cinerea.* *alæ cinerascentes*, maculis aliquot albis vix manifestis sparsis; vasaalarum fusca sunt, absque macula aliqua obscura marginali.

1126. **TIPULA** alis cinerascentibus: lanula alba marginali.

Act. upf. 1736. p. 30. n. 4. *Tipula cinerea*, alis fuscis, macula lunata alba.

Raj. inf. 73. n. 10. *Tipula septimæ* similis, paulo tamen major: oculis viridiscentibus.

Habitat cum prioribus in cultis.

DESCR. Noscitur a reliquis facile alarum colore cinereo una cum venis unicoloribus in loco, ubi punctum marginale solet collocari, hic *Lunula* alba. *Dorsum* abdominis fuscum.

1127. **TIPULA** alis glaucis: puncto marginali corpore que atro, pedibus rufis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Est inter maximas sui generis. capite, thorace, abdome atris. Pedes omnes ferruginei. antennæ atræ, articulis duodecim, longitudine thoracis. alæ glaucæ, præsertim inter punctum marginale & corpus, vasis nigricantibus, puncto marginali majusculo atro. basis *abdominis* parum ferruginea. *anus* fæminæ in stylum trivalvem definit.

1128. TIPULA alis subcinereis: vasis fuscis: puncto marginali obscuro, dorso abdominis nigricante.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 5. **Tipula cinerea**, alis fuscis: vasis nigris, macula lunata nigra.

Frisch. germ. 4. p. 24. t. 12. **Tipula terrestris major.**
Habitat vulgaris per Sueciam.

DESCR. Corpus obscurum seu nigrum; latera flava; thoracis lituræ luteæ. alæ subcinereæ, vasis fuscis nigricantibus, macula seu puncto marginali nigricante.

1129. TIPULA alis albidis: puncto marginali fusco, dorso abdominis cinereo.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 7. **Tipula incarnata**, alis cinereis puncto nigro.

Frisch. germ. 7. p. 30. t. 22. **Tipula terrestris media.**
Habitat cum præcedentibus.

DESCR. Differt a præcedentibus, quod dimidio minor tam mas quam fæmina. Pedum geniculæ nigra. corpus subincarnatum. alæ aqueæ, vasa cinerascentia, punctum marginale ferrugineum seu fuscum.

1130. TIPULA alis membranaceis: puncto fusco, abdome flavo: lineis tribus fuscis longitudinalibus.
Habitat passim inter arbusta.

DESCR. Est inter majores, non maximas, numeranda. Alæ aqueæ, puncto fusco, abdomen flavum: lineis tribus longitudinalibus fuscis, quarum una in dorso, una in singulo latere. apex abdominis fuscus. thorax flavus a tergo lineis tribus fuscis.

1131. TIPULA alis albidis: macula pallida obsoleta, corpore nigro luteoque variegato.

Act. upf. 1736. p. 31. n. 8. **Tipula cinerea**, alis cinereis immaculatis.

Habitat cum reliquis.

DESCR. Alæ aqueæ, vasis pallidis, puncto marginali obscurore macula pallida. Corpus viridi nigroque variegatum, præsertim pectus, perbelle pictum. Magnitudo media seu proxime præcedentis. Maris cauda obtusa, pene capillaris, longissima. Fæmina cauda acuta, ut in reliquis.

1132. TIPULA alis fuscis, corpore atro.

Smolandis Polsa.

Habitat in Uplandia rarius.

Larvæ latent in terra pingui humida radices consumentes.

DESCR. Est e media magnitudinis. Alæ fuscæ, vasis nigricantibus cum puncto

puncto marginali. thorax & abdomen atra. Pedes fuscii. Fæminæ gaudent podice subulato, Mares vero obtuso.

1133. TIPULA flava; dorso fusco.

Habitat in Scania. D. Leche.

DESCR. Mediae magnitudinis five Calice vulgaris paulo major. Alæ aquæ, immaculatae. Corpus flavum, sed caput, thorax & abdomen a tergo fusca. Pedes longi.

1134. TIPULA alis nigro-maculatis, corpore nigro.

Habitat in hortis passim.

DESCR. Est mediae magnitudinis Speciebus. alæ aquæ, nervosæ triplici fascia punctorum conglomeratorum nigrorum; singulam fasciam punctum interjacet nigrum justa marginem majorem alæ. torum corpus nigrum, etiam oculi. Pedes lividi. antennæ quindecim articulis.

* Minores Culciciformes, alis incumbentibus.

1135. TIPULA thorace virescente, alis membranacei coloris: puncto nigro.

It. oeland. 40. 41. 86. 160.

Reaum. gall. 4. t. 14. f. 12.

Gœd. belg. 3. p. 35. f. X. quoad figuram.

Lift. gœd. 336. f. 140. quoad iconem.

Habitat hujus Larva in mari; latitat sæpe intra tubulos filiformes molles argillaceo-glareofos, quos construit longissimos. Tipulam ipsam nullibi frequentiorem vidimus, quam in Oelandiæ lucis.

DESCR. Hæc culice 116. duplo major est. Alæ incumbentes, membranaceæ five aquæ, puncto nigro in medio alæ, ad marginem exteriorem ex anastomosi duorum vasorum orto. Corpus fuscum, sed nuper exclusum omnino viride, præsertim ad latera thoracis versus abdomen. hirsuties vix ulla in toto corpore; incisurarum margines pallidiores. Gibber seu fæculus sub thorace. Pedes antici reliquis longiores, non tameu elevati. os antennulis incurvis, non pungens. MAS antennæ plumosis ex pilis pallidis undique spectantibus, & ano seu cauda elevata, bifida. FÆMINA antennæ modo villosis, cauda non elevata, nec alis longiore. LARVA filiformis, longa, lète rubra, mollis, 12 articulis composita, cauda bifida. Pedes duo pone caput & totidem ante caudam, omnes absque unguibus, obtusi, apice pilis ciliati. in penultimo segmento paria duo cirrhorum filiformium pedibus ipsis longiorum.

1136. TIPULA fusca; abdomine anteriore viridi.

Habitat in nemoribus.

DESCR. Caput, thorax & tria posteriora segmenta caudæ abdominis fusca five nigricantia. Abdomen teres, viride, exceptis articulis ultimis. Alæ albæ, immaculatae. pedes longi, ex parte albi. Antennæ maris plumosæ, fuscae. Magnitudo Culicis vulgaris. Pedum genicula nigricantia. Pedes antici longissimi.

1137. TIPULA pedibus anticis maximis antenniformibus motatricibus : annulo albo.

Frischi germ. II. p. 7. t. 13. *Culex luteo viridis*, pedibus antenniformibus.

Habitat in pratis graminosis & lucis in gramine juxta terram, Larva autem in aqua.

DESCR. *Corpus* in aliis dilute viride, in aliis nigro & incarnato variegatum; a tergo thoracis linea tres, quarum intermedia brevior. *Pedes* anti- ci duplo longiores, quos sedens erectos tenet & motitat instar antennarum, quas habet breves, in mare plumosas, non ita in sazina. Omnes pedes annulo nigro cinguntur.

Obs. Datut & alia species major, magnitudine, colore & facie Culicis vulgaris, quæ itidem pedes longos motitat.

1138. TIPULA pedibus anticis maximis antenniformibus motatricibus : apice albis.

It. ael. 160. nomen idem.

DESCR. Hæc antecedenti duplo major. *Abdomen* tenué, viride. *thorax* a- ter; *pedes* albidi, sed antice versus basin nigri. *Antennæ* fuscæ, in mare plumosæ.

1139. TIPULA pedibus albis : annulis novem nigrican- tibus, alis albo cinereoque maculatis.

Habitat in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Magnitudo Culicis vulgaris. *Alæ* albo cinereoq[ue] valde macula- tæ. *Pedes* longi, nivei, singuli annulis circiter novem fuscis, belle varie- gati, quibus ab omnibus facile distinguitur.

1140. TIPULA viridis ; alis albis immaculatis.

Habitat copiose in altissimis montibus *Norrstelle*.

DESCR. Culice vulgari minor. *Corpus* totum pallide flavum. *Pedes* longi virides, antici longissimi. *Antennæ* brevissimæ: maris pectinatae. oculi ni- gri. *Alæ* incumbentes, striatæ.

1141. TIPULA corpore subflavo, oculis thoracisque tergo nigris.

Habitat passim rario.

DESCR. Vix pediculo major; *ala* alæ incumbit, quasi unica esset, nitida. *Corpus* subflavum, a tergo thoracis nigrum; *oculi* magni, nigri, caput quasi nigrum efficiunt. *Antennæ* nigrae, articulis decem globosis. *Alæ* aqueæ, nervis tribus, quorum marginalis cum apice intermedio jungitur; at nervus intius versus basin marginis bifidus est.

1142. TIPULA atra; thorace gibbo, pedibus posticis magnis.

Att. upf. 1736. p. 31. n. 16. *Culex niger*, pectore gibbo, abdomen cylindraceo, pedibus posticis maximis.

Ha-

Habitat in sylvis, ubi in aëre gregatim saltat ac volitat.

DESCR. Corpus totum nigrum, thorax valde crassus, gibbus. Abdomen tenuis, cylindricum. alæ albae, ovatae, pedes nigri, postici reliquis duplo & crassiores & longiores, tibiis clavatis seu versus inferiora crassioribus.

1143. TIPULA nigra glabra; alis nigricantibus, antennis capite brevioribus, femoribus anticis introrsum fulcatis.

Reaum. gall. 5. t. 7.

Habitat frequens in fmetis & vaporariis hortorum primo vere.

DESCR. Longitudo muscae domesticæ, sed multo angustior; totum Corpus & artus omnes nigra. Antennæ capite fere breviores, incurvatae, bovinum cornua referentes, nigrae, singula septem articulis constat, quasi perfoliatæ essent, hinc brevissimæ; sub os duæ antennulae inflexæ. Os proboscis eit, non aculeus. Abdomen maris lineare & atrum, feminæ vero subitus flavescens crassum. Alæ nigricantes, margine exteriore in medio nigra obscura macula, vel saltem margine ipso magis atro. Thorax glaber est, pone carinatus. Alæ incumbentes; femora antica crassiora, interiore latere sulco longitudinali exarata.

1144. TIPULA fusca; alarum basi cinerea.

Frisch. germ. 4. p. 37. t. 2. Musca vermis rerum putridarum.

Habitat in terra, primo vere frequens in vaporariis, sedens in vasis & testis.

DESCR. Magnitudo pediculi; Tota fusca. Abdomen glaucescens. Antennæ filiformes, longæ, 14. articulis constantes. thorax gibbus. Halteres exalbidi.

1145. TIPULA atra oblonga hirta; alis nigricantibus.

Act. upf. 1736. p. 33. n. 61. Musca oblonga atra hirsuta, alis fuscis incumbentibus, pedibus nigris.

Pet. gaz. 22. t. 14. f. 4. Musca oblonga nostras nigra.

Goed. belg. I. p. 31. t. 6.

Lift. goed. 260. t. 108.

Reaum. gall. 5. t. 27. f. 1. 2. 3.

Habitat saepius apud ægros febre intermittente laborantes.

DESCR. Magnitudo muscae domesticæ, sed magis oblonga, toto corpore & pedibus nigra, pilis hirsuta. Alæ dorso fibi in icem incumbunt, ac si unica esset ala; sunt etiam e membranaceo seu aquo colore in nigredinem transeunte; certe margo alarum exterior omnino niger est.

1146. TIPULA atra holosericea.

Habitat in ramis arborum, præsertim in *Malis post pluvias*; copiosissima in *Belgio*, rarer in *Suecia*.

DESCR. parva est musca, aterrima, holosericum superficie referens, mollis; lente inspecta tota pilis tenuissimis densis vestita cernitur.

1147. TIPULA alis albis: margine exteriore nigris, thorace abdomineque rubro.

Aet. upf. 1736. p. 33. n. 62. Musca corpore rubro, capite pedibusque nigris, alis albidis: margine exteriori nigro cum puncto.

Habitat in *Asparago* & *floribus* arborum.

DESCR. Magnitudo Musca domesticæ. *caput* parvum, nigrum. *thorax* & *abdomen* rubra, glabriuscula; ubi abdomen jungitur thoraci nigredo a tergo appareat. *Alæ* albae, sed margo crassior longitudinalis ater est. *pedes* nigri. *femora* longa. *sexus* variat; alter totus ater est, sed femora longa & crassiuscula.

1148. TIPULA alis deflexis cinereis ovato-lanceolatis ciliatis.

Aet. upf. 1736. p. 31. n. 13. Culex alis depresso-margine villosis.

Frisch. germ. 11. p. 6. t. 11. Culex parvus, cinereus, alis pendulis.

Leuwenh. epist. 1692. jun. 24. p. 473. f. 2. 3.

Habitat in *parietibus* ad sterquilinia, & ubi venti silent.

DESCR. Minima est. Alis, ratione magnitudinis, maximis, ad latera deflexis, ut in Phalænis; *Alæ* sunt lanceolato-ovatae, undique ciliatae, striatae, acute. *Antennæ* filiformes, cinereæ, articulis XI. nigricantibus, globosis, construæ.

1149. TIPULA atra; alis albis, abdominis latere antice macula alba.

Habitat in plantarum foliis.

DESCR. Musca domestica minor. *thorax* glaber cum toto corpore, ater; *Antennæ* XI. articulis, quasi perfoliatæ: *punctum* unum utrinque in singulo latere abdominis juxta pectus album; margo thoracis interdum albus conspicitur, quasi lineola arcuata, reliqua omnino atra.

1150. TIPULA alis incumbentibus glaucis: margine inferiore villosis.

Smolandis Kikbaer.

Habitat in *Junipero*. Ex ovo deposito in apicibus ramorum Juniperi enascitur ibidem æstate quodam

dam Triglochin (quo Smolandi in Tussi ferina utuntur rustici,) constans foliis tribus crassioribus, conniventibus, ventricosis, ore patulis, intra quæ tria alia foliola, minima exæcte conniventia, ne ærem admittant, includentia Larvam rubram, quæ Majo mense in Pupulam rubram, alis nigris, pedibus albis mutatur, & hæc in Tipulam; quæ sc̄epe consumitur ab Ichneumone ultimo. Gallæ istæ rubræ in foliis & petiolis *Populæ tremulae*, magnitudine pisorum, etiam muscam, Juniperi & Salicis simillimam, & forte eandem, producunt; sed hanc sufficienter non examinavi.

DESCR. Facies Culicis. *Pedes* animaleculo longiores. *Antennæ* seraceæ si-
ve moniliformes, articulis circiter 14 globosis, remotis, pliis aliquot vagis ornatae. *Caput* minimum. *Oculi* nigri. *Thorax* & *Abdomen* fuscō-
rufescens; hūmeri gibbi. *Alæ* membranaceæ, margine exteriore nigri-
eante, præter nervos in singula binos at margo alarum exteriōr villo-
sus est. *Halteres* sub alis, ut in reliquis.

OBS. Frisch. germ. 4. p. 38. t. 21. Musca vermis rubri gemmarum Salicis
multa communia cum nostra habet, ut dubitemus an specie diversa:
cum Lāva, Pupula & Tipula ipsius plurima attributa eadem, & margo
alarum inteiōr hirsutus.

1151. TIPULA atra; abdomine rufescente.

Habitat in flore *Iridis luteæ palustris* 33 frequens.

DESCR. Hæc omnium minima, vix pulicis magnitudine; grandinis in-
stār copiosa supra aquas, lacus & paludes æstate volitat. *Alæ* huic in-
cumbentes. *Abdomen* ovatum.

1152. TIPULA capite atro, antennis corpore incarnato longioribus.

Habitat inter *Carduum* 658 media æstate, præfer-
tim ad Oestunaberg.

DESCR. Minima est & pulicē fere minor. *Caput* nigrati fronte albida.
Thorax a tergo fuscus. *Antennæ* & pedes nigri longi; *Alæ* abdomine
longiores membranaceæ incumbentes. *Antennæ* corpore & alis sesqui-
longiores.

VII. APTERA.

Pediculus.

1153. PEDICULUS hilmanus. Rbed. exper. t. 18. Pediculus ordinarius. Mouff. lat. 259. Pediculus. T. Swamm.

Swamm. quart. 169. *t. 7.* *Pediculus.*

Bonan. microgr. *f. 55.*

Anon. angl. *p. 203.* *f. 11.*

Merr. pin. 202. *Pediculus in capite simpliciter.*

ib. *Pediculus corporeus maculatus.*

Suecis Luus.

Habitat in homine, præfertim in capite puerorum, & vestimentis Nautarum, militum &c. Maximos in Fodinæ Fahlunensis cryptis calidioribus reperi. Qui in vestimentis vixit ab eo, qui in capite vivit, non differt ut species, sed tantum varietas.

1154. PEDICULUS pubis.

Rhed. exp. t. 19. *f. 1.* *Pediculus inguinalis.*

Pet. gaz. t. 67. *f. 9.* *Pediculus inguinalis.*

Mouff. lat. p. 200. *Pediculus ferus.*

Raj. inf. 8. *Pediculus ferus.*

Merr. pin. p. 202. *Pediculus morpio.*

Suecis. Flat - luus.

Habitat in hominum immundorum pube & ciliis.

1155. PEDICULUS Bovis; abdomine lineis transversis octo ferrugineis.

Suecis Roed - luus.

Habitat in Vaccis; hæc minor est species; datur & altera quæ major & insequens.

DESCR. *Totus albus, minimus. Caput testaceum. Pedes testacei, apice albidiiores. Abdomen album, lineis octo testaceis transversis in dorso; quinque fasciis transversis in yentre; quæ omnes lineæ non tangunt marginem seu latera, latera tamèn obscuriora reliquo corpore five punctis octo ferrugineis notata.*

1156. PEDICULUS Bovis: abdomine plumbeo.

Suecis Blåluus.

Habitat in Bobus.

DESCR. Præcedenti major; *abdomine ventricoso, acuminato, cœruleofusco; pedibus brevibus, crassis, griseis, ut & capite & thorace griseis.*

1157. PEDICULUS Falconis Tinnunculi.

Rhed. inf. t. 13. *Pediculus Tinnunculi.*

Habitat in *Falcone Tinnunculo s. Cenchride* 67.

DESCR. Inter omnium maximos pediculos, quos unquam vidi, hic erat:

Corpus

Corpus depresso, ovali-oblongum. Caput antice obtusum, versus autrum regionem utrinque retrotum obtuse sagittatum. Thorax marginatus fore, ut in Catabo seu Caecatide. abdomen in 9 sive 10 segmenta divisum, margine omnino integro, linea notato. Palatum protinet. angues solitarii, in vola manus spongiosum quid; femora versus apicem intorsum quasi mutilata.

1158. PEDICULUS Corvi.

Rhed. exper. t. 16. Pulex Corvi.

Habitat in Corvo vulgari sive maximo 69.

DESCR. abdomen ovali-oblongum utrinque contractum, depresso, plenum, cinereum, lineis ad incisuras duodecim vel decem nigris. Collum brevissimum. caput minimum, nigrum. pedes brevissimi. Antennae brevisimæ, retrorsum flexæ. Substantia animalculi tenacissima, licet digitis validissime pressum, tamen vivacissimum & curvans.

1159. PEDICULUS Picæ Lapponicae.

Act. upf. 1736. p. 37. n. 3. Pediculus Turdi Merulae montanae dicti.

Habitat in Pica Lapponica Merula Saxatili dicta 187.

DESCR. Abdomen ovatum, gibbum, diaphanum, pallidum, utrinque ad basin squamula veluti ala sputia notatum. Thorax angustissimus, brevis. Caput minimum, subrotundum, obtusum. oculi nigri. antennæ longitudine corporis, tenuissimæ, albæ. Pedes tenuissimi, fatis longi; magnitudo minimi pediculi capitidis, valde tener, facile solo tactu conquassatus.

1160. PEDICULUS Meleagridis.

Red. exper. t. 1. f. 2. Pediculus accipitris.

Habitat in Meleagridide s. Gallo pavone 164.

DESCR. Caput planum antice rotundatum, pone dentato angulatum, margine retrosum subulatum, Thorax medio cordatus, utrinque angulatus. Abdomen griseum 8 vel 10 incisuris longitudinaliter in medio album. Antennæ breves: affinis Pediculi gallinæ 1166 macula fusca verticis.

1161. PEDICULUS Sternæ.

Habitat in Sternæ secunda 128.

DESCR. Caput trigonum, latum, obtusum, pallidum. Thorax brevissimus, angustissimus. Abdomen ovatum, longitudine anterioris corporis in medio longitudinaliter nigricans. antennæ brevissimæ, capillares. Pedes brevissimi, crassi: quotum antici brevissimi sub capite. abdomen subtus concavum.

1162. PEDICULUS Gruis.

Rhed. inf. t. 3. Pulex Gruis.

Frisch. germ. 5. p. 15. t. 4. Pediculus gruis.

Habitat in Grue proprie dicta 131.

1163. PEDICULUS Recurvirostræ. It. æl. 90.

Habitat in Numenio Recurvirostro albo nigroque-variegato. 137.

DESCR. *Corpus fuscum, oblongum. Caput obsolete triangulum, acuminatum, linea transversalis excavata in medio. Abdomen oblongum, fere lineare, in medio paulo latius, incisuris octo. pedes breves, curvi. Antennæ breves, parvæ, capitatae.*

1164. PEDICULUS Hæmatopi. It. æl. 90.

Habitat in *Hæmatopo bellonii* 161.

DESCR. *Magnitudo pulicis. totus glaucus. Caput subrotundum, glaberrimum, convexo-planum. Abdomen obverse ovatum incisuris decem, transversis, pallidis. Pedes breves. antennæ brevissime. Thorax angustissimus. pili ad latera posterioris abdominis.*

1165. PEDICULUS Gallinæ, abdominalis margine nigro.

Rhed. inf. t. 16. Pulex capi.

Frisch. germ. 11. p. 24. t. 24. Pediculus galli.

Habitat in *Gallina domestica* 165.

DESCR. *Magnitudo ovi pediculi humani (seu Lendis.) Corpus depresso, caudam versus obtusum; abdominalis latera nigra, dorso albo diaphano; macula nigra versus caput; quæ cor transparens: caput album; antennæ motitat.*

1166. PEDICULUS Gallinæ: thorace capiteque utrinque mucronato.

Habitat in *Gallina* 165. Rustici nostri pediculis laborantes gallinas curant pulvere piperis butyro mixto & subacto, quod gallinis devorandum præbent, experimento raro fallente.

DESCR. *Pediculæ vulgari minor: Corpus pilis griseis adspersum. abdomen oblongum, ovatum, 8 vel 9 incisuris. Caput lunatum: cruribus posteriora spectantibus. antennæ brevissimæ. Thorax utrinque angulo acute recto mucronatus.*

1167. PEDICULUS Lagopi.

Act. upf. 1736. p. 37. n. 2. Pediculus Tetraonis Lagopi dicti.

Habitat in *Tetraone Lagopo* 169.

DESCR. *Corpus depresso, utrinque obtusum. abdomen antice angustum, pone dilatatum. figura fructus Bursæ pastoris aut Veronicæ capsulae, cinctum margine nigro introsum ferrato. Caput absque thorace notabiliter adfixum, utrinque obtusum, lateribus emarginatum.*

1168. PEDICULUS ligni antiqui.

Blank. belg. 169. t. 14. f. F. Pediculus ligni.

Raj. inf. 8. Pediculæ cognatus & similis.

Bratl. natur. t. 27. f. 3.

Derrham. act. angl. n. 271. p. 231.

291. p. 1586.

phy-

physico-theol. p. 119. Pediculus pulsatorius,
fatidicus, mortisaga.

Allen. act. angl. n. 245. p. 376.

Habitat in antiquis lignis, Libris diu relictis, muris;
currit solitarius.

DESCR. *Corpus oblongum, pallidum. oculi flavi. antennæ setaceæ, longitudine (in plerisque) ipsius corporis; macula fusca annularis intra abdomen & pone hanc versus anum punctum fuscum: segmenta abdominis ad latera punctis rufis singula notata sunt.*

Obs. de Blankardi, Raji, Bradlei synonymis nullum dubium; de Derrhami & Allenii hæsito.

1169. PEDICULUS Adonidum.

Act. upf. 1736. p. 37. n. 8. Pediculus hybernaculorum arboreus villosus.

Habitat in *arboribus Hybernaculorum.* Ex Anglia in Belgium redux mecum adduxi arbores rariores, in una aliquot horum pedicularum, quos studiose a frigore defendebam; in Hybernaculum Cliffortianum illatis arboribus hos paucos pediculos ab Hortulani injuriis data opera conservavi, sed me incio intra aliquot hebdomadas multiplicati omnes frutices occupabant, deturpabant, ut nec dein expelli possent; infecere dein Hybernacula Leydensia & alia, quæ plantas ex Hypocaustis Cliffortianis obtinebant.

DESCR. *Corpus torum album, ovatum, oblongum: Cauda bifida; latera undique acuta, margine punctis prominentibus utrinque circiter 14 & totidem incisuris. Linea dorsi longitudinalis elevata cum puncto obsoleto in singula incisura; Spatium, quod linea dorsali & margine laterali interjacet totidem punctis prominulis secundum longitudinem dispositis notatur. Pedes sex, tenues, fuscæ. antennæ capillares, fuscæ.*

Obs. Senior factus tandem folliculū sibi struit corpore sexies majorem e lana nivea contectum, intra quem insimul ova flava includit. an itaque Chermes vel Aphis? os enim non examinavi.

1170. PEDICULUS terrestris niveus.

Habitat in terra subhumente calida, proin frequens in *terra prægnante & ollis in hypocrausto per totam hyemem.*

DESCR. *Facies omnino Poduræ, teres, oblongus, albus, sed furca caicens. Copiose & gregatim vivit, mox ab adfusa aqua accedit ad superficiem terræ, sicca vero terra debet descendere.*

Pulex.

1171. PULEX ater.

Leuwenh. epist. I. p. 357. f. 7.*Hook.* microgr. f. egregia.*Bonan.* microgr. f. 56.*Anon.* angl. p. 204. f. 12.*Merr.* pin. 202*Raj.* inf. 7. *Pulex vulgaris.**Frisch.* germ. II. p. 8. *Pulex.**Suecic* *Loppa.*

Habitat in hominibus, præsertim fæminis, autumno vulgaris, in nidis hirundinum ripariarum 247 copiosissima. In Lapponia non vidi.

Podura.

1172. PODURA viridis subglobosa.

Aet. apf. 1736. p. 37. n. 2. *Pulex viridis plantarum.*

Habitat in plantis rarius Upsaliæ, præsertim in foliis primordialibus *Helxines sativæ* 324 minus tamen in fiberica specie.

DESCR. Magnitudo majoris pediculi capitis: *abdomen* dilutius viride globosum, parum in ovalem figuram terminatum, versus anum admodum convexum, viride cum cinerascentis mixtura. *Thorax* tenuissimus, vix conspicuus. *Caput* viride, obtusum, Cicadis non adeo dissimile, oculi supra caput nigri, cum linea utrinque nigricante. *Pedes* albo-virides, æquales, *antennæ* recurvæ.

1173. PODURA atra, abdome subgloboso, antennis longitudine corporis: apice albis.

Habitat in *Fungis sylvaticis.*

DESCR. inter majores hujus generis est; *abdomen* globosum, sed anus quasi capitillo eminet. *Antennæ* nigrae corporis longitudine, quas divaricatas antrorsum prætendit apice albae.

1174. PODURA globosa fusca nitida; antennis longis: articulis plurimis. *De Geer.**Aet.* stockb. 1743. p. 296. t. 7.

Habitat super lignis putridis.

1175. PODURA teres plumbea.

Habitat in arboribus vel pratis semper solitaria; & in *Fungis* frequens.

DESCR.

DESCR. Reliquis major & pediculi vulgaris magnitudinem attingens, omnino teres, fusco-cerulea, polita, pilis raris adspersa: pedes albidi: curvata & interdum salit. pedes ani etiam albi.

1176. PODURA nivalis cinerea signaturis nigris.

De Geer Act. upf. 1740. p. 54. t. 2. Podura campestris cinerea, signaturis nigris, antennis longis.
Suecic Snöloppa.

Habitat hyeme gregatim in ipsa nive, cursitans agilissime, ni liquefacat nix, qua peri: æstate frequens in *Ribis baccis rubris*, tum solitaria. communicavit Astronomus Magister *Hiorter* hyeme lectas.

DESCR. Corpus oblongum, cinereum, characteribus nigris notatum.

1177. PODURA arborea nigra; pedibus furcaque albis.

De Geer act. stockb. 1740. p. 272. t. 4.
act. upf. 1740. p. 49. t. 1. Podura campestris nigra splendens, pedibus caudaque albis.

Habitat in Oelandiæ aceribus inter ligna putrida.

DESCR. Tota parva, nigra: cauda furca cum pedibus & antennis versus basin albis.

1178. PODURA aquatica nigra. It. gotl. 181.

De Geer act. holm. 1740. p. 279. t. 3. 4.
act. upf. 1740. p. 57. t. 3. Podura aquatica tota nigra.

Habitat in aquis quietis & pacatis. Phalanges juxta littora piscinarum format, horis præsertim matutinis, ac si littora gelu coivissent, cum intra phalanges quietior aqua sit.

DESCR. Præter duos sexus a D. De Geer egregie descriptos, etiam tertium, ni fallor, sexum observo, seu animalecula longe adhuc minoria, rubra, rotundiora seu magis gibba, reliquis mixta.

1179. PODURA viatica.

Suecic Jordkrut.

Habitat in Smolandia in ipsis viis communiter, pulveris pyrii instar per terram sparsa, gregaria enim maxime est. an aquatica sive præcedens?

1180. PODURA terrestris alba.

Habitat in terra prægnante, præsertim in horitis, ubi Melones & plantæ seruntur vere,

hic infinita copia occurrit, & atomorum volitantium instar saltat, præsertim postquam humus humectata fuit.

DESCR. Hæc omnium minima est, totaque alba,

Monoculus.

1181. MONOCULUS cauda bifeta.

Frisch. germ. 10. p. 1. t. 1. Apus.

Habitat in *Scania*; vidi animal siccum 1728 apud Studiosum Lundinensem, qui ibidem captum narrabat.

1182. MONOCULUS antennis dichotomis, cauda inflexa.

Swamm. quart. p. 66. t. 1. Pulex aquaticus arbore-scens.

Merr. pin. 207. Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore sanguineo inficientes, unde vulgus dira protendit.

Hierne Flock. 1. p. 32. 35. Abyssus Satanæ,

Habitat in omnibus aquis stagnantibus.

OBS. Ex hujus gregibus in aqua fiunt quasi sanguinis grumi, unde vulgus credit aquam in sanguinem versam.

1183. MONOCULUS antennis dichotomis, cauda reflexa.

Habitat in aquis. hunc vidi apud D. De Geer egregie delineatum.

1184. MONOCULUS antennis quaternis, cauda recta bifida.

Blank. belg. p. 149. t. 13. f. B.

Habitat in aquis cum prioribus.

OBS. Antennarum duo paria. Cauda tenuis, longiuscula, bifurca: sub cauda utrinque racemos ovariorum; hinc Canceris valde adfinis; Corpus fuscum est, at ovaria, quæ juxta caudam utrinque extenduntur ovata sunt lutea, & simul sumta magnitudine fere totum corpus æquant.

1185. MONOCULUS antennis capillaceis multiplicibus, testa bivalvi.

Habitat in piscinis & paludibus.

DESCR. Testa femine Brassicæ major, ovata, oblongiuscula, utrinque æqua-

qualis, antice gibba & parum retusa. adeoque omnino Conchæ; sed in conchis apertura est a latere tenuiore & cardo ubi gibba magis est; contra vero in hac; hæc extracta ex aquis tota clauditur, ut crederes semen cuiusdam plantæ; in aquis dum hiat, jurares concham esse. Celeriter fertur per aquas, ut reliqui monoculi. testa cinerea, impura est. dum aperit testam, exserit multos capillos æquales, albidos, in altera extremitate aperituræ; hos capillos motitando fertur agilis per aquas, nec quiescit antequam vel cochleam vel aliquid terrestre reperit, hic confedit cum forcis lubenter, & pedibus supra hoc corpus incedit & affigitur. totum corpus intra testam latet, dum quiescit.

Acarus.

1186. ACARUS pedibus omnibus longissimis.

Aldr. inf. 607. t. 608. f. 4. Araneus XIV.

Mouff. lat. 234. f. 4. Araneus longipes.

Hoffn. inf. 2. t. 9.

Goed. belg. 2. p. 197. f. 49.

List. goed. 348. f. 143.

angl. 95. t. 1. f. 35. Araneus cinereus cristatus.

Raj. inf. 39. n. 35. Nomen Listeri.

Bradl. natur. t. 24. f. 2.

Suecis Läcke.

Habitat in plantis.

1187. ACARUS pedibus primi paris cheliformibus.

Frisch. germ. 8. p. 2. t. 1. Scorpio - araneus.

It. œl. 84. Acarus Scorpio - araneus dictus.

Habitat in domibus diu clausis, nec aëri expositis, ut & in cistis & cellulis.

DESCR. Chelis cancrinis priorum pedum & ingressu retrogradè facile dignoscitur a reliquis. viçtitat pediculo ligni antiqui.

1188. ACARUS pedibus primi paris longissimis.

Habitat in Fungis; celeriter currit.

DESCR. Magnitudo lendifis. Color cereus, exalbidus vel subflavus: pedes anteriores longissimi, hos erigit saepe inter cursitandum, & motitat instar antennarum, suntque hi corpore longiores & reliquis pedibus pallidiores.

1189. ACARUS pedibus secundi paris crassissimis.

Habitat in terra, ubique discurrens, saepe gregarius, ut plures in eodem loco reperias, in hortis saepe.

DESCR. Magnitudo minoris pulicis: Color totius corporis castaneus: femora secundi paris monströse crassa cheliformia, desinente tamen chela

chela in tenuem pedem reliquis similem; hinc pes secundi paris juxta basin & femur valde crassus, quatuor denticulis sive ramis aut spinis armatus, apex chelæ flexilis est, ut eo melius apprehendat; hoc pede tamen non incedit.

OBS. Huic ad anum adhærentem reperi alium *ACARUM*, *castanei coloris*, *minimum*, *testudinarium* sive *depressum*, margine undique acuto, pedibus brevissimis, æqualibus, adeoque forte diverse speciei, ni singularē aliquam metamorphosin subeat.

1190. ACARUS pedibus tertii paris maximis.

De Geer act. holm. 1740. p. 351. t. I. f. 2. *Acarus avium*, pedibus tertii paris mole monstrosis.

Rhed. inf. t. 2. f. 4. *Pulex Sturni.*

Habitat in *Passere Fringilla dicto 199*, nobis adhuc dum non visus.

DESCR. Est minimus. punctum nigrum in dorso: pedes tertii paris magni, femora enim hujus ambo simul mole ipsum corpus fere adæquant, reliquis minimis. his monstrosis pedibus non incedit, sed modo se se adfigit pennis vivacissimæ & agilissimæ avis, ne excutiat, vide plura in actis stockh. l.c. Hunc male delineavit Rhede, egregie vero. D. De Geer.

1191. ACARUS ruber; pedibus primoribus longioribus, abdomine pone bicorni.

Habitat in *Pini truncis.*

DESCR. Parvus ruber; Pedes primi paris reliquis longiores, quos non erigit, sed iis uti reliquis currit. Abdomen pone duobus corniculis instruatum uti aphides.

1192. ACARUS ovinus.

Charlet. onom. 49. Reduvius.

Raj. inf. 9. Pediculus ovinus, quem *Mouffetus Reduvium* vocat.

It. œl. 62. 126. Festing.

Oelandis Festing.

Habitat in ovibus, quarum lana deturpat.

DESCR. Corpus depresso magnitudo cimicis lectularii, *abdomine* in dorso anterius macula ovata, in medio pallida, cincta fuscedine strias retrorsum emittente.

OBS. Variat colore: semper depresso & planus margine laterali prominente.

1193. ACARUS abdomine livido; antice ovato-fusco, antennis clavatis.

Raj. inf. 10. Ricinus caninus.

Frisch. germ. 5. p. 41. t. 19. Pediculus caninus.

Suecis Flott.

Habi-

Habitat in Bobus frequens, ut & Canibus.

DESCR. Corpus ovato-globosum, luteo albidum, macula nigra rotunda ad basin abdominis in tergo; *Anus* infra abdomen. *Thorax* vix conspicuus. *Caput* minimum. *Os* bifidum. *Caput* & *pedes* nigri. *Antennæ* clavatae, longitudine rostri.

1194. ACARUS humanus subcutaneus.

Ettmüll. act. lips. 1682. p. 319.

Rivin. diff. exanth. p. 18. f. A. B.

Act. upf. 1736. p. 37. n. 5. Acarus scabiei.

Suecis Klämask.

Habitat sub cute hominis scabiem caussans, ubi vesiculam excitavit, parum recedit, corporis rugas secutus, quiescit iterum & titillationem exercitat; nudis oculis sub cuticula delitescens observatur ab adsueto, acu facile eximitur, ungui impositus vix movetur, si vero oris calido halitu affletur, agile in ungue cursitat;

DESCR. Minimus magnitudine vix lendis, subrotundus, capite vix conspicuo, ore, ut & pedibus rufis sive testaceis. *Abdomen* ovatum, aquei coloris, in dorso dupli linea lunari seu pari linearum fuscarum recurvatarum notatus.

1195. ACARUS farinæ.

Leuw. arcan. t.

Blank. belg. p. 158. t. 14. f. A. B.

Bonan. N. C. dec. 2. anno 10. app. 34. Acarus ex arido caseo.

Riv. prurit. 18. fig. D. E. F. G. I. K. L. N.

Suecis Mahl.

Habitat in Farina antiqua, antiquoque Caseo.

DESCR. Est praecedenti valde similis, sed major. *Abdomen* subglobosum aqueum, sed immaculatum. *Os* & *pedes* testacei.

1196. ACARUS Alceæ.

Habitat in Alcea, Malva rosea dicta, ubi sub foliis nascentibus progignitur, & inde a latere superiore palescunt folia.

DESCR. Nudis oculis vix conspicuus: totus aquei coloris utroque latere nigro.

1197. ACARUS depresso cinereus; lateribus scabris.

Habitat in terra, primo vere frequens.

DESCR.

DESCR. Est minimum animalculum; *corpus* depresso, obseure cincatum; *abdominis* latera a tergo punctis elevatis scabra; *podex* depresso, bidentatus; tergo impositus pedes undique protendit.

1198. ACARUS infectorum rufus; ano albicante.

Lift. loqu. 381. Pediculus subflavus scarabæis infestus.

Blank. belg. 168. t. 14. f. H. Pediculus infectorum volatilium.

Frisch. germ. 4. p. 17. t. 10. Pediculus scarabæi currens.

Att. upf. 1736. p. 37. n. 2. Acarus infectorum coleoptratorum.

Reaum. gall. 6. t. 4. f. 14. 13.

Habitat in Scarabæis 349, Bombyliis, similibusque, sub pectore vel intra femora.

DESCR. *Corpus* subrotundum, rufum, convexum, durum: *caput* & *collum* vix manifeste; *versus anum* albicans. *pedes* véloces, anteriore longiore.

1199. ACARUS aquaticus ruber, abdomine depresso.

Charlet. onom. 47. Buprestis araneolæ.

Frisch. germ. 8. p. 5. t. 3. Araneus aquaticus ruber parvus.

Smolandis Qualster.

Habitat in Lacibus sub aqua, ubi cito currit.

DESCR. *Corpus* ovatum, parum in dorso depresso, coccineum.

1200. ACARUS terrestris ruber; abdomine depresso.

Blank. belg. 170. t. 14. f. I. Araneus terrestris scharlatinus.

Lift. aran. 100. f. 38. Araneus exiguis coccineus vulgo anglice a Tant dictus.

Raj. inf. 41. n. 38. Nomen Listeri.

Pet. mus. 65. n. 701. Araneus anglicus coccineus minimus.

It. oel. 84. Acarus coccineus terrestris.

Ostrogothis Bråfrö.

Habitat in terra; in aqua non movetur, sed perit.

DESCR. Præcedenti quam ovum ovo similius. *Totus* ruber, holosericeus & coccineus. *caput* minimum: *oculi* duo; *pedes* utrinque quatuor multis articulis. *Abdomen* magnum, depresso, pone & lateribus gibbum, pone sulcatum. magnitudo antecedentis.

1201. ACARUS arboreus ruber distentus: lateribus obscurioribus.

Habitat ubique in *arboribus*, præsertim in *Ribe* 197, ejusque baccis, celerrime cursitans, vulgatissimus.

DESCR. Præcedentibus multoties minor; minime dorso depresso, nec rugosus, nec sericeus seu villosus, sed glaber & undique tumidus. punctum obscurum utrinque ad thoracem. Pili hinc inde enati.

1202. ACARUS lapidarius fuscus: linea dorsali bicolori. Habitat in lapidibus & campis.

DESCR. Magnitudo & figura aquatici, sed corpus obscurum; abdominis linea dorsalis longitudinalis utrinque dilata, anterius in aliis alba, in aliis rubra; communiter anterius albida, posterius rubra; cæterum abdomen nebuloso-nigrum est, pedes rubri.

1203. ACARUS salicinus ruber, dorso fusco.

Habitat in *Salice*, ubi currit velocissime.

DESCR. Aquatico simillimus magnitudine. linea dorsalis duplex parallela longitudinalis fusca, versus thoracem bifurca.

1204. ACARUS Salicinæ rosæ.

Habitat in *Salice minima* 802, monstrosa in rosæ formam, cum Tenthredine frequens.

DESCR. Corpus vix conspicuum nudis oculis, croceum sive dilute fulvum; thorace utrinque puncto rufo saturato.

1205. ACARUS petrarum ruber, antennis rostro longioribus.

Habitat in *petris*.

DESCR. Facile hic ab omnibus aliis dignoscitur. *Antennæ* rostro longioribus; antennæ enim in reliquis vix manifestæ sunt; has antennæ numero preter octo ordinatis pedes, adeoque non pedes primores pro antennis habeo. Rostrum antennæ pedes corpore pallidiora sunt.

1206. ACARUS petrarum obscure rufus, pedibus sanguineis.

It. oel. 96. Acarus.

Habitat ad littora *maris Oelandici* in *petris*.

1207. ACARUS fusco - rufescens, abdome subgloboso.

Habitat ad radices *Fungorum* gregatim.

DESCR. Magnitudine lendis. *Tetus ferrugineus* seu triste rufescens, undique valde glaber, absque lateralibus maculis. tarde incedit.

1208. ACARUS gymnopterorum ruber, punctorum coccineorum utrinque pari.

Habi-

Habitat in Culicibus & aliis insectis, uti alter acarus in Coleoptratis.

DESCR. Ruber, minimus, ut oculi & pedes nudo visu distingui nequeant: *abdomen* globosum, laxe rubrum, pilis quibusdam hispidum, in anteriore abdominis parte, ad latera, utrinque par punctorum obscurius rubrorum, quorum punctum alterum anterius, alterum posterius.

1209. ACARUS rufus muscarum; pedibus posticis longis filiformibus. *De Geer.*

Habitat in muscis omnium minimus.

1210. ACARUS niger; geniculis femorum globosis. *De Geer.*

Habitat in ramis emortuis.

1211. ACARUS ater; lateribus coleoptro acutis.

Habitat sub *lapidibus*. P. Kalm.

DESCR. Minimus est, magnitudine vix seminis Papaveris; octo pedibus, dorso glabro, nitido, latera versus caput acutum quasi coleoptra brevi nigra, hinc abdomen caput respiciens, quasi antrorsum bicornis & ad latera auctum membranula nigra, non tamen mobili, ut in Coleoptratis.

1212. ACARUS viridi-albicans foliorum Tiliæ. *De Geer.*

Habitat in foliis *Tiliæ* subtus, autumno frequens.

Aranea.

1213. ARANEA abdomine antice lateribus acuminato.

It. gotl. 216.

Habitat in arboribus, præsertim *Gotlandiæ*.

DESCR. Est hic cum proxima omnium maxima, utpote ultimum articulum pollicis sœpe æquans. Differt a sequenti & omnibus figura abdominis, quæ antice quasi bicornis, prominentiis valde distantibus, differt etiam colore abdominis maculato ex albo, luteo & atro. Pedes albo & nigro variegati: rubedo in toto corpore nulla.

1214. ARANEA abdomine subgloboso rubro: cruce alba.

Aldr. inf. 607. t. 608. f. 9. Araneus IX.

Fonst. inf. t. 18. f. 17. 19. 20.

Hoffn. inf. t. 4. f. 16. & t. 8. f. 16. 17. & edit. alt. 4. t. 3. f. penult.

Mouff. lat. 233. f. 1. Araneus velarius maximus.

Lift. aran. 28. f. 2. Araneus rufus sive avellaneus cruciger, cui utrinque ad superiorem alvi partem, quasi singula tubercula prominent.

Raj.

Raj. inf. 18. n. 2. Nomen Listeri.

Frisch. germ. 7. p. 7. t. 4. Araneus magnus rubro-luteus.

Habitat in *arboribus*, præsertim *Betula*.

DESCR. Colore rufo & magnitudine & ovato abdome ab omnibus differt, in dorso abdominis crux alba ex articulis tanquam diadema.

1215. ARANEA fusca; dorso maculis quinque longitudinalibus subcontiguis nigris: anterioribus longioribus.

List. aran. 59. n. 17. Araneus subflavus hirsutus, præ-longis pedibus domesticus.

Raj. inf. 27. n. 17. Listeri nomen.

Act. upf. 1736. p. 38. n. 7. Aranea fusca maculis quinque nigris dorsalibus longitudinalibus contiguis.

Suecic Foenster - Spindel. Dwaerg. *Smolandis* Lâche.

Habitat in fenebris nostris vulgatissima.

DESCR. Caput & Thorax pellucida. Abdomen pallidum maculis oblongis, transversalibus, longitudinaliter digestis, nigris, quinis, fere contiguis, anticis latioribus, versus posteriora sensim angustioribus factis.

1216. ARANEA abdome longe argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis.

List. aran. 30. f. 3. Araneus ex viridi inauratus, alvo longiuscula prætenui.

Raj. inf. 19. n. 2. Nomen Listeri.

Habitat in uliginosis lucis; adsidet ramis arcte & longitudinaliter, pedibus quaternis recta protensis, totidemque retrorsum extensis.

DESCR. Pedes lividi. Abdomen subrufus linea longitudinali atra utrinque flava, extus grisea; a tergo vero venis nigris.

1217. ARANEA abdome rhomboide depresso, pedibus transversaliter extensis variegatis.

List. aran. 85. t. 30. Araneus parvus subrufus inauratus, ipsa alvi apice infuscata, levipes.

Frisch. germ. 10. p. 16. t. 14. Araneus truncorum albo nigroque varius.

Habitat in *parietibus*, *truncis*, *sepibus*.

DESCR. Cinerea, mediæ magnitudinis; alvis rhomboides seu depresso, pone rotundata, ano acutiuscula. pedes transversim expanduntur, remotiusculi, fusi annulis albis. Filum sepe post se trahit. Pedes 2. 1. 3. 4. longitudine se excipiunt.

- 1218. ARANEA** abdomine subrotundo *plano obtuso*, pedibus quatuor posticis brevissimis.
Frisch. germ. 7. p. 10. t. 5. Araneus hortensis, pedibus quatuor longis anticis, abdomine *plano*,
List. aran. 83. f. 29. Araneus subfuscus, minutissimis oculis & viola purpurascens tardipes & gressu & figura cancro marino non adeo dissimilis,
Raj. inf. p. 35. n. 29. Nomen Listeri.
Habitat in *arboribus* & *lignis*, ubi propria ova incubat.
- 1219. ARANEA** nigra; thorace triplici linea longitudinali alba, abdomine nebuloso.
? Frisch. germ. 8. p. 3. t. 2. Araneus terrestris *sacco ovifero*.
Aet. upf. 1736. p. 38. n. 9. Aranea nigra, pectore abdomineque linea alba cinctis.
Habitat in *paludibus* exsiccatis frequens apud nos.
OBS. Neque *Frischius* loco citato, neque *Listerius* de araneis Lupis globiferis p. 77. n. 25. 26. 27. 28, in ulla specie meminit thoracem utrinque linea alba longitudinali notari, nec tertiam albam lineam longitudinalem thoracis a medio dorso. hinc de Synonyma hæreto. *Thorax* aliis niger. *Abdomen* nigrum maculis nigerrimis quasi nebulosum.
- 1220. ARANEA** abdomine ovato albido: lineis tribus longitudinalibus punctorum nigricantium.
Habitat in *nemoribus*.
DESCR. *Pedes* lividi annulis nigris. *Thorax* lividus linea longitudinali & lateralibus nigra. *Abdominis* tres lineæ longitudinales ex punctis nigricantibus concatenatae.
- 1221. ARANEA** exalbida, abdomine globoso reticulato supra purpurascente fusco nebuloso.
Habitat in Hortis. *O. Celsius. S. S. Th. Doct.*
DESCR. *Corpis* albicans, *thorax* aquæ coloris à tergo macula oblonga nigricante, lateribus puncta nigra. *abdomen* tenuissime reticulatum, album valle nigricantibus, in dorso nebulosum & fusco & versus latera obscure purpurascente. *pedes* nigris maculis.
- 1222. ARANEA** thorace testaceo, abdomine ovato nigro-aeneo: apice subluteo bicorni. *It. æl. 125.*
Habitat in *fabulo riparum* & *littorum*, telas horizontaliter extendens.
- 1223. ARANEA** abdomine fusco ovato: linea exalbida pinnata, cauda bifurca. *It. gotl. 251.* *List.*

Lift. aran. 60. n. 18. *Araneus cinereus maximus*, ani appendicibus insigniter prominentibus.

Raj. inf. 27. n. 18. Listeri nomen.

Habitat in pratis graminosis *Oelandiae* & *Gotlandiae*, ubi rete extendit super gramina horizontale, album, latum, margine puto cylindraceo ex crassiore reti contexto, in cuius fundo occultatur aranea ab avibus secura, radiisque solis minus exposita; quam primum quis tangit rete, mox e spelunca exit in spem praedæ.

DESCR. *Thorax* griseus lineis tribus pallidis longitudinalibus. *Abdomen* fuscum, nitidum, linea dorsali exalbida, longitudinali, minima, striae albas oppositas pinnatim utrinque exserens. *anus* five cauda duplice furca seu mucronibus, superioribus longioribus, inferioribus brevioribus; sub *abdomine* fasciis tribus longitudinalibus, pallidis.

1224. ARANEA pallida; abdome subgloboso flavo: punctis quibusdam nigris.

Lift. aran. 34. f. 5. *Araneus viridis*, cauda nigra punctis utrinque ad marginem superne notata, ipso ano croceo.

Raj. inf. 20. n. 8. Listeri nomen.

Habitat in *Betulis*, *Malis*, *Pyrisque*, *vesperi* frequens.

Mater adsidet reti laxo ova involvente, nec facile abigitur.

DESCR. *Thorax* & pedes pallidi: linea nigra ad thoracis latera utrinque, pedum articuli spinosi, ad apices omnes nigricantes. *Abdomen* ovatum, viride, utrinque versus anum punctis quatuor nigris & in disco abdominali, versus ejus basin, punctorum 3 paria nigricantia excavata. *anus* saepè fulvus.

1225. ARANEA flavescente-viridis: linea utrinque alba.

Jonst. inf. t. 18. f. 42. *Araneus mouff.* ultimus.

Act. upf. 1736. p. 38. n. 8. *Aranea flavo-viridis*, lateribus linea alba cinctis.

Habitat in Hortis.

1226. ARANEA corpore oblongo nigro: linea utrinque longitudinali alba, pedibus fuscis.

Habitat in *Aquis*, currit supra aquam.

DESCR. Satis magna est; pedes subgrisei five ex pallido fuscis. *Thorax* & *abdomen* nigra, utrinque linea lata alba, quæ coit ad caudam. *anus* bifurcus. Antennulae oris apice globosæ & valde magnæ, hinc *Mars* procul dubio. In *abdomine* supra lineam lateralem albam utrinque ordo longitudinalis punctorum minutissimorum alborum.

1227. ARANEA abdomine flavo: annulo ovali dorsali rubro.
Lift. aran. 51. f. 12. Araneus albicans, corona coccinea in alvo ovali.
Raj. inf. 24. n. 12. Listeri nomen.
Friscb. germ. 10. p. 6. t. 4. Araneus hortensis albus ferto dorsali cinnabarino - rubro.
 Habitat in *Hortis*, telas ducit more domesticæ.
 DESCR. Magnitudo muscæ. Pedes satis longi, albi, diaphani; anteriores geniculis nigris instruti. Thorax aqueus. abdomen sulphureum, a tergo macula annulari ovata sanguinea, intra quam linea oblonga fusca longitudinalis.
1228. ARANEA abdomine globoſo, pallido - flavescentia.
Act. upf. 1736. p. 38. n. 6. Aranea globosa pallida floribus inhabitans.
 Habitat in *Horto Upsaliensi* rarius, ubi se recondit intra calyces plantarum, asperifoliarum præsertim, postquam corolla decidit; hic se occultat, mucras quærentes cibum capit absque rete, dum immittunt proboscidem vel pedem ejus calyci.
 DESCR. Est inter mediæ magnitudinis araneas, nullo colore variegatus.
1229. ARANEA abdomine ovato nigro: annulo dorsali ovali albo. *It. oel. 126.*
 Habitat in *Oelandia*.
 DESCR. Tota nigra: Abdomen ovatum, linea alba bifurca includens spatium ovale a tergo abdominis, margine interiore variis denticellis picto.
1230. ARANEA thorace nigro, abdomine fusco, pedibus rufis.
 Habitat in *Urtica*.
 DESCR. Magnitudo media; an major factus colores mutet, me ignorare fateor.
1231. ARANEA nigra; abdomine ovato: basi punctis duobus albis.
 DESCR. Aranea mediæ magnitudinis. pedes longi, abdomen oblongum. In dorso versus basin abdominis puncta duo alba ovata apicibus longius a te invicem dehiscentia.
1232. ARANEA atra; abdomine globoſo: punctis duabus excavatis.
Act. upf. 1736. p. 38. Aranea atra, abdomine superne duobus punctis excavato. Ha-

Habitat interdum in *feneſtris*: tela non geometrica, sed variis filiis sparsis constantia.

DESCR. Tota atra. Pedes testacei. Abdomen globosum, glabrum, nitidum, punctis duobus non coloratis a tergo, in medio impressis notatum; &, si probe attendas, aliis adhuc duobus, paulo anterioribus, sed minoribus. a capite per thoracem & abdomen dicitur linea inter punctorum paria ad annum usque sordide testacea.

1233. ARANEA abdomine oblongo punctorum excavatorum tribus paribus.

Habitat in sylvis inter cortices *Pini*.

DESCR. Inter majusculos numeranda est. Thorax cinereus. Abdomen ovato-oblongum teretiusculum pilis glaucis, aliis rarioribus nigris; in tergo abdominis tria paria punctorum excavatorum conspicuntur.

1234. ARANEA oblonga fusca, abdomine nigro apice spinoso, tergo punctis quatuor excavato.

It. oel. 34. Araneus oblongus fuscus, abdomine nigro apice spinoso: tergo punctis quatuor depresso-notato.

Habitat in *feneſtris*.

DESCR. Thorax fuscus. Abdomen nigrum pilis cinereis, Pedes ferrugineo-fusci. Anus appendiculis 5 vel 6 subularis truncatis.

1235. ARANEA nigra; abdomine punctis duobus albis: basi lunula alba.

Act. upf. 1736. p. 38. n. 11. Aranea capite nigro, abdome albo maculato, cauda prominula nigricante.

Habitat in *lucis*, noctu agilis, die quieta.

DESCR. Magnitudo mediocris. Tota corpore & pedibus nigra; in medio dorso abdominis puncta duo alba minima vix conspicua, in singulo latere singula; gibbum anteriorem abdominis lineola alba anterius cingit in modum lunulae. Anus prominens, compressus.

1236. ARANEA saliens nigra; dorso punctis albis.

Act. upf. 1736. p. 38. n. 13. Araneus saliens niger punctis albis notatus.

Habitat in parietibus arborumque truncis, filum post se ubique trahens.

1237. ARANEA saliens nigra: lineis albis transversis semicircularibus.

List. aran. 87. f. 51. Araneus cinereus, alvo circiter senis fasciis transversis in angulos acutos, in me-

dio erectis argenteis & nigris alternatim dispositis insignibus.

Raj. inf. 37. n. 31. Listeri nomen.

Bradl. natur. t. 24. f. 5.

Habitat in parietibus & fenestris, extra domum vulgatissima.

1238. ARANEA saliens; abdominis macula nigra margine rubra: medio alba.

Habitat in parietibus & lignis.

DESCR. Macula dorsalis ovalis nigra margine rubra, & in centro sive medio alba.

1239. ARANEA flava; abdominis apice macula cordata atra.

Habitat in *uliginosis*, saepe etiam in floribus.

DESCR. Vidi pullos modo numerosissimos gregatim telæ insidentes, num mutent dein colorem, uti facilè credere, non dum vidi. Abdomen subrotundum totum sulphureum; supra anum macula pulchra exalte cordata. Os his forcipatum; thorax aquei coloris. cum procedit filum post se trahit.

1240. ARANEA livida; abdomine ovato: linea transversa duobusque punctis excavatis.

Habitat in *Aqua*, & quidem non supra aquam, sed in & sub aqua.

DESCR. Est inter maximas generis sui, tota livida sive fusco-pallida. Abdomen ovato-oblongum, cinereum, ano obtuso seu truncato, duobus appendiculis: abdomen a tergo gibbum, versus basin linea excavata transversa notatum, & sub hac duobus punctis excavatum. Pedes longi, tibiae versus basin velut geniculatae. Oris forceps omnium aranearum nostrarum maxima, nigra, dura, hians, saepe mordens at arripiens obiecta. verbo: oris forcipe omaino Tarantulam referens. hinc si que alia, certe venenata, ex colore, structura, figura oris &c.

1241. ARANEA livida; abdomine atro holosericeo: basi subtus punctis duobus flavis.

Lift. aran. 71. t. 23. Araneus plerumque lividus, non raro tamen subflavus sine ulla pictura.

Habitat in ruderibus & plantis ac arboribus ubi *folia convolvit*, & se occultat & ova ponit.

DESCR. Corpus totum, caput, pedes, thorax fusco-livida, hirsuta; pedes insuper pilis adspersi; forceps oris robusta. Abdomen ovato-oblongum, atrum, holosericeum seu inpalpabili hirsutie testum, apice duobus appendiculis truncatis, sub abdomine juxta basin duo tubercula flavata. Adeoque praecedenti simillima, sed dimidio minor & terrefris, longeque minori forficula oris.

1242. ARANEA abdomine albo - cinereoque - variegata.

Habitat in arboribus.

DESCR. *Abdomen* ovatum, lateribus niveis dorso e cinereo & albo nebuloso; subtus abdomen cinereum est totum. *Thorax* & pedes pallidi. *Pedes* anteriores longi, quos, dum tranquille sedet, recta protendit.

1243. ARANEA abdomine subgloboſo albo; maculis dilute fuscis.

Habitat intra paniculam *Arundinum* 99.

DESCR. Est inter minores generis sui. *Abdomen* albidum maculis fere ut domestice, sed dilutionibus & magis distinctis. *Thorax* lividus sive griseus. *caput* supra canum.

Cancer.

1244. CANCER brachyurus; manuum digitis atris.

Bellon. aquat. 368. Pagurus.

Aldrov. exsang. 186. Pagurus.

Jonst. exsang. t. 5. f. 2. Cancer marinus.

Gesn. aquat. 155. Cancer marinus.

Merr. pin. 192. Cancer marinus.

Charl. exerc. 57. Cancer marinus.

Schonef. ichth. 30. Cancer officinarum.

Rond. pisc. 560. Cancer Mæas.

Dal. pharm. 400. n. 24. Cancer officinarum.

Att. N. C. 1. p. 315. t. 10. f. 1. Cancer marinus.

Habitat in mari *Atlantico* circa Gothoburgum.

1245. CANCER brachyurus; thorace aculeato, manibus ventricosis levibus.

Matth. diosc. p. 229. Maja.

Jonst. exsang. t. 5. f. 5. Cancer Maja.

Habitat in mari *Atlantico*.

1246. CANCER brachyurus; thorace aculeato, manibus linearibus glabris, rostro bicorni.

Jonst. exsang. t. 5. f. 13. Pagurus femina.

Habitat in mari *Atlantico*.

OBS. *Manus* sive Chelæ antice lineares, minime ventricose, digitis equalis longitudinis: reliqui pedes monodactyli.

1247. CANCER macrourus; manibus prismaticis: angulis spinosis.

Aldr. ex sang. 113. Astacus mediæ magnitudinis prior.
Act. upf. 1736. p. 39. n. 9. Cancer cauda exserta,
 chelis angulatis.

Habitat in mari *Lapponiae* adjacenti copiose.

1248. CANCER macrourus; rostro lateribus dentato;
 basi supra dente duplo.

Matth. diosc. 227. Astacus.

Gesn. aquat. 91. Astacus.

Rond. pisc. 538. Astacus.

Aldr. ex sang. 112. Astacus verus.

Jonst. ex sang. t. 71. Astacus marinus communis.

Merr. pin. 191. Astacus marinus.

Schonef. ichth. 23. Astacus marinus.

Charl. exerc. 55. Astacus marinus.

Worm. mus. 247. Astacus marinus.

Dal. pharm. 399. n. 20. Astacus marinus.

Suecic Hummer.

Habitat in mari circa *Gothoburgum* & *Bohusiam*.

1249. CANCER macrourus; rostro supra serrato, basi
 utrinque dente simplici.

Rond. pisc. 22. p. 210. Astacus fluviatilis.

Gesn. aquat. 104. Astacus fluviatilis.

Aldr. ex sang. 129. Astacus fluviatilis.

Jonst. ex sang. t. 4. f. 1. Astacus fluviatilis.

Matth. diosc. 228. Gammarus.

Bellon. pisc. 355. Gammarus.

Worm. mus. 248. Gammarus f. Astacus fluviatilis.

Schonef. ichth. 24. Astacus fluviatilis.

Charl. exerc. 56. Astacus fluviatilis.

Merr. pin. 192. Astacus fluviatilis.

Dal. pharm. 399. n. 21. Astacus fluviatilis.

Suecic Kräfweta.

Habitat in lacubus & fluviis *Sueciæ*, hodie sat fre-
 quens, ante tempora Regis *Johannis III.* vix in
Suecia visus.

1250. CANCER macrourus, cauda molli testa cochlear
 inclusa; chela dextra majore.

Matth. diosc. 230. Cancellus.

Rond.

Rond. pisc. I. p. 553. Cancellus.

Bellon. aquat. 362. Cancellus.

Gesn. aquat. 161. Cancellus.

Alar. exsang. 218. Cancellus.

Jonst. exsang. t. 7. f. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Cancellus.

Charl. exerc. 58. Cancellus quibusdam Bernhardus
Eremita dictus.

Merr. pin. 192. Cancer in testis degens.

Worm. mus. 250. Cancellus quibusdam Bernhardus
Eremita.

Dal. pharm. 399. n. 22. Cancellus.

Swamm. bibl. t. 11. f. 1. 2.

Habitat in mari *Atlantico*.

OBS. Varias & diversas desertas Cochleæ testas adsumit, scabra crusta obducit, intra has se includit, caudam præcipue ut tegat; licet & totum corpus intra testam retrahat, hinc semper eam secum ducit ut *Diogenes* suum *Dolium*.

1251. CANCER macrourus; rostro integerrimo, manuum pollice longiore.

Act. upf. 1736. p. 39. n. 6. Cancer cauda exserta,
rostro integerrimo.

Habitat in mari, capitur saepius cum sequenti.

DESCR. Rostrum integerrimum, absque crenis aut spinis brevissimum. Pollex in manibus, qui mobilis, chela longior, & ejus apici quasi infixus, tamen chela terminatur mucrone opposito breviori. Hisce chelis & rostro integerrimo facile distinguitur a sequenti, cum quo mixtus venum exponitur & editur pro una eademque specie, magnitudine deinceps hujus sequentem parum superat. Olim etiam in Belgio sequenti mixtum saepe vidi.

1252. CANCER macrourus; rostro supra ferrato; subtus tridentato, manuum digitis æqualibus.

Matth. diosc. p. 229. Squilla.

Worm. mus. p. 248. Squilla.

Klein. dab. 35. f. æ. Squilla fusca.

Act. upf. 1736. p. 39. n. 5. Cancer cauda exserta, rostro superne ferrato.

Suecis Raka.

Habitat in mari *Baltico*.

DESCR. Rostrum lanceolatum, perpendiculare, acutum, supra octo crenis, infra tribus ferratum; manus, que tertio pedum pari insident, digitis sunt æqualibus.

- 1253. CANCER** macrourus rufescens; thorace articulato.
Raj. inf. 44. *Pulex fluviatilis.*
Frisch. germ. 7. p. 26. t. 18. *Vermis aquaticus can-*
criformis.
It. oel. 42. 96. *Cancer Pulex fluviatilis dictus.*
Habitat ad littora maris vulgatissimus.

- 1254. CANCER** macrourus cæruleus; thorace articu-
lato. *It. gotl. 260.*
Habitantem vidi ad montem Thorsburg in mari juxta
Gotlandiam,
OBS. Præcedenti major: totus cæruleus, rostrum nullum prominens,
corpus 14 articulis, cauda trifolia; intermedio subulata.

Oniscus.

- 1255. ONISCUS** cauda subulata utrinque appendiculata.
Raj. inf. 43. *Asellus marinus cornubiensis* *alius.*
Act. upf. 1736. p. 39. n. 1. *Oniscus marinus maximus.*
Klein. dub. 38. f. 1. 2. *Entomon pyramidale.*
Suec. Syrmask. Ostrobotniensibus Grundskorfwæ.
Habitat in mari Balthico cum Harengis 315. fre-
quens. C. Horleman. Architect. Princeps.
DESCR. Magnitudo extimi articuli pollicis, supra convexus, infra planus, margine undique acuto. Capitis elyptus undique incisus est. Pedes anteriores utrinque tres, minores, glabri; posteriores utrinque quatuor, majores, ciliati. Antennarum in fronte bina paria. Corpus septem incisuris, præter caput & caudam. Cauda duas tertias partes corporis longitudine æquat, indivisa, tereti-triangulata, subtus vestita radiis duobus convexis, parallelis. totum animal, exceptis oculis, album.

- 1256. ONISCUS** cauda obtusa integerima. *It. gotl.*
298.

Raj. inf. 42. *Asellus lividus major.*

Habitat in pratis Gotlandiæ.

DESCR. Totus niger, marginibus segmentorum albis; macula alba sub femoribus posterioribus in singula incisura. cauda obtusa, integra, nec bifurca. tactus se contrahit uti Armadillo, quiete diu jacet, ut ignoto pro pilula vel aurelia ichneumonis omnino haberetur.

- 1257. ONISCUS** cauda obtusa bifurca.

Matth. diose. 257. Millepeda.

Charl. exerc. 54. Millepes.

Raj.

Raj. inf. 41. n. 1. Afellus afininus sive vulgaris.

Suecic. Gräfuggor.

Habitat in domibus, muris antiquis humentibus, & præsertim in Caldariis hortorum.

1258. ONISCUS cauda bifida; stylis bifurcis.

Raj. inf. 43. Afellus aquaticus gesneri.

Frisch. germ. 10. p. 7. f. 5. Afellus aquaticus.

Habitat in fossis & aquis putealibus.

DESCR. Constat articulis septem, præter caudam & caput. Caudæ articulus reliquis, ut & ipso capite major, planus, subrotundus, e quo prodeunt duo styli, singuli bifidi. Pedes utrinque septem, quorum posteriores semper longiores antecedentibus. Antennæ setaceæ articulis tribus,

Scolopendra.

1259. SCOLOPENDRA submarina.

Raj. inf. 44. Scolopendra marina.

Matth. diosc. 235. Scolopendra marina rondeletii.

Habitat in mari Lapponiaæ adfinitima boreali parte copiosissime.

1260. SCOLOPENDRA teres, pedibus utrinque centum.

Aldr. inf. 637. t. 636. f. 4. Scolopendra terrestris minor.

Mouff. lat. 30. Julius quartus glaber.

Jonst. inf. t. 23. Julius glaber mouff. 1.

Raj. inf. 46. Julius quartus glaber.

Frisch. germ. 11. p. 21. t. 8. f. 3. Scolopendra longa-micylindracea?

Habitat in terra.

DESCR. Corpus subcylindraceum, fuscum; dorsum linea longitudinali duplice ferruginea noratum. Antennæ 5 articulis, quorum ultimus subglobosus. Datur & nigra tota, & minor simul.

1261. SCOLOPENDRA plana; pedibus utrinque septuaginta.

Aldr. inf. 637. t. 636. f. 8. Scolopendra vulgaris ac vera.

Raj. inf. 45. Scolopendræ valde exiles, longæ.

Frisch. germ. 11. p. 22. t. 8. f. 1. Scolopendra plana longa.
Habitat in ipsa terra.

DESCR. Rubra est, plana, filiformis, serpentis instar flexuosa. Pedes 54. a singulo latere Frischius numerat, nostra 70 vel 68 obtinet.

1262. SCOLOPENDRA teres; pedibus utrinque centum & viginti. *It. gotl. 280.*

Raj. inf. 47. Julo glabro adfinis, lividis albisque circulis.

Habitat sub *lapidibus* in insula Carlsoea majore.

DESCR. Longitudo pollicis transversi; crassitie pennae columbinæ, glabra, cinerea, lineis duabus longitudinalibus dorsalibus, ferrugineis, pallidis; singulo articulo corporis juxta latus longitudinaliter striato, pallidiore, corpus circiter (numero rotundo) 60. incisuris. *Antennæ* 5 articulis. *Pedes* exallidi. Tacta in spiram planam, pedibus tamen terram respicientibus, contrahitur. facies speciei secundæ.

1263. SCOLOPENDRA plana; pedibus utrinque quindecim.

Raj. inf. 45. Ad scolopendram accedens triginta pedibus instructa.

Suecic Twåstiert.

Habitat in terra.

DESCR. Rubra est, vix digitum transversum longa. *Pedes* antici crassi & validi, ultimi longissimi, hinc cauda quasi bifurca. *corporis articuli* alterni reliquis dimidio breviores.

1264. SCOLOPENDRA ovalis; pedibus utrinque duodecim: cauda albo penicillo.

Act. upf. 1736. p. 39. n. 3. *Oniscus minimus*, cauda alba.

Habitat *Upsaliæ* ad radices arborum inter muscos frequens vere, præsertim juxta Hortum arcis.

DESCR. Magnitudo pediculi; utrinque *pedes* 12; a tergo penicillus expansus supra singulos pedes, dein in medio dorso transversalis fasciculus. *Cauda* constat penicillo majori pilorum conniventium majorum.

Classis VI.

VERMES.

I. REPTILIA.

Gordius.

1265. GORDIUS pallidus; cauda capiteque nigris.

It. gotl. 282. Gordius.

Gesn. aquat. 463. Vitulus aquaticus.

Aldr. insect. 720. *t.* 765. Seta f. Vitulus aquaticus.

Fonst. inf. *t.* 25. Meerwurm.

Merr. pin. 207. Seta aquatica.

Smolandis Onda-Betet.

Habitat in lacubus & fontibus.

DESCR. Figura & magnitudo setæ equinæ, colore pallido, capite & cauda nigris. Credunt rusticæ Smolandiae horum morsus Paronychias cauſare, vocant etiam Paronychiam morbum: Onda betet, uti etiam ipsum vermem eodem nomine; quod vero uti Vena medinensis f. Draunculus Persarum (descripto a Sloaneo Jam. V. 2. t. 233. f. 1. Kämpfer. Armen. p. 524.) intrer corpus, rusticis nostris plane ignotum. Curant Paronychias rusticæ Smoldandi incisione facta cultello, cum quo Gordius prius in minuta segmenta fuerit divisus; dicunt etiam omnia frusta vermis, aquis immissa, recrescere in perfectum corpus.

Tænia.

1266. TÆNIA articulata plana.

Schenck. obs. 3. §. 308. Tænia.

Merr. pin. 206. Vermis in homine cucurbitinus f. Tænia.

Barth. aet. 1673. *p.* 148. Lumbricus latus.

Tulp. obs. 161. *t.* 162. Lumbricus latus.

Beverwik. thesaur. 202. *f.* 202. Tainai. (Fig. bon.)

Suecis Fijken, Binnekematsken.

Habitat in intestinis hominis, Canis.

1267. TÆNIA articulata teres.

Habitat in paludibus.

Corpus digito longius teres articulatum album pellucidum, pedibus omnibus destitutum, nec Larva cuiusdam eulicis.

1268. TÆNIA continua plana fulcis longitudinalibus.

Vulgo Vermis cucurbitinus.

Habitat in Carnibus.

DESCR. brevis, compressa, alba strijs utrinque 3 vel 4 profundis longitudinalibus, pone obtusa, ore latitudine parallelo bilabiato lato.

Ascaris.

1269. ASCARIS.

Habitat in paludibus, in intestino recto puerorum, saepe etiam in ipsa vulva chloriticarum; in intestinis equorum vulgatissima, in radicibus plantarum corruptis primo vere copiosa, inde perireunt saepius plantæ insequente æstate.

Lumbricus.

1270. LUMBRICUS punctis prominulis.

Habitat frequens in mari Septentrionali; ubique proditur cuniculis sub æstu maris.

DESCR. Similis est sequenti, sed major & annulis e tuberculis compositis seu e punctis extrorsum prominulis.

1271. LUMBRICUS laevis.

Rhed. quart. t. 15. f. 1.

Raj. inf. 2. Lumbricus terrestris minor.

Suecic Metmatsk.

a *Raj.* inf. 1. Lumbricus major.

Suecic Daggmatsk.

B *Raj.* inf. 2. Lumbricus intestinalis teres.

Merr. pin. 206. Vermes in homine s. Lumbricus.

Habitat in terra: Coëunt hi vermes supra terram approximatis collaribus, hinc exeundo e terra ad copulam tumulos effodiunt, hortis & ambulacris molesti. His aluntur Talpæ, hinc si quis supra terram leviter sulciliat, saepe exeunt e terra præmetu Talpæ.

Hirudo.

1272. HIRUDO depressa fusca: margine laterali flavo,

Raj. inf. 3. Hirudo maxime in anglia vulgaris.

Suecic Snigel. *Ha*

Habitat in *aquis paludosis & fossis.*

DESCR. Vivipara est, unico gaudet embryone, cui funiculus caudæ interfertus est.

1273. HIRUDO depressa nigra; abdomine subcineredo.

Suecis Blod-igel.

Habitat in *Aquis* passim.

DESCR. Nigra est supra, sed punctis pallidis, in singulo segmento, in transversam lineam digestis notata.

1274. HIRUDO depressa alba; lateribus acutis. *It. gotl.*

182. 250.

Reatum. act. - - Hirudo-Limax.

Habitat sub *aquis* supra lapides in rivulis frequens, saepe etiam in *piscibus* præsertim Gasterostii.

DESCR. Præcedentibus minor, tota lactea, lactes piscium facie referens, variae longitudinis, varias figuræ adsumens, os vix manifestum.

1275. HIRUDO teres: extremitatibus dilatatis.

Frisch. germ. 5. p. 25. t. II. Hirudo ore caudaque ampla.

Habitat in *aquis*, reperitur facile in *piscibus*; ore & cauda æque apprehendit.

II. ZOO PHYTA.

Limax.

1276. LIMAX ater.

Aldr. inf. Limax tertia tota nigra.

Jonst. inf. 138. Limax.

Merr. pin. 207. Limax.

Lift. angl. 131. Limax ater,

bist. I. p. 102. Limax ater.

Dal. pharm. 383. Limax ater.

Smolandis Skog-snigel.

Habitat in lucis & nemoribus frequens post pluvias & in rore frequens; Androgynus est uti congeneres, agit enim & patitur.

1277. LIMAX subrufus.

Aldr. inf. 702. Limax magna colore rufo.

Lift.

Lift. hist. 1. n. 103. *Limax subrufus.*

angl. app. 6. p. 1. *Limax quartus subrufus mon-*
tanus.

Dal. pharm. 383. *Limax ruber.*

Habitat in *umbrosis* & ubi ros non facile *exsiccatur.*
minus tamen ftequens.

1278. LIMAX *cinereus maculatus.* *It. æl. 61.*

Lift. angl. 130. app. 1. f. 2. *Limax cinereus maxi-*
mus striatus & maculatus.

Anom. hist. nat. 386. t. 32. f. 26.

Habitat in *sylvis* *densissimis* *Oelandiæ* *locis subhumi-*
dis.

DESCR. Maximus est inter *cōgeneres*, profunde *striatus* & *tugosus*, *ma-*
culis obscurioribus.

1279. LIMAX *cinereus immaculatus.*

Lift. angl. 130. *Limax cinereus parvus immaculatus*
pratensis.

Blank. belg. 151. t. 13. f. X.

Habitat in *hortis*, sœpe inter *olera*, sœpeque inter
folia Brassicæ obvius.

DESCR. Magnitudo seminis *Phaseoli*: *corpus* *tugosum*, *cinereum*, *vix*
maculatum.

1280. LIMAX *flavus maculatus.*

Lift. exercit. anat. p. 1. t. 1. *Limax succini colore,*
albidis maculis insignitus.

Habitat in *umbrosis* inter plantas.

Sepia.

1281. SEPIA.

Matth. diosc. 244. *Sepia.*

Salv. aquat. 165. *Sepia.*

Ald. exsang. 44. *Sepia.*

Jonst. exsang. 7. *Sepia.*

Bellon. aquat. 336. *Sepia.*

Rond. aquat. 1. p. 498. *Sepia.*

Gesn. aquat. 850. *Sepia.*

Charl. exerc. 51. *Sepia.*

Merr. pin. 191. *Loligo - Sepia.*

Dal. pharm. 392. *Sepia.*

Sue-

Suecis Bläckfisk.

Habitat in mari circa Scaniam, ad cuius littora cum fabulo maris ossa sepiæ quotannis ejiciuntur.

Lernea.

1282. LERNEA tentaculis quatuor: duobus apice lunulatis. *Tab. II.*

Habitat supra Cyprinum Carassium 322, cuius sanguinem haurit.

DESCR. Longitudo transversi digiti; *Corpus* teres, subpellucidum, versus basin egressum e tunica alba tanquam e præputio; est que hoc corpus abdomen, quod versus apicem tribus obtusis gaudet tuberculis, quorum unum majus est. antice est apertura oris, juxta hanc duo processus molles; & juxta hos utrinque anus processus mollis apice exterratum lunulatus; hæc antica pars tegitur tunica alba.

Hydra.

1283. HYDRA viridis; corpore æquali, tentaculis corpore brevioribus.

Vulgo Polypus.

Habitat in fossis Uplandiæ *De Geer.* Hic in frusta dissectus, plantæ instar, ex singulo frustulo, novo individu reviviscit;

Aphrodita.

1284. APHRODITÆ nitens.

Col. aquat. 25. *t.* 26. *f.* 1. Pudendum regale?

Barth. aet. 3. *p.* 88. *t.* 88. Vermis aureus.

Barr. rar. 131. *t.* 1284. Eruca marina griseo fusca.

Dal. barv. 394. Mus marinus.

Ruyssch. ovat. 1. *p.* 23. *n.* 49. Eruca marina, pilis lateribus aureis cæruleis viridibus, iridis instar fulgentibus prædicta, *Hystrix marina* dicta.

Habitat in Mari occidentali rarius.

Asterias.

1285. ASTERIAS radiis quinis latiusculis asperis.

Plot. ox. 85. *n.* 16. *t.* 2. *f.* 2. 3. Asteria.

Pet. mus. 6. *n.* 20. Asteria Slagburiensis.

Morn.

Merr. pin. 191. *Stella marina minor.*

Olear. mus. 55. t. 28. f. 4. *Stella marina.*

Schonef. ict. 75. *Stella marina plinio.*

Habitat in mari *Scaniam & Norwegiam* alluente.

Medusa.

1286. MEDUSA orbiculi margine sedecies emarginato.

Gesn. aquat. 760. *Pulmo marinus?*

Aldr. exsang. 577. *Pulmo marinus?*

Jonst. exsang. 56. *Pulmo marinus?*

Bell. aquat. 438. *Pulmo marinus?*

Rond. aquat. 2. p. 121. *Pulmo marinus?*

Baub. pin. 369. *Pulmo marinus?*

Charl. excerc. 68. *Pulmo marinus?*

Dal. pharm. 393. *Pulmo marinus?*

Tabern. hist. 1524. f. 1. *Pulmo marinus?*

Habitat in mari atlantico, copiose ad littora *Lapponiae* f. *Finmarkiae*, Esca Balænæ 264.

DESCR. Figuræ omnes malæ sunt hinc dubia synonyina moneo. *Corpus* orbiculatum, supra convexum, totum gelatinæ instar friabile & pellucidum; a parte inferiore s. plana circulus depingitur scabet s. echinatus squamofusus, intra quem Radiorum octo paria a centro versus peripheriam extensa adnata. *Stamina* s. Branchiæ niveæ, in aliis incornatae, semper crispæ. *Pistilla* s. Filamentorum congeries multiplex, longissima; omnibus hæc e centro lateris inferioris enata. *Margo* corporis octifidus, obtusus, singulis lobis emarginatis, hinc 16 signibus.

1287. MEDUSA orbiculo subtus quatuor cavitatibus notato.

It. æl. 160. *Medusa.*

Vulgo *Urtica marina.*

Suecis *Manet.*

Habitat ubique in mari: ad Solem lucentes tanquam Stellæ in mari; tactu urentes.

DESCR. *Corpus* pellucidum gelatinæ instar, extus convexum, subtus concavum, margine subciliato: subtus in centro quadruplex cavitas; singula arcuata & cincta opaca linea, constante punctis plus quam viginti parallelis; e centro orbiculi quatuor prodeunt falces, margine exteriore ciliatae. in tergo corporis e centro plurimæ ventre pallidae.

1288. MEDUSA orbiculo cruce alba picta.

Habitat in mari atlantico.

DESCR. Hæc omnium minima est, tota gelatinosa, vitrei coloris, discum pingit.

pingit crux magna alba, ad margines usque extensa. margo integer est: caret appendiculis omnibus, sc. cavitatibus, pistillis, staminibus, branchiis.

Echinus.

1289. ECHINUS subglobosus; vertice plano.

Lift. angl. 169. t. 3. f. 18. Echinus marinus, aculeorum vestigiis parum aut nihil eminentibus.

Habitat in mari Norwegico.

1290. ECHINUS subcompressus, vertice prominulo.

Lift. app. 28. Echinus minor angulosus, ex utraque parte compressus.

Habitat in mari Septentrionali.

III. TESTACEA.

Patella.

1291. PATELLA testa ovata quatuordecim angulis exarata.

Lift. angl. 195. t. 5. f. 40. Patella ex livido cinerea striata.

Sibb. mus. 125. n. 1. Patella vulgaris ex livido cinerea.

Pet. mus. 85. n. 827. Patella vulgaris anglica.

Habitat in mari Occidentali ubique in lapidibus.

DESCR. Testa conica, 14 angulis elevatis tuberculatisque exarata, quibus interjacent anguli totidem minores. Apex obtusiusculus est & margini angustiori propior, nec in centro. margo subtus nigricans denticulis albis.

1292. PATELLA testa membranacea ovali; mucrone reflexo.

Lift. angl. 151. t. 2. f. 32. Patella fluviatilis fusca, vertice mucronato inflexo.

Habitat sat frequens in lacubus nostris, plantarum foliis insidens sub aquis, præsertim Stratiotis 444 foliis delectatur.

Cochlea.

* *Terrestres.*

1293. COCHLEA testa ovata quinque spirarum, pomaria dicta.

A a

Gesn.

Gesn. aquat. 255. *Pomatia.*

Aldr. exsang. 389. *Cochlea terrestris gypso obserata.*

List. ang. III. t. 2. f. 1. *Cochlea cinerea edulis, cuius apertura operculo crasso velut gypso per hymenem clauditur.*

exercit. anat. I. p. 162. t. 1. *Cochlea pomatia edulis gesneri.*

bist. I. n. 46. *Cochlea cinereo - rufescens fasciata leviter umbilicata.*

Dal. pharm. 394. *Cochlea terrestris, Limax terrestris.*

Merr. pin. 207. *Cochlea alba major, cum suo operculo.*

Pet. mus. 4. n. 12. *Cochlea alba major.*

Sueciæ Trägårds - Snäcka.

Habitat in hortis, allata e *Germania*, sponte vix occurrat; a quibusdam editur.

1294. COCHLEA testa utrinque convexa flava: fascia subsolitaria fusca, labro reflexo.

List. angl. 116. t. 2. f. 3. *Cochlea citrina aut leucophæa, non raro unicolor, interdum tamen unica, interdum etiam duabus, aut tribus, aut quatuor, plerumque vero quinque fasciis pullis distincta.*

bist. t. I. n. 54. *Cochlea interdum unicolor, interdum variegata, item variis fasciis depicta.*

Merr. pin. 207. *Cochlea vulgaris, testa variegata.*

Pet. mus. 5. n. 14. *Cochlea vulgaris, testa variegata.*

Habitat in *Nemoribus*. It. oel. 127.

OBS. Ab hac specie vix differt *Cochlea testa pellucida*. It. oel. 155.

1295. COCHLEA testa utrinque convexa subcinerea: fascia solitaria grisea, labro reflexo.

List. angl. 119. t. 2. f. 4. *Cochlea maculata, unica fascia pulla angustioreque per medium anfractus insignita.*

bist. I. n. 53. *Cochlea maculata, unica fascia fusca per medium orbem insignita.*

Pet. mus. 5. n. 15 idem.

Habitat in *Nemoribus*, pratis umbrosis, lucis,

DESCR.

DESCR. Variat admodum colore. *Testa* apertura lunulata est; constans spiris quinque, convexiuscula, fascia grisea per medium spirarum; cætum undique subgrisea punctis oblongis transversis albis.

1296. COCHLEA testa utrinque convexa hispida, spiris quinque rotundatis, subtus perforata.

Habitat in *arboribus & plantis*.

DESCR. Parva, cornei coloris, convexa, rotundata, subtus perforata, pilis raris brevissimis hispida, apertura lunari-subrotunda.

1297. COCHLEA testa utrinque convexa, spiris quadratorum cornei coloris, fascia subferruginea.

Habitat in insula *Liljeholmen* Upsaliæ.

DESCR. Facies præcedentis, sed minor: *corpus animalis* angustissimum, totum atrium.

1298. COCHLEA testa utrinque convexa, subtus perforata, spira acuta, apertura ovata transversali.

It. æl. 8.

Act. upj. 1736. p. 40. n. 9. *Cochlea* testa convexa subtus perforata, spira acuta.

Pet. mus. 69. n. 734. *Planorbis terrestris anglicus*, umbilico minore, margine acuto.

List. angl. 126. t. 2. f. 14. *Cochlea pulla sylvatica*, spiris in aciem depresso.

bif. 1. p. 29. f. 62. *Cochlea nostra umbilicata pulla.*

Habitat in *montibus præruptis* Dannemoræ, Elfkarlebyæ, Oelandiæ. &c.

DESCR. *Testa* subpellucida, supra parum convexa, subtus magis convexa, constat spiris quinque: color pallidus s. cotneus cum lituris spirarum transversis ferrugineis. Apex testæ minime prominet; subtus vero umbilicus foramine tereti majuscule apertus; margo spirarum undique acutissimus. *Apertura* subovata transversa levissime dilatata.

1299. COCHLEA testa supra convexo-plana, subtus convexa perforata, anfractu acuto, apertura semicordata. *It. æl. 65.*

Act. upj. 1736. p. 40. n. 6. *Cochlea testa depressa*, supra planiuscula marginata, subtus convexa perforata.

Habitat in *montium præruptis*, rarissimum animal.

DESCR. Præcedenti multoties minor. *Testa* supra plana fere est, subtus valde gibba & perforata umbilico; acies lateralis in hac versus latus

planum, contrario ac in precedentibus modo, ubi margo in medio anfractus; hinc dum *apertura* praecedentis ovata est, huic erit dimidiato cordata s. *cordis longitudinaliter* dissecti dimidium referens, nullo modo margine dilatata; haec constat anfractibus tribus vel quatuor, praecedens vero anfractibus quinque.

1300. COCHLEA testa pellucida oblonga, spiris decem sinistrorsis, apertura subrotunda.

Att. upf. 1736. p. 41. n. 20. Cochlea testa oblonga obtusa, rectu rotundo, spiris octo decem duodecim.

List. angl. 124. t. 1. f. 11. Buccinum alterum pellucidum subflavum, intra senas spiras mucronatum. Habitat in *Muscis* ad radices arborum, & in tectis antiquis rusticorum circa Upsaliam.

DESCR. Testa pellucida, subflava, spiris 8. 10. 12. sensim minoribus, in longum producta, apice obtusiuscula, sensim attenuata, spiris sinistrorum euntibus.

1301. COCHLEA testa subpellucida, spiris sex dextrorsis, subcylindracea obtusa.

List. angl. 121. t. 2. f. 6. Buccinum exiguum flavum, mucrone obtuso s. cylindraceum.

It. oeland. 99. Cochlea parva spiris septem.

Habitat Upsaliæ inter *Hypna* & *Brya* ad radices arborum, & in tectis rusticorum antiquis.

DESCR. Magnitudo semenis fecalis. Testa brunnea, dum adhuc animalculo facta est, alias cornea, pellucida, spiris 4, 5, vel 6, apertura ovato-acuminata, mucrone obtuso: Spiræ more communi dextrorsum (aperturæ imposita) procedunt.

1302. COCHLEA testa pellucida flava ovata ventricosa sinistrorsa: apertura ovato-oblonga longitudinali: spira introducta.

Att. upf. 1736. p. 41. n. 23. Cochlea testa flava pellucida acuminata: rectu obliquo.

Habitat cum praecedentibus duabus inter *Hypna* & *Brya* in tectis antiquis rusticorum, & ad arborum radices, præsertim Upsaliæ.

DESCR. Magnitudo infra Hordei granum subsistit: Testa ovata, pellucida, flava, fragilissima, ut vix tactum ferat; apertura ovato-oblonga, fere longitudinalis ventricosa & extima fere sola conspicua, reliqua vix prominent; hinc inter Volutas vel Cylindros veterum referri debet; mucro obtusissimus est: spiræ sinistrorsum incedunt, ut in penultima, nec ut in reliquis.

1303. COCHLEA testa pellucida flava ovata sinistrofa; apertura ovato-lanceolata, spira producta.

Habitat in *sylvis*.

DESCR. Longitudo seminis Avenæ, sed crassior est. *Testa* pellucida, subflava, tenerima, prominens, oblonga, minus acuta, spiris s. anfractibus quatuor sinistrorum flexis: apertura oblonga est, cum spiræ in fine latitudo superat totum corpus teste superioris.

* *Lacustres.*

1304. COCHLEA testa plana pulla: supra umbilicata, anfractibus quatuor teretibus.

List. angl. 143. *t. 2. f. 26.* Cochlea pulla, ex utraque parte circa umbilicum cava.

exerc. 2. p. 59. Purpura s. Cochlea fluviatilis compressa major.

Habitat frequens in *fluviis*, *paludibus* majoribus, *fossisque* frequens admodum.

DESCR. *Testa* spira s. anfractus teres est, striis longitudinalibus & transversalibus minutissimis elevatis: tota ferruginea s. pulla, subpellucida, plana utrinque est, nec spira prominens, at latere superiore concavo umbilicata, vix autem in inferiore latere.

1305. COCHLEA testa plana alba utrinque concava, anfractibus quinque teretibus.

Act. upf. 1736. *p. 40. n. 2.* Cochlea testa depressa utrinque subæquali: spira tereti.

Habitat in *Lacibus*.

DESCR. Magnitudo seminis Anethi. *Testa* alba, pellucida, anfractibus quinque, plana, parum utrinque concava, vix tamen umbilicata; minime marginata uti sequentes.

1306. COCHLEA testa plana fusca, supra concava, anfractibus quatuor, margine prominulo.

List. angl. 145. *t. 2. f. 27.* Cochlea fusca, altera parte planior & limbo insignita quatuor spirarum.

list. 2. t. 138. f. 42. Cochlea fusca, limbo circumscripta.

Pet. gaz. 16. *t. 10. f. 11.* Planorbis minor fluviatilis, acie acuta.

Habitat in aquis stagnantibus, *fossis*, *piscinis*, *paludibus* & *fluviis*.

DESCR. *Testa* constat 4 anfractibus nigricantibus, dum animal intra eandem latet opaca, alias pellucida cornæ coloris s. membranacei: striæ

minime obliquæ testam striatam reddunt; apertura ovato-obliqua, utrinque parum acuta: margo anfractuum prominet.

1307. COCHLEA testa plana fusca: supra concava, anfractibus quinque: margine acuto.

Lift. angl. 145. t. 2. f. 28. Cochlea exigua subfuscata, altera parte planior sine limbo, quinque spirarum.

Habitat in *fossis, paludibus, piscinis.*

DESCR. Hæc præcedenti minor, at anfractibus pluribus; margo testæ in antecedenti extra testam exseritur, at in hac ipse testæ angulus est acutus.

1308. COCHLEA testa plana, supra convexa, subtus concava; anfractibus quatuor deorsum marginatis.

Habitat in *fluviis & paludibus, fréquens in Hottonia.*

DESCR. Parva admodum: Testa subcinerea, subdiaphana, tenui, plana, supra convexa, parum umbilicata; subtus plana omnino, sed parum cava versus centrum; margo, qui anfractus cingit, respicit latus planius s. inferius: apertura ovato-acuminata est.

1309. COCHLEA testa plana: utrinque æquali umbilicata: apertura semilunari.

Att. upf. 1736. p. 40. n. 5. Cochlea testa depressa: spira arctissima, vix perforata.

Habitat in *fossis ad radices Hottoniae, sæpe in prato regio Upsaliensi.*

DESCR. Magnitudo semenis Brassicæ, raro major: Testa constat anfractibus quatuor arctissime sibi invicem obvolutis: utrinque fere æqualis est testa, & utrinque concava: apertura litteram C refert, seu Lunam in primo Quadrante. Corpus nigrum, corniculis subulatis, longis; cum in aquis versatur & e testa proreptit animalculum vivum, videtur testa, eminus inspecta, quasi deaurata.

1310. COCHLEA testa producta cuminata opaca, anfractibus senis subangulatis, apertura ovata.

Pet. mus. 82. n. 805. Buccinum fluviatile nostras oblongum majus.

Lift. angl. 137. t. 2. f. 21. Buccinum longum, sex spirarum, omnium & maximum & productius subflavum pellucidum in tenue acumen ex amplissima basi mucronatum.

hist. 2. t. 123. f. 21. Buccinum subflavum pellicidum sex orbium, clavicula admodum tenui productiore.

Aldr.

Aldr. test. 3. p. 359. n. 3. Turbo laevis in stagnis degens.

a Act. upf. 1736. p. 41. n. 21. Cochlea testa producta acuminata striata cinereo - alba.

List. angl. 139. t. 2. f. 22. Buccinum minus fuscum sex spirarum, ore angustiore. fig. mal.

Pet. mus. 82. n. 306. Buccinum fluviatile nostras oblongum minus.

B Act. upf. 1736. p. 41. n. 22. Cochlea testa producta acuminata atra.

Habitat in fossis, paludibus, fluviis & stagnis passim.

DESCR. Inter maximas nostras aquaticas numerari potest; caret omnī pictura, sed colore valde variat; Aliis testa omnino atra; aliis cinerea; aliis albida; aliis subgrisea: in omnibus striæ minutissimæ anfractuum transversarū s. testæ longitudinales, vix oculis nudis conspicuæ: hinc inde macula transversalis anfractus S. longitudinalis alterius spiræ, quæ albida est, ac si ea nota omni anno distingueretur.

1311. COCHLEA testa producta acuminata pellucida, anfractibus senis, apertura ovato - oblonga.

Act. upf. 1736. p. 41. n. 24. Cochlea testa alba pellucida acuminata, rectu obliquo.

Habitat in paludibus.

DESCR. Testa pellucida, longa, sed tam tenera, ut vix tactum ferat, ubi præcedens solida & dura vix digitis comminuenda: facie ad præcedentem propius accedit, sed triplo minor.

1312. COCHLEA testa oblongiuscula obtusa, anfractibus teretibus: lineis tribus lividis.

List. angl. 133. t. 2. f. 17. Cochlea maxima fusca s. nigricans fasciata.

bist. 2. t. 126. f. 26. Cochlea vivipara fasciata.

exerc. 2. p. 17. t. 2. Cochlea maxima viride-scens fasciata vivipara.

Swam. bibl. t. 9. f. 3. Cochlea vivipara.

Pet. mus. 84. n. 814. Cochlea fluviatilis vivipara londinensis.

Act. upf. 1736. p. 40. n. 14. Cochlea testa producto-convexa fluviatilis.

Vulgo Caput bovis.

Habitat in paludibus, lacubus & fluviis, in primis in fluvio Sahla, frequentissima, præsertim locis argilosis.

DESCR. *Testa pallida & obtusa;* anfractus linea triplici livida obsoleta longitudinaliter picta: *apertura ovata,* operculo membranaceo tecta.

1313. COCHLEA testa oblonga obtusa; anfractibus quatuor laxis cinereis opacis; apertura subovata.

Att. upf. 1736. p. 41. n. 16. *Cochlea palustris,* testæ hiatu rotundo contracto; spiris laxis.

List. angl. 135. t. 2. f. 19. *Cochlea parva subflava,* intra quinque spiras finita.

Habitat cum præcedentî.

DESCR. Hæc quadruplo minor est & spira laxiore magisque elongata, nec adeo ventricosa. tota quasi argilla obducta, a qua depurari nequit, operculo etiam clauditur.

1314. COCHLEA testa oblongiuscula; anfractibus quinque, pellucida: ore ovato.

Habitat in *fluviis.*

DESCR. Præcedentibus duabus duplo minor; operculo etiam clauditur, *Testa pellucida & valde tenera,* præcedentibus duabus acuta magis.

1315. COCHLEA testa diaphana, anfractibus quatuor, mucrone acuto brevissimo, apertura acutissima.

List. angl. 139. t. 2. f. 23. *Buccinum pellucidum flavum,* quatuor spirarum, mucrone amplissimo, testæ apertura omnium maxima.

hist. 2. t. 123. f. 32. *Buccinum subflavum pellucidum,* quatuor orbium, ore amplissimo, mucrone acuto.

exerc. 2. p. 54. *Buccinum fluviatile pellucidum subflavum,* quatuor spirarum, mucrone acuto, testæ apertura patentissima.

Pet. mus. 83. n. 807. *Buccinum fluviatile nostras breve,* ore patulo.

Habitat in *fluviis & stagnantibus aquis.*

DESCR. Est inter lacustres & fluviatiles nostrates maxima. *spira infusa maxima ventricosa,* minutissime secundum anfractus transversim striata. Duplex nobis est, altera magis altera minus retusa a parte mucronem spectante: testa interne nivea omnino est. *aperturæ margo reflexus.*

1316. COCHLEA testa pellucida, anfractibus quatuor, apertura ovata ampla, superficie rugis elevatis.

It. gotl. 261. nomen idem.

Habitat ad littora Gotlandiæ.

DESCR. Parva est, *Testa ventricosa,* spiris tribus, quarta vero in apice vix

vix conspicua; *apertura* margo dilatatus; superficies testæ striis elevatis remotis versus apertura marginem oblique descendantibus. Singulare in hac est, quod testa in medio gibba aucta est sutura quadam; *Animalculum nigrum* erat

1317. COCHLEA testa membranacea subflava oblonga, mucrone obtuso, anfractibus tribus.

Lift. angl. 140. *Buccinum subflavum pellucidum, trium spirarum.* an? (Figura non quadrat, an hæc?)

bifl. 3. t. 123. f. 23. *Buccinum subflavum pellucidum trium orbium?*

Bonan. recr. 119. *f. 54. n. 1.* (an?)

Pet. mus. 83. *n. 808.* *Buccinum fluviatile nostras, testa prætenui fragili* (an?)

Habitat in *fluviosis & Lacubus.*

DESCR. *Testa* cerei coloris, pellucida & fere membranacea, striis minutissimis parallelis obliquis, constans tribus anfractibus, mucrone obtususculo; *apertura* ovata margine recto, nec dilatato, testa magis flava est, quam in ulla alia nostratis specie.

1318. COCHLEA Nerita fluviatilis dicta.

Lift. angl. 136. *t. 2. f. 20.* *Nerita fluviatilis e cæruleo virescens maculatus, operculo subrufo lunato & aculeato donatus.*

bifl. 2. p. 1. f. 38. *Nerita fluviatilis e cæruleo virescens maculatus, operculo subcroceo aculeatoque donatus.*

Pet. mus. 67. *n. 718.* *Nerita thamesis exiguis reticulate variegatus.*

Habitat in *fluviosis, Upsaliæ ad molendinam Ulvam & alibi.*

DESCR. *Testa* subovata cornæ coloris, subcærulescens superficie cavatis inæquali, argilla deturpata. *apertura* magnitudine fere testæ: labro interiore plano, operculo semi-ovato.

1319. COCHLEA Nerita lacustris dicta.

Habitat in *Lacu ad pagum Tibile uplandiæ frequens.*

DESCR. Præcedenti & sequenti similis; *Testa minor antecedente, major insequente, glabra, varie colorata.*

* *Marina.*

1320. COCHLEA Nerita marina dicta.

Lift. angl. 164. *t. 2. f. 3.* *Nerita reticulatus.*

A a 5

bifl.

bifl. l. 4. s. 8. f. 39. *Nerita coloris castanei.*

Pet. mus. 67. n. 717. *Nerita anglicus maritimus fusca vulgaris.*

It. gotl. 261. *Nerita.*

Habitat in Mari frequens.

DESCR. *Testa* duabus præcedentibus similis sed minor, lœvis & operculata. *Animal* utrinque setas duas initar pedum totidem exserens; forte distincti generis nota.

1321. COCHLEA testa crassa ovata utrinque producta; spiris quinque spiraliter sulcatis; aperturæ labro undulato.

List. angl. 158. t. 3. f. 5. *Buccinum minus albidum asperum intra quinas spiras finitum.*

exerc. 2. p. 85. *idem.*

Habitat in mari occidentali.

DESCR. Sæpe argillæ adeo obducta, ut difficile videantur spire.

1322. COCHLEA testa longa subulata, spiris duodecim striatis.

List. angl. 161. t. 3. f. 8. *Buccinum tenue dense striatum, 12 minimum spiris donatum.*

Habitat in mari occidentali.

DESCR. Color corneus, testa terebriformi, singula spira quinque sulcis spiraliter exarata; apertura orbiculari.

1323. COCHLEA testa longa acuminata; aperturæ labro dilatato: dupli stria antice sinuato.

Bonan. recr. 3. n. 85. 87.

Habitat in mari atlantico.

DESCR. *Testa* crassa, longa, terebriformis, incarnata, basi parum rostrata, 8 spirarum anfractibus: verrucis compressis una serie digestis. *Apertura* testæ producitur labro latissimo duabus elevatis striis angulato; Labrum hoc antice (apicem versus) prominet in angulum acutiusculum, intra quem angulum & testam sinus semilunaris est.

1324. COCHLEA subrotunda obtusa umbilicata: fasciis quinque maculis ferrugineis sagittatis, secunda lineis undulatis.

List. angl. 163. t. 3. f. 10. *Cochlea rufescens, fasciis maculatis, maxima ad imos orbes distincta.*

Habitat in mari.

DESCR. Magnitudo nucis Coryli; *Testa* subrotunda, obtusa, quatuor anfractum, albida, basi perforata seu umbilicata, anfractus (præfertum inferius)

fimus) fasciis quinque pinguntur, quarum prima seu superior maculis ferrugineis sagittatis constat, secunda maculis ferrugineis oblongis undulatis, tertia, quarta & quinta maculis ut in prima,

1325. COCHLEA oblonga: striis longitudinalibus marginatis.

Pet. mus. 66. n. 705. Buccinum album minus, costis elegantur elatis.

Habitat in *mari occidentali*, unde nobis missa.

DESCR. Facillime distinguitur ab omnibus aliis hęc cancellata Cochlea, cuius striæ longitudinales octo vel novem elatæ quasi membranaceæ.

Haliotis.

1326. HALIOTIS striata rugosa.

Rond. aqu. 5. Auris marina.

Bellon. aqu. 395. Patella altera major.

Gesn. epit. 224. f. 1. 2. Auris marina.

Aldr. exsang. 551. f. 1. 2. Patellæ feræ s. aures marinæ.

Jonst. aqu. t. 17. f. 4 5.

Bonan. recr. 91. f. 1. 2. Auris marina.

List. angl. 167. t. 3. f. 16. Auris marina quibusdam.
hif. 4. f. 7. t. 611. f. 2. Auris marina major,
latior, plurimis foraminibus eorumque vestigiis ad
40 circiter conspicua, clavicula elata.

Pet. mus. 81. n. 801. Auris marina anglica.

Sibb. mus. 130. n. 2. Auris marina nostras.

Grew. mus. 139. Auris marina.

Habitat in *mari occidentali*, cum testas ad littora repertas habuimus.

Dentalium.

1327. DENTALIUM testa subcylindracea lævi obliqua, hinc angustiore.

Rond. pisc. 2. p. 110. Tubulus dentatus lævis.

Gesn. aqu. 348. Dentales.

Charl. exerc. 63. Dentalium.

Dal. pharm. 393. Dentalium.

Lang. test. 5. Tubulus dentalis lævis.

List. hif. 4. f. 2. n. 2. Dentale læve album, altera extremitate rufescens.

Bonan.

Bonan. recr. 91. Dentales alii ejusdem formæ minores.
Habitat in mari occidentali frequens.

1328. DENTALIUM testa cylindracea inæquali flexuosa contorta.

Argent. nat. 352. t. 29. f. 8.

Habitat ubique ad littora maris atlantici, sæpe in Ostreis.

1329. DENTALIUM testa membranacea cylindracea ligno inferta.

Sellii Teredo navalis.

Habitat in navibus palisque marinis, ligna destruens, ab exteris oris advecta, ante aliquot annos apud nos copiose observata.

Nautilus.

1330. NAUTILUS testa recta subcylindracea apicem versus angustiore.

Habitat forte in mari Balthico.

DESCR. Testam ipsam aut animal non vidimus, at petreficatum inde ubique vulgare, non modo per Oelandiam, sed & in omnibus nostris Provinciis.

Concha.

1331. CONCHA testa oblonga, medio antice contracta.

Lift. app. 15. f. 3. Musculus niger omnium crassissima & ponderosissima testa.

Gesn. aqu. Conchæ longæ species.

Lift. app. 15. f. 1. Musculus niger omnium crassissima & ponderosissima testa, conchæ longæ species.

Suecis Pärlemusla.

Habitat in fluviis maximis, præsertim Lapponiæ, ubi in voraginibus communiter reperitur.

1332. CONCHA testa oblonga ovata longitudinaliter subrugosa, postice compresso - prominula.

Lift. app. 9. f. 2. Musculus latus maximus, testa admodum tenui ex fusco virideſcens, palustris.

Suecis Sjö- Musla. Musla.

Habi-

Habitat in lacubus.

OBS. Figura Listeri paulo latior videtur, quam nostra.

1333. CONCHA testa oblonga lævi subviolacea.

Lang. test. 24. Concha soleniformis lævis.

Gesn. aqu. 277. Mytulus.

Rond. aqu. 2. p. 48. Mytulus.

Aldr. ex sang. 512. Mytulus Rondeletii.

Bell. aqu. 397. Mytulus.

Schonef. ichthb. 54. Mytulus.

Merr. pin. 193. Mytuli.

Lift. hist. 3. t. 362. f. 200. Musculus subcæruleus ferre virgatus.

angl. 182. f. 28. Musculus ex cæruleo niger.

Pet. mus. 84. n. 820. Musculus maritimus vulgatis- simus edulis.

It. œl. 43. Concha Mytulus dicta.

Habitat in mari copiosissime, ad littora rejicitur, a Belgis editur, non vero a nostris.

OBS. ex hac humus conchacea Helsingica maxima ex parte constat.

1334. CONCHA testa oblonga transversim, vixque longitudinaliter, striata.

Habitat in mari.

1335. CONCHA testa subrotunda glabra incarnata.

It. œl. 43. Concha subrotunda glabra incarnata.

Habitat in mari Baltico.

DESCR. *Testa* tenera, magnitudine seminis Phaseoli, valde fragilis, vix tactum ferens, extus incarnata, ad cardines angulata, parum convexa absque ulla striis.

1336. CONCHA testa subglobosa glabra cornei coloris: fulco transversali.

Lift. angl. app. 22. f. 5. Musculus exiguis pisí magnitudine subrotundus.

Habitat in paludibus; in Hottonia.

DESCR. Magnitudo seminis Pisí majoris, subglobosa. *Testa* latior transversim, quam à cardinibus antrorum; valde gibba, lævis est, uno fulco striata transversali, subpellucida, minime alba, sed coloris omnino cornu bovinum ad pectines elaborati subdiaphani.

1337. CONCHA testa ovata: altero latere angulo plano a cardine ad ambitum.

Lift.

Lift. app. 32. f. 8. Concha rugosa tellinæformis, linearola quadam paululum eminente ab ipso cardine ad imum ambitum donata.

Habitat in mari.

DESCR. Testa parva, magnitudo Fabæ, lævis, rugis minimis transversis; ubi valvæ coeunt ab altero latere cardinis, testa plana est versus rectum.

1338. CONCHA testa subrotunda rugosa substriata: valvis inæqualibus, cardine oblitterato.

Rond. aquat. 2. p. 37. Ostrea.

Gesn. aqu. 645. Ostrea.

Aldr. exsang. 482. Ostrea Rondeletii marina.

Zonft. exsang. 44. Ostrea.

Schbonef. icht. 54. Ostrea.

Charl. exerc. 66. Ostrea.

Merr. pin. 193. Ostrea.

Lift. ang. 176. t. 4. f. 26. Ostreum vulgare maximum intus argenteo quodam splendore albescens.

bif. 3. p. 20. Ostrea major sulcata inæqualiter utrinque ad cardinem denticulata.

Bonan. recr. 108. t. 70. Concha satis nota in cœnis, Ostrea Latinis dicta, non Ostreum.

Lang. test. 81. Ostreum vulgare striatum.

Dal. pharm. 397. Ostrea.

Pet. mus. 85. n. 822. Ostrea vulgaris esculenta.

Suecis Ostra.

Habitat in mari Occidentali.

1339. CONCHA testa subrotunda; fulcis XX longitudinalibus: dorso antice aculeatis.

Rond. aqu. 22. Concha echinata.

Gesn. aqu. 131. 132.

Bonan. test. clas. 2. n. 90. p. 446. Concha striata echinata.

Lift. angl. 188. t. 5. f. 33. Pectunculus echinatus.

Lang. test. 60. Concha cordiformis æquilatera umbone cardinum unito, striata papillosa verrucosa aculeata vel imbricata.

Habitat in mari Atlantico frequens.

DESCR.

DESCR. testa est subrotunda valvis hinc depresso, illinc vero magis rotundatis, valde gibba, fulcis XX. exaracta, striis interjacentibus elevatis, longitudinaliter reflexo echinatis, praesertim versus marginem.

1340. CONCHA testa subrotunda; fulcis viginti sex longitudinalibus, tribus transversalibus.

Aldr. exsang. 449. Concha striata altera Rondeletii.
Pet. mus. 86. n. 835. Pectunculus maritimus nostras edulis vugatissimus.

List. ang. 189. t. 5. f. 34. Pectunculus vulgaris rotundus circiter XXVI. striis majusculis at planioribus notatus.

bijst. 3. n. 171. Pectunculus capite minore rotundiore & magis æquali margine.

Schonef. ichth. 55. Pectunculus.

Dal. pharm. 398. Pectunculus.

It. œl. 42. Concha testa subrotunda, fulcis 26 longitudinalibus, tribus transversalibus.

Habitat in *mari*, copiose ad littora rejicitur.

DESCR. Testa subrotunda, rugis. s. fulcis transversis duobus tribusve profundis velut aucta est; fulci longitudinales 26 circiter, distincti, remoti, interjecto spatio rugoso; hi fulci subtus similiter versus marginem profunde insculpti numerantur. crassa admodum testa est.

1341. CONCHA testa subrotunda; fulcis profundis viginti, margine crenato.

Habitat in *mari*.

DESCR. Testa subrotunda, crassa, fulcis profundis pluribusve transversis exarata; his fulcis interjacet margo reflexus. At margo testæ introrsum crenatus s. denticulatus est, qua nota a sequenti maxime differt.

1342. CONCHA testa subrotunda: striis transversis innumeris, margine laevi.

Habitat in *mari*.

DESCR. Testa subrotunda, crassa, pellucida, basi acutiuscula, striis transversis, innumeris, 30 pluribus, tenuissimis, vix distinguendis visu, acutis & reflexis; intra testam in ejus fundo sulcus sepius oblongus, margo minime denticulatus est.

1343. CONCHA testa aurita; striis quatuordecim.

Pet. mus. 86. n. 829. Pecten major nostras vulgaris.

List. angl. 184. t. 5. f. 29. Pecten maximus circiter striis 14. admodum crassis & eminentibus & iisdem ipsis striis insignitus.

bijst.

bif. 3. t. 163. f. 1. Pecten magnus albidus circiter 12. striis multis minutisque incisuris exasperatis donatus.

Habitat in *mari Atlantico*.

1344. CONCHA testa aurita rufescens; striis viginti.

Lift. angl. 185. t. 5. f. 30. Pecten tenuis subrufus maculosus, circiter 20 striis majoribus at laevibus donatus.

Habitat in *mari Occidentali* frequens.

1345. CONCHA testa aurita; striis circiter quadraginta.

Lift. angl. 186. t. 5. f. 31. Pecten minimus angustior inaequalis fere & asper, sinu ad cardinem cylindraceo, creberrimis minutissimisque striis donatus.

Habitat frequens in *mari Occidentali*.

DESCR. Striae in hac specie exarant testam sulcis 30 ad 40, minutissimis, qua facile a reliquis differt: alba dein etiam est.

1346. CONCHA testa aurita alba; striis viginti tribus.

Pet. gaz. 26. t. 17. f. 9. Pectunculus minimus laevis intus argenteus cardine ferrato.

Habitat in *mari Atlantico* frequens.

DESCR. Testa alba est, auriculis striatis & rugosis, sulci longitudinales 23 tenuissime transversaliter rugosi; subtus niter testa colore margaritarum, ubi sulci quasi duplicati sunt.

1347. CONCHA testa planiore orbiculata cranium humanaum referente.

Stobæi Diff. epist. 1732. 4:to Lundini. f. 1. 2. Nummulus Brattensburgensis.

Att. upf. vol. 2. p. 560. Nummus brattenburgensis territorii willans, insulæ Ivæ, lacu, ubi ad litora saepe rejicitur pagi Biskops-gården.

Habitat in *Scania*.

OBS. D. D. Leche reperit duas testas, cohaerentes, altera est Nummus Brattenburgensis Stobæi; altera est magis interne concava extus turbinata convexa; adeoque de genere nullum dubium amplius superest. in Tab. II. & conchæ testam superiorem antea notam in naturali magnitudine exhibet a tergo visam; β eandem auctam a latere interiori; γ vero a latere exteriori. δ Testam inferiorem antea ignotam a latere interiori, ε vero eandem a latere exteriori delineat.

Le-

Lepas.

1348. LEPAS testa conica truncata; operculo obtuso.
Pet. mus. 82. n. 802. *Balanus noster parvus vulgaris.*
Argenv. nat. 364. t. 30. f. D.
Lift. angl. 196. t. 2. f. 41. *Balanus cinereus velut e-*
senis laminibus striatis compositus, ipso vertice
altera testa bifida rhomboide occclusa.

bif. 3. t. 444. f. 287. *Balanus parvus striatus.*

Leuwenh. arcana. epif. 82. p. 472. t. 465. f. i. E. & f. 7.

Habitat in lapidibus vulgatissima in mari Atlantico.

DESCR. ANIMAL habet 1. Rostrum molle, intortum. 2. Pedes utrinque quatuor, longos, articulatos, pilosos. 3. Pedes utrinque tres, ventricosos uti chelæ; breves, singulos instructos setis brevibus binis articulatis. 4. Os inferne dentibus utrinque duobus labello superimposito. Figuram Leuwenhoeckii videas satis bonam.

1349. LEPAS testa conica sulcata; operculo acuminato.

Argen. nat. 364. t. 30. f. A.
 Habitat in Ostreis & lapidibus frequens in mari At-
 lantico.

DESCR. Differt a precedenti quod 1. major sit. 2. testa ad latera sulcis variis inæqualibus exculta. 3. quod operculum, quatuor valvulis compositum, acumine longo claudatur oblique mucronato.

1350. LEPAS testa compressa, basi membrana cylindracea.

Argen. nat. 364. t. 30. f. F. Concha anatifera adhærens.
Pet. mus. 82. n. 862. *Balanus anatifera.*

Bart. cent. 6. p. 271. *Concha anatifera major.*

Worm. mus. 256. *Concha anatifera.*

Lift. bif. 23. t. 440. f. 283. *Concha anatifera mar-*
gine laevi.

exerc. t. 7. f. 4. 5.

Stalpant. obs. 2. p. 458. t. 15. *Conchæ falsis gravidæ*
anseribus.

Bonan. recr. 95. f. 2.

Sennert. hypomn. 2. c. 8. *Concha anatifera.*

Sibb. mus. 170. n. 2. *Concha quinquevalvis compres-*
sa, tubulo quodam lignis aut algæ marinæ ad-
hærens; animal sui generis multis cirrhis instru-
ctum continens, falso dicta anatifera.

scot. 2. l. 3. c. 12. t. 18. f. 1. *Concha anatifera.*

Aldr. exsang. 543. Conchæ anatiferæ ex arbore dependentes.

Grew. mus. 148. *Balanus compressa*.

Lob. ic. 2. *p. 250.* Conchæ anatiferae britannicæ.

Baub. pin. 513. *n. 1. 2. 3.* Arbores anatiferæ.

Baub. hist. 3. *p. 803.* Anates Conchiferæ vel Anatiferæ falso dictæ aut Tellinæ & Balani.

Hoffn. ins. 3. *t. 6.* Concha anatifera vulgo Branta & Bernicla.

Chabr. sciagr. 580. *f. 3. 4.* Arbores conchiferæ & anatiferæ dictæ.

Habitat in mari Atlantico super ligna.

Microcrosmus.

1351. MICROCOSMUS.

Bart. cent. 4. *p. 284.* Cete vigesimus secundus.

Rhed. vivent. *t. 22.* *f. 1. 4. 5.* *Microcosmus marinus*.

Ephem. Nat. Cur. ann. 8. *obs.* 51. Singulare monstrum.

Act. lips. 1686. *p. 48.* *t. 48.* *Microcosmus marinus*.
Habitare fertur in mari Norwegico; ipse non dum
hoc animal vidi.

APPENDIX.

254 --- 255.

1352. LACERTA cauda tereti verticillata longitudine corporis, pedibus pentadactylis unguiculatis.

Raj. quadr. 264. *Lacertus vulgaris*, ventre nigro maculato.

Habitat inter *Lapides*. R. Hast.

DESCR. *Corpus cæruleo-cinereum*: punctis albis nigrisque sparsis. *Caput* supra lividum: futuris variis, una cum collo a thorace distinctum monili e squamis majoribus. *ordines 6 longitudinales*: singulis e squamis 26 constantibus. *anus transversus*. *Cauda testa* squamis acuminatis angulatis in verticillos 50 digestis. *Digitii omnes fissi*, & armati unguibus acutis.

275 --- 276. *Branchiostegi*.

1353. OSTRACION rotundo - oblongus, tuberculis utrinque, pinna dorsali longissima. *Art. gen. 59. syn. 81.*

Clus. exot. 140. *t. 141.* *Orbis ranæ rictu.*

Barthol. cent. 2. *p. 169.* *Orbis piscis.*

Raj. pisc. 43. *Orbis ranæ rictu.*

Habitat in *Scaniæ maritimis*.

432 --- 433.

1354. CHRYSOMELA rubra, elytro singulo maculis quinque nigris.

Habitat in *Salicibus Sudermanniaæ*. J. O. Hagström.

DESCR. Est inter sui generis maiusculas. *Caput nigrum*. *Thorax ruber*, in medio pone niger. *Elytra rubra*: singulo maculis 5 nigris magnis, quem tamen interdum confluent in inæquales maculas. *Abdomen subtus nigrum*. *Pedes nigris*.

718 --- 719.

1355. APHIS Populi nigræ.

Swamm. bibl. 14. *f. 21.*

Jung. verm. 161. 162. *Populi nigræ Vermes f. Muscæ.*

Reaum. gall. 3. *t. 26. f. 7 -- 11. & t. 27. f. 1 -- 14.*

Ambros. hort. 97. *t. 96.* *Folliculi in pediculis foliorum populi nigræ.*

Hoffm. alt. bort. 51. Culices in populo nigra.

Rupp. jen. 3. p. 333. Idem.

Act. Stockb. 1742. p. 232. Arbor muscas ferens.

Habitat *Runnaby & Gothoburgi*, ubi in Populi nigræ 821 petiolis utrinque excrescentia incarnata ore pervia; vel sub disco folii foccus incarnatus superne pervius intra quæ Aphides hæ habitant, modo fere eodem quo aphidum caufa folliculi in *Pistaciæ* speciebus enascuntur. *Aphis pistaciæ*.

Siml. vit. gesn. 49.

Cam. epit. 51.

Lob. ic. 97. & 100.

Dod. pent. 870.

Baub. hist. 1. p. 279.

Tabern. hist. 1439.

Habitat in *Pistacia*, *Terebintho*, *Lentisco*.

Observeant Autoptæ utrum hæc cum præcedente eadem aut diversa species; cum in nostra Suecia hæ arbores sponte non occurant.

809 - 810.

1356. PHALÆNA larvæ Sphingis caudæ corniculo scabro.

Frisch. germ. 2. t. 11. f. 3. (an?)

DESCR. *Larva* antice angustior, glabra, a tergo livida, subtus rufescens. *Maculae* utrinque 10 rotundæ (exceptis ultimis) flavo-albescentes, majusculæ nigredine tinctæ, quibus singulis punctum album subjacet; *Puncta* varia alba minutissima ad latera abdominis. *Pedes* 6, 8, 2. *Cornu* caudæ rubrum, acutum, curvum, scabrum.

* * *

1357. LARVA aquatica, globulo coccineo nitente umbilicali, cauda bifida.

Habitat in cavitatibus & rimis petrarum & montium, ubi aquæ stagnant.

DESCR. *Facies* pisces minimi, longitudine pollicis transversi. *Caput* depresso. *Oculi* parvi, fusi, laterales, distantes. *Antennæ* capillares. *Frons* obtusa. *Rostrum* obtusum inflexum ut in cicada, angustum, obtusiusculum. *Dorsum* convexum, subincarnatum. *Cauda* teretiuscula, articulata, longitudine fere corporis: pinna horizontali bifida acuta, *Globinus* magnitudine feminis sinapis ad regionem ani, coccineus, auro nitens, splendens, ad latera flavus. *Pedes* multi (12 circiter) ad latera corporis, ab utroque latere imbricatim dispositi. *Natat* in dorso uti *Notonecta*. An *LARVA Ephemeræ* 755? Fæmina solo globulo instruitur, quod forte ovarium, ut peracta metamorphosi præsto sint ova.

A D D E N D A.

- N. 29 lin. 3 *Suecis Wattu-Rotta,*
 114 - 8 *It. gotl.* 271.
 162 - 7 *Weſtrogothis Biuggbit.*
 166 - 11. 12 *Habitat in sylvis acerosis sempervi-
 rentibus depressoſis.*
 169 - 12 *victitans præſertim Betula nana* 777.
 283 - 4. 5. *Act. angl.* 293. *p.* 1749. *f.* 1. *Gurnard.*
 477 inter 478. CERAMBÝX.
 596 - 4 *Glut, hemerob,* 81. *Vermis majalis e pro-
 vincia ultrajectina.*
 73. *Vermis majalis.*
 626 lin. 4. 5. *It. gotl.* 276. *Gryllus capite thorace
 elytrisque superne viridibus.*
 835 - 4. 5. *Rob. ic.* 15, *f.* 1.

TABULA I.

78. ♀ CUCULUS subgrisea maculata, rectricibus nigris: fasciis undulatis. *Fæmina.*
243. ♂ PARUS vertice albo, cauda longiore; & quidem Avis in Scania a D. Lecho visa & delineata. an Parus beardmannicus Albini?
229. ♂ MOTACILLA testacea, subtus subcinerea, pileo obscurō.
- ♂ *Mas.*
♀ *Fæmina.*
484. CERAMBYX cinereus nigro - nebulosus, anten-
nis corpore dimidio brevioribus, thorace spi-
noso.
α *magnitudine naturali.*
β *microscopio auctus.*
147. TRINGA rostro lœvi, corpore cinereo lituris
nigris subtus albo.
194. ALAUDA remigibus albis: primoribus extror-
sum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tri-
bus albis. *Avis nivalis vulgo.*
α Remiges expansæ & distinctæ.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *nigræ, versus basin albæ.*
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. *albæ omnino.*
16. *nigra: apice alba.*
β Rectrices expansæ.
1. 2. 3. 10. 11. 12. *albæ macula linearis nigra.*
4. 9. *nigræ latere exteriore longitudinaliter albæ.*
5. 6. 7. 8. *nigræ.*

EMENDANDA.

- §. 29 lin. 1. longa *lege* corpore dimidio breviore.
39 10. sig. bon. *refer* ad paginam 9.
86 & 87. IV ANSÈRES *lege* III ANSERES.
119 lin. 2. Garfahl *lege* Garfuhl.
130 - 16. acuti - aucti
157 - 1. variegato - variegatus
274 - 10. Gadi 291 - Gadi 292.
675 - 5. utri rostrum. antennæ, pedes, - utiro-
strum, antennæ, pedes.
742 - 2. flavo - flava
820 - 25. Blank. - Blackw.
846 - 2. flava - flavo.
852 - 6. fil - fit.
946 - 3. Ulno - Ulmo
1003 - 20. Ichneumoniis - Ichneumonum
1211 - 1. acutis - auctis.
1283 - 6. individu - individuo.

TABU-



TABULA II.

180. AMPELIS dorso nigro: macula ad oculos longitudinali.
 ♂ mas.
 ♀ Fæmina.
198. FRINGILLA alarum basi subtus flavissima.
331. CYPRINUS pinna ani duplici, caudæ trifurca.
exoticus Piscis aureus chinenium.
249. PROCELLARIA.
199. FRINGILLA artubus nigris, remigibus utrinque albis: tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis.
Fæmina ♀
816. PHALÆNA pectinicornis; alis supra viridibus:
 fascia transversali sinuato-dentata glauca.
935. TENTHREDO antennis septinodii nigra, segmentorum abdominalium marginibus, excepto secundo & tertio, flavis. *in Scrophularia.*
1283. LERNEA tentaculis 4 duobus apice lunulatis.
1347. CONCHA testa planiore orbiculata cranium humandum referente.
 α testa magnitudine naturali.
 β testa superior latere interiore.
 γ testa superior latere exteriore.
 δ testa inferior latere interiore.
 ε testa inferior latere exteriore: parum conica.

229.





194. 3



C.Bergquist sculpfit.












Tab. II.

Cyprinus pinna ani duplici.

331.









INDEX NOMINUM LATINORUM.

- A*bramus 318.
*A*bys**sus** *Satanæ* 1182.
Acarus 1186 - 1212.
Acarus 1187, 1190, 1194,
1195, 1198, 1200, 1206.
Accipiter 66, 68.
Achanthus 203.
Acipenser 271, 272.
Acipenser 271.
Acrigoneus 622.
Acus 304, 334 - 336.
Admirabilis 879.
Aelbescen-luyzen 704.
Alauda 190 - 194.
Alauda 190 - 194.
Alaudæ congener 206.
Albula 312, 313, 330.
Alburnus 330.
Alca 118 - 120.
Alca 120.
Alce 37.
Alexis 787.
Alpicola 802.
Ambulo 820.
Ammiralis 777.
Ammodytes 303.
Ammodytes 303.
Ampelis 179 - 181.
Anas 87 - 112.
Anas 94 - 103, 105 - 107,
110 - 112, 114, 118.
Anates 1350.
Anguilla 290, 303.
Anguis 258 - 261.
Anguis 259, 260.
Annularia 824.
Anser 89, 90, 91, 119.
Antennulata 829.
Antijk 827.
Aper 36.
Aphis 704-719. *Append. p.*
387, 388.
Aphrodita 1284.
Apis 988 - 1018.
Apis 1003, 1004, 1009, 1010,
1012 - 1018.
Apus 246, 1181.
Aquila 56.
Aranea 1213 - 1243.
Aranea 1215, 1219, 1225,
1228, 1232, 1235.
Araneus 282, 691, 1186,
1199, 1200, 1214 - 1219,
1223 - 1225, 1227, 1234,
1236, 1237, 1241.
Arbor anatif. p. 388.
Arbores 1350.
Ardea 131 - 136.
Ardea 132 - 135.
Argus 803 - 806.
Arguata 139, 140.
Ascaris 1269.
Asellus 293-297, 1255-1258.
Afilus 1030 - 1042.
Afinus 35.
Afio 47.
Afacus 1248, 1249.
Asteria 1285.
Asterias 1285.

- Atricapilla* 229.
Attelabus 415. 424. 440. 547.
 554. 576.
Audax 731.
Avis 118. 119. 121. 129.
 145. 194. 220.
Avosetta 137.
Auris marina 1326.
Aurora 801.
- B**
Alæna 264. 265.
 Balæna 263. 264.
Balanus 1348. 1350.
Balbusardus 57.
Ballerus 323.
Basse la Reine 791.
Bella donna 778.
Bernicla 91.
Biber 23.
Blatta 617. 618.
 Blatta 594. 617.
Bombylius 1012.
Bombyx 832.
Bos 44.
Boschas 97.
Branta. 91.
Brassicaria 797-799.
Brenta 91.
Bubo. 45. 46.
Buccinum 1300. 1301. 1310.
 1315. 1317. 1321. 1322.
 1325.
Bufo 253.
Buglossa 299.
Buglossus 299.
Buprestis 554 - 560.
Buprestis 344. 489-491. 495.
 519. 520. 521. 1199.
- Buteo* 65. 66.
Butyracea 807. 808.
- C**
Æcilia 258.
Cæruleo-cephalus 836.
Callaris 297.
Canaria 207.
Cancellus 1250.
Cancer 1244 - 1254.
Cancer 1244. 1245. 1247.
 1250 - 1253.
Canis 12 - 14.
Canis 270.
Cantharis 584 - 593.
Cantharis 347. 477. 510.
 519. 525. 548. 549. 585-
 587. 589.
Cantharoscalops 543.
Cantharus 347. 556. 585. 586.
 596.
Canuti avis 150.
Capella 148.
Caper 42.
Capra 42.
Caprea 41.
Capreolus 41.
Capricornus 479. 493.
Caprimulgus 248.
Capriolus 41.
Capus 165.
Caput bovis 1312.
Carabus 511 - 533.
Carabus 514. 516. 517.
Carassius 322.
Carbo 116.
Carduelis 195 - 198.
Caryocatactes 75.
Cassida 377 - 387.
- Cassi-*

- Cassida* 377. 382.
Castor 23 - 25.
Catodon 262.
Cerambyx 478 - 495.
Cerambyx 478 - 480. 488.
 494. 499. 514. 518.
Cernua 286.
Certhia 213.
Certhia 213.
Certhias 213.
Certhius 213.
Cervus 37 - 41.
Cervus 38 - 40. 337.
Cete 262. 1351.
Chameleo 1029.
Charadrius 159.
Charadrius 156 - 160.
Charadrius 159. 160.
Charax 322.
Chermes 693 - 703.
Chloris 202. 205.
Chrysaëtos 56.
Chrysomela 413 - 444. *Ap-*
pend. p. 387.
Chrysomela 417 - 419. 428.
 431.
Cicada 630 - 645.
Cicindela 548 - 553.
Cicindela 549. 550. 555. 558.
 584.
Ciconia 135. 136.
Cimex 646 - 687.
Cimex 597. 646. 647. 650.
 654. 655. 658. 662. 664.
 665. 672. 674. 676. 679.
 681. 983. 684. 686. 688.
 692. 698. 707.
Cimices 646.
- Cinclus* 146.
Citrinella 205.
Clangula 100.
Clupea 315. 316.
Cobitis 332. 333.
Cobitis 331 - 333.
Coccinella 388 - 412.
Coccinella 388. 409.
Coccionella 377. 388. 389. 391.
 394. 397.
Coccothraustes 176.
Coccus 720 - 725.
Coccus 720.
Cochinella 391. 720.
Cochlea 1293 - 1325.
Cochlea 1293 - 1295. 1298 -
 1302. 1304 - 1307. 1309.
 1313. 1324.
Coluber 259.
Columba 174. 175.
Columba 124. 174.
Colymbus 121 - 124.
Colymbus 121 - 124.
Comes 783.
Concha 1331 - 1347.
Concha 1333. 1335. 1337 -
 1340. 1350.
Conchæ 1331. 1350.
Conirofor 177.
Coregonus 312 - 314.
Coridon 786.
Cornix 70. 71. 73.
Corvus 69 - 76.
Corvus 69. 116. 117. 281.
Coffus 812.
Cottus 278 - 280.
Cottus 278. 279. 283.
Coturnix 173.

- C**rabro 988.
Crex 162.
Cuculus 77. 78.
Culex 1115 - 1120.
Culex 1038. 1116. 1117.
 1137. 1142. 1148.
Culicis. append. p. 388.
Cuniculus 20.
Curculio 445 - 477.
Curculio 445. 446. 448. 449.
 456 - 458. 460. 461. 475.
Curruca 233.
Cyclopterus 275.
Cynclus 88.
Cygnus 88.
Cyprinus 317 - 331.
Cyprinus 317 - 331.
- D***Ama* 40.
Delphinus 266. 267.
Delphinus 266.
Dendrofalco 64.
Dentale 1327.
Dentales 1327.
Dentalium 1327 - 1329.
Dermestes 360 - 376.
Dermestes 360. 362. 363. 365.
 366. 368. 379. 384. 410.
Dorcas 41.
Draco 282.
Drepanis 247.
Dytiscus 561 - 572.
Dytiscus 564. 571.
- E***Chinus* 1289. 1290.
Echinus 16. 1289. 1290.
Eglefinus 297.
Elater 573 - 583.
- Emberiza* 205. 206.
Entomon 1255.
Eperlanus 311.
Ephemera 750 - 755.
Ephemera 751. 754.
Eops 85.
Equus 34. 35.
Erinaceus 16.
Eruca 773 - 775. 791. 796.
 798. 799. 809. 811. 812.
 819. 820. 824. 827. 828.
 829. 834 - 836. 845. 849.
 853. 869. 879. 921. 923.
 1284.
Efox 304. 305.
- F***Alco* 56 - 58.
Falco 60. 62. 68.
Faunus 784.
Felis 3 - 5.
Fiber 23.
Ficedula 230. 231. 234.
Folliculi. Append. p. 387.
Forficula 599. 600.
Forficula 599. 601. 603 - 606.
 609. 612.
Formica 1019 - 1023.
Formica 1019 - 1023.
Formica-leo 733.
Fratercula 118.
Fringilla 195 - 212.
Fringilla 194. 198. 199.
Fringillago 238.
Fringillarius 68.
Fucus 1003.
Fulica 130.
Fulica 130.
Fullo 343.

- G**Adus 291 - 297.
Galeus 269.
Gallina 164. 165. 170.
Gallinæ 146.
Gallinago 143.
Gallinula 146. 147. 151 - 153.
Gallopavo 164.
Gallus 165.
Gallus 164. 165.
Gamma aureum. 873.
Gammarus 1249.
Garrulus 73. 179.
Gasterosteus 276. 277.
Geometra 849. 873.
Gladius 288.
Glanis 291.
Glaucion 104.
Glaucium 104.
Glires. 28.
Glottis 142.
Gobio 279.
Gobius 279.
Gordius 1265.
Gordius 1265.
Graculus 117.
Granum 720.
Griflagine 325.
Grus 131.
Grygallus 166. 168.
Grylli 617. 620.
Gryllo-talpa 619.
Gryllus 619 - 629.
Gryllus 617. 619. 620. 623.
 625. 629. 630. 633. 639.
Gulo 6.
Gyrfalco 62.
Gyrinus 412. 537. 540. 542.
 544. 545.
- H**Æmatopus 161.
Hæmatopus 161.
Halietus 57.
Haliotis 1326.
Harengus 315.
Hedera 949.
Hemerobius 731 - 736.
Hemerobius 737. 738. 744.
 745.
Hermellanus 9.
Hieracium 950.
Himantopus 161.
Hippelaphus 39.
Hippobosca 1043. 1044.
Hippoboscus 1043.
Hippoglossus 302.
Hippolais 233.
Hircus 42.
Hirudo 1272 - 1275.
Hirudo 1272. 1274. 1275.
Hirundinis 121.
Hirundo 244 - 248.
Hirundo 127. 244 - 247. 281.
Homo 1.
Hortulanus 205. 208.
Hydra 1283.
Hydrocantharus 565. 567.
 569.
- I**Chneumon 951 - 987.
Ichneumon 924. 925. 929.
 933. 938. 940. 945 - 947.
 951. 952. 957. 959. 961.
 962. 964. 967. 970 - 972.
 975. 977. 978. 980. 981.
 985. 1031.
Imperator 779.
Insectum 684. 700.

- Ispida* 86.
Julo 1262.
Julus 1260.
Junco 211.
Jynx 78.

Kernell 108.
Knavel 720.
Knipa 113.

LAcerta 254 - 257. *append.*
p. 387.
Lacerta 254, 256, 257.
Lacertus 254, 255, 257. *ap-*
pend. *p.* 387.
Lagopus 169.
Lampetra 273, 274.
Lampyris 584, 618.
Lanarius 61, 180, 181.
Lanius 180, 181.
Lapwing 148.
Larus 125, 126.
Larus 125 - 127.
Lavaretus 312.
Leming 26.
Lemmus 26.
Lea 731.
Leopardus 814.
Lepas 1348 - 1350.
Leptura 496 - 510.
Leptura 496, 499, 504, 507,
509, 510.
Lepus 19, 20.
Lepus 275.
Lernea 1282.
Leucoradios 87.
Libatrix 833.
Libella 756 - 764, 766 - 768,
770, 771,
- Libellula* 756 - 771.
Libellula 765.
Ligurinus 203.
Limax 1276, 1280.
Limax 1276 - 1280.
Limosa 142.
Linaria 209, 210.
Locusta 621, 623, 625, 626.
Locusta - pulex 630, 636, 639,
642.
Loligo - sepia 1281.
Lota 292.
Lovisa 757.
Loxia 176 - 178.
Loxia 177.
Lubricipeda 823.
Lucio - perca 285.
Lucius 304.
Lumbricus 1270, 1271.
Lumbricus 1266, 1271.
Lumpus 275.
Lunda 118.
Lupus 4, 13.
Luscinia 231.
Luteæ 205.
Lutra 10.
Lynx 4, 5.
Lyra 283.

MAja 1245.
Martes 7.
Moscovian 166.
Medusa 1286 - 1288.
Medusa 1287.
Meervurm 1265.
Meleagris 164.
Meleagris 164.
Meles 15.
- Me-

- Meloë* 596.
Membras 315.
Merganser 113.
Mergus 113 - 115.
Mergus 113 - 115, 121.
Merops 86.
Merula 184 - 187, 216.
Meticulosa 815.
Microcosmus 1351.
Microcosmus 1351.
Millepeda 1257.
Millepes 1257.
Milvus 59, 63.
Molitor 345.
Molua 295.
Monedula 72.
Monoceros 283, 340.
Monoculus 1181 - 1185.
Monodon 263.
Montifringilla 194, 198.
Mordella 534 - 547.
Mordella 534, 536.
Morinellus 158.
Morio 772.
Morphnos 57.
Morrhua 295.
Motacilla 214 - 237.
Motacilla 147, 214, 215.
Mouche 951.
Mulus 35.
Muraena 290.
Mures. 31.
Mus 26 - 32.
Mus. 24, 26 - 32, 33, 1284.
Musca 1050 - 1114.
Musca 647, 656, 729, 631,
 632, 744, 745, 952, 959,
 985, 1024, 1031, 1035.
1040. 1043. 1049. 1051.
1052, 1057 - 1060. 1062.
1065. 1067. 1068. 1071.
1075. 1076. 1078. 1084.
1088 - 1090. 1093. 1094.
1096 - 1100. 1102. 1104 -
 1108. 1119. 1120. 1144.
1145. 1147.
Muscicapa 218.
Musculus 1331 - 1333, 1336.
Mustela 6 - 9.
Mustela 9, 262.
Mustelus 269.
Mutuiti 159.
Mytuli 1333.
Mytilus 1333.

N
Atrix 259.
Nautilus 1330.
Necydalis 597, 598.
Necydalis 439, 476, 485.
Nepa 691, 692.
Nerita 1318, 1319, 1320.
Neustria 824.
Noctiluca 584.
Noctua 48, 50, 51, 53, 54,
 870.
Notonecta 688 - 690.
Notonecta 688 - 690.
Notopeda 575, 577.
Numenius 139 - 144.
Numenius 139.
Nummulus 1347.
Nummus 1347.

O
Crophus 146.
Oculus 776.
Oenanthe 217, 218.

- Oenas* 174, 175.
Oestrum 1025, 1026, 1034.
Oestrus 1024 - 1029.
Omicron-ypsilon 859.
Oniscus 1255 - 1258.
Oniscus 1255, 1264.
Onos 297.
Ophidion 289.
Ophidion 289.
Orbis. *Append. p.* 387.
Orca 267.
Ortygometra 162.
Ortygometra 162.
Osmerus 311.
Ostracion. *Append. p.* 387.
Ostrea 1338.
Ostreum 1338.
Otus 47.
Ova 720.
Ovis 43.
- P***Agurus* 1244, 1246.
Palumbus 175.
Panorpa 729.
Papiliooides 814.
Papilio 772 - 808.
Papilio 772 - 789, 791 - 804.
 806, 807, 809, 813, 814,
 817, 821 - 823, 825 - 827,
 830, 832, 833, 837, 840,
 845, 851, 853, 855, 856,
 860 - 870, 872, 873, 880,
 891, 895, 896, 906, 907,
 917, 920,
Papiliunculus 789.
Parus 238 - 243.
Parus 235, 238 - 243.
Passer 190, 207, 211, 212,
 232, 300, 301, 302,
- Passerculus* 235.
Patella 1291, 1292.
Patella 1291, 1292, 1326.
Patellæ 1326.
Pavo 163.
Pavo 163.
Pecten 1343 - 1345.
Peectunculus 1139, 1340, 1346.
Pediculo cognatus 1168.
Pediculus 1153 - 1170.
Pediculus 704, 722, 724,
 1153, 1154, 1157, 1159,
 1160, 1162, 1165, 1167,
 1168, 1169, 1192, 1193,
 1198.
Pelecanus 116, 117.
Pelecanus 87.
Penelope 105.
Penguin 119.
Perca 284 - 286.
Perca 284, 286.
Perdix 169, 171, 172.
Perla 731, 738.
Petromyzon 273, 274.
Phalæna 809 - 922.
Phalæna 777, 802, 808, 809,
 811, 812, 814, 819, 820,
 827 - 829, 833, 835 - 837,
 845, 846, 849, 851, 868,
 869, 872, 873, 875, 891,
 907. *Append. p.* 388.
Phascas 109.
Philopson 873.
Phoca 11.
Phoca 11.
Phœnicuro similis 220.
Phryganea 737 - 749.
Phycis 321.
Physalis 265. *Phy-*

- Physapus* 726. 728.
Physeter 265.
Pica 74. 76. 118. 161. 179.
Picea 700.
Picus 79-84.
Picus 79-84. 182.
Pied 194.
Pilularius 349.
Pisciculus 276. 277.
Piscis 277. 282. 303. 3. 23336.
Planorbis 1298. 1306.
Platea 87.
Plateffa 301.
Platina 87.
Pleuronectes 298-302.
Pluvialis 142. 155-157.
Podura 1172-1180.
Podura 1176-1178.
Polychloros 773.
Polygonum 720.
Polypus 1283.
Pomatia 1293.
Populi. Append. p. 387.
Porcellus 811.
Princeps 782.
Principissa 781.
Pristis 270.
Proboscis 1090.
Procellaria 249.
Procul spectabilis 822.
Proscarabaeus 596.
Psi littera 879.
Pudendum 1284.
Pulex 1171.
Pulex 572. 645. 1158. 1162.
 1165. 1171. 1172. 1182.
 1190. 1253.
 -*Pulmo* 1286.
Pulmonaria 950.
Pungitius 276.
Pungitii alterum genus 277.
Pupbinus 118.
Purpura 1304.
Putorius 8.
Pygargus 58.
Pyrrhula 178.
Q*Uerquedula* 99. 108. 109.
R*Aja* 268.
Raja 268.
Rana 250-253.
Rana 250. 252.
Ranatra 631. 636.
Ranunculus 252.
Rangifer 39.
Raphidia 730.
Raphidia 730.
Rara 814.
Razorbill 121.
Recurvirostra 137. 138.
Recurvirostra 137.
Reduvius 1192.
Regina 776.
Regulus 235. 236.
Rex 780.
Rhangifer 39.
Rhodopus 146.
Rhombus 298.
Ricinus 1043. 1193.
Rootaug 324.
Rubecula 226.
Rubeculus 226.
Rubetra 218.
Rubicilla 178.
Rusticola 141.
Ruti-

- Ruticilla* 220, 224.
Rutilus 329.
- S**
Alamandra 256.
Salar 309.
Salmo 306 - 310.
Salmo 306 - 308.
Satyrus 785.
Sandilz 303.
Scalopssacantharus 543.
Scarabælaphus 337.
Scarabæus 337 - 359.
Scarabæus 337, 338, 340, 343 -
 347, 349 - 355, 360, 364 -
 366, 370, 377 - 380, 388,
 390, 391, 397, 403, 407,
 412, 416, 430, 437, 446,
 452, 456, 457, 460, 462,
 477 - 479, 489, 494, 495,
 499, 500, 507, 509, 515,
 516, 518, 540, 548, 550,
 554, 564, 572, 573, 575,
 577, 584, 586 - 588, 594,
 596, 599, 603, 604, 617,
 665.
Schænobænus 223.
Schilus 285.
Sciurus 21.
Scolopax 138, 141, 143.
Scolopendra 1259 - 1264.
Scolopendra 1259 - 1261.
Scomber 287.
Scomber 287.
Scombrus 287.
Scorpæna 280.
Scorpio 280, 691.
Scorpiones 691.
- Scorpio - araneus* 1187.
Scorpio - musca 729.
Scorpius 280.
Scrofa 36.
Sepia 1281.
Sepia 1281.
Serpens 259.
Serra 270.
Seta 1265.
Silurus 291, 292.
Singulare monstorum 1351.
Sitta 182.
Sitta 182.
Smaragdulus 344.
Solea 299.
Somnolentus 845.
Sorex 33.
Sphinx 809.
Sphondyla 812.
Spinus 203.
Spirinchus 311.
Spithometra 849.
Spoonbill 87.
Spratti 316.
Sprinckhanen 622.
Squalus 269, 270.
Squilla 1252.
Staphylinus 601 - 616.
Staphylinus 603.
Stella 1285.
Sterna 127 - 129.
Sterna 127.
Strix 45 - 55.
Strix 49, 55, 248.
Strumulæ 949.
Struntjager 129.
Sturio 271, 272.
Sturnus 183.

- Sturmus* 183.
Subb. teo 64.
Sus 36.
Syngnathus 334-336.

T*Abanus* 1045-1050.
Tabanus 1029. 1045-
 1047. 1049. 1050.
Tadorna 93.
Tænia 1266-1268.
Tænia 333. 1266.
Taninai 1266.
Talpa 17.
Talpa 619.
Tarandus 39.
Taraxacum 889.
Taurus 337.
Taxus 15.
Tenebrio 594. 595.
Tenia 892.
Tenthredo 923-950.
Teredo navis 1329.
Terribilis 834.
Testudo 377.
Tetrao 166-173.
Tetrao 166. 168.
The godwall 101.
Thrips 726-728.
Thymallus 314.
Thymus 314.
Tinca 321.
Tinnunculus 67.
Tipula 1121-1152.
Tipula 685. 1115. 1121. 1123-
 1126. 1128. 1129. 1131.
Tobianus 303.
Tolmerus 731.
Totanus 149.
Trachinus 282. 283.

Tragelaphus 39.
Trapazorola 123.
Trichas 188.
Trigla 281.
Tringa 145-155.
Tringa 146. 147.
Triscus 292.
Truen 129.
Trutta 308. 309.
Tubulus 1327.
Turbitæ 174.
Turbo 1310.
Turdus 184-189.
Turdus 188. 189.
Turtur 175.
Typhle 335.
Typhlos 258.

V*Anellus* 148.
Veau 11.
Ventriones 704.
Vermes 1028. 1182. 1271.
Vermiculi 952.
Vermiculus 1109.
Vermis 599. 698. 826. 1024.
 1253. 2266. 1268. 1284.
Verrucæ 945.
Vespa 959. 967. 969. 975.
 977. 989. 1004. 1006. 1031.
Vespertilio 18.
Vinula 819.
Vipera 260.
Vitulus 11. 1265.
Ulrica 758.
Ulula 48.
Umbla 310.
Vormils 1024.
Upupa 85.

Uro-

404 INDEX NOMIN. LATINORUM.

- Urogallus* 166. 168.
Ursus 2.
Ursus 820.
Urtica 1287.
Vulpanser 93.
Vulpes 14.
W. *littera* 245.
Water wagtail 214
Wegflecklin 220.
Wydengyrckerlin 220.
X *Iphias* 288.
Xiphias 288.



IN-

INDEX NOMINUM SVECORUM.

Abborre 284.
Ahlfogel 96.
Ahltita 243.
Alaipg 194.
Aler 96.
Alle 124.
Alwargrim 156.
Anka 97.
Ard 113.
Afp 319.

BÄck-swala 247.
Beccafin 147.
Benunge 277.
Bij 1003.
Binnikemasken 1266.
Biörka 328.
Biörn 2.
Blicka 323.
Blikta 313.
Blindknagg 1050.
Blodhund 12.
Blodigel 1273.
Blå-and 97.
Blåfot 57.
Blåklacka 130.
Blåkråka 73.
Blå-luus 1156.
Blåmes 240.
Blåråf 14.
Bläckfisk 1281.
Bofink 199.
Bolgeting 988.
Brandräf 14.
Braxen 318.

Braxenflicka 323.
Braxenmygg 684.
Braxenpancka 323.
Brunnacke 104.
Brushane 145.
Bräfrö 1200.
Bröms 1045.
Brömskula 1024.
Budd 331.
Butta 298.
Båfwer 23.
Bärvis 650.
Börting 308.

CAbблиå 295.
Canariefogel 207.
Cheruna 169.
Curbma 1025.

DÄggmask 1271.
Dof 40.
Dofhiort 40.
Domherre 178.
Dopping 100.
Dracan 617.
Dufva 174.
Dwårg 1215.
Dåsman 24.

EIder 94.
Ekoxe 337.
Engelsk Dogg 12.
Eentita 242.
Ettermyror 1022.

Falk.

Falk 60.
 Faren 327.
 Festing 1192.
 Fijken 1266.
 Filfrass 6.
 Finke 199.
 Finfisk 265.
 Fiorna 123.
 Fiskörn 57.
 Fiållmus 26.
 Fiållracka 14.
 Fiåffing 282.
 Flatluus 1154.
 Flott 1193.
 Fluga 1106.
 Flundra 300.
 Flådermus 18.
 Forell 309.
 Frø 250.
 Får 43.
 Fårsing 282.
 Fönster-spindel 1215.

G Allåpple 947.
 Geecka 77.
 Geet 42.
 Geting 989.
 Giers 286.
 Giådda 304.
 Giök 77.
 Giöktyta 78.
 Giös 285.
 Glada 59.
 Glirr 331.
 Glirren 331.
 Glutt 142.
 Golspink 205.
 Grautle 124.

Grifla 124.
 Groda 250.
 Grundel 332.
 Grundskorfwa 1255.
 Grylle 124.
 Grå-lax 307.
 Grå-fiska 210.
 Gråskin 21.
 Gråsparf 212.
 Gråfuggor 1257.
 Gråfswin 15.
 Gråsand 97.
 Gröngiöling 80.
 Grönning 205.
 Grönlands Hwalfisk 263.
 Grönling 332.
 Grönsiska 203.
 Grönspik 80.
 Gudunge 94.
 Guldsmed 344.
 Gumphöns 165.
 Gyllenräenna 81.
 Gås 90.

H Afsnåhl 334.
 Hafstiåder 116.
 Haj 269.
 Hare 19.
 Harfång 54.
 Harr 314.
 Hemdufva 174.
 Hermelin 9.
 Hiort 38.
 Hiärpe 170.
 Homåka 125.
 Horngiåll 305.
 Hornoxe 337.
 Hornuggla 47.
 Horsgjök 146. Hug-

- Huggorm 260.
 Humbla 1012. 1015. 1017.
 Hommer 1248.
 Hund 12.
 Hutt 157.
 Huswala 245.
 Hwasbuk 316.
 Hwitling 294.
 Håger 133.
 Håtgflundra 302.
 Hämpling 209.
 Hårfogel 85.
 Håst 34.
 Håstfluga 1043.
 Håstmyror 1019.
 Höna 165.
 Höns 165.
 Hönstjuf 63.
- J Agthund 12.
 Ickorn 21.
 Id 320.
 Igelkott 16.
 Iggle 331.
 Iller 8.
 Illwårsfogel 194.
 Jordhumbla 1012.
 Jordkrut 1179.
 Isarf 324.
 Isspiärna 214.
 Jugås 93.
 Jungfru Mariæ Höna 391.
 Järf 6.
 Järnsparf 223.
- K Aja 72.
 Kalkon 164.
 Kanin 20.
- Kantnåhl 335.
 Karp 317.
 Katta 3.
 Kattlo 5.
 Kikbår 1150.
 Kjåder 166.
 Kjågelrifware 177.
 Kjårrgylta 248.
 Kjörfogel 113.
 Klera 189.
 Klåmask 1194.
 Klåssa 250.
 Klådra 189.
 Knipa 100.
 Knoding 281.
 Knorrhane 281.
 Knott 1118.
 Knåhund 12.
 Ko 44.
 Kohltraft 184.
 Kolja 297.
 Kongsfogel 235.
 Kopparorm 258.
 Kornlårcka 206.
 Körp 69.
 Korsnåf 177.
 Korsråf 14.
 Kowipa 148.
 Kramsford 188.
 Krauck 1116.
 Krollhöna 165.
 Kronhjort 38.
 Kruka 233.
 Krypare 213.
 Kraka 71.
 Kråfweta 1249.
 Kyrckofalck 67.

L Abben 129.
 Ladufwala 244.
 Lake 292.
 Lappskata 187.
 Lax 306.
 Laxöring 309.
 Lekatt 9.
 Linnare 321.
 Linåhl 274.
 Lomm 121.
 Loppa 1171.
 Lummich 26.
 Lunda 118.
 Luus 1154.
 Lysmask 584.
 Läche 1215. 1186.
 Låderlapp 18.
 Lärka 190.
 Löja 330.
 Lopare 267.

MAhl 291. 362. 1195.
 Makrill 287.
 Manett 1287.
 Marspitt 161.
 Marfvin 266.
 Mave 125.
 Mesar 228.
 Metmask 1271.
 Mockere 1118.
 Moiku 313.
 Morkulla 141.
 Moss humbla 1017.
 Mudd 331.
 Mullwad 17.
 Mulåfna 35.
 Mufla 1332.

Muus 31.
 Mygg 1116.
 Myror 1019-1023.
 Myrpytta 156.
 Mård 7.
 Mömus 1012.
 Mört 329.

NAkenhund 12.
 Nattblacka 18.
 Nattskiårra 248.
 Nattskräfva 248.
 Neinögon 273.
 Noosmasken 1027.
 Nörrquint 198.
 Nors 311.
 Nyckelpiga 391.
 Näbbgjädda 305.
 Näbmuus 31.
 Nächtergahl 221.
 Nätting 273.
 Nöt 44.
 Nötkraka 75.
 Nötpacka 182.
 Nötskrika 74.
 Nötwåcka 75. 182.

ODenswala 135.
 Olycksfogel 187.
 Onda - Betet 1265.
 Ormslä 258.
 Orre 168.
 Ostra 1338.

PAdda 253.
 Pago 159.
 Parisfogel 176.
 Pelekan 87.

Piffmyror 1020.

Polsa 1132.

Popp 85.

Pracka 114.

Påfogel 163.

Pärlemusla 1331.

QUaster 1199.

Quidd 331.

Quidfogel 65.

RAcklehane 167.

Rapphöna 172.

Ratgans 91.

Raud 310.

Rhen 39.

Ringdufva 175.

Ringorm 259.

Ringswala 246.

Riska 204.

Roka 70.

Roflare 167.

Rotgel 226.

Rotta 28.

Ruda 322.

Råcka 268.

Rådjur 41.

Råf 14.

Råka 1252.

Röding 310.

Rödluuus 1155.

Rödstjert 224.

Rördrum 134.

Rötfimpa 280.

SAbelmus 26.

Sandpiller 733.

Sarf 324.

Siberisk gås 89.

Sidenswantz 179.

Sijk 312.

Sijklöja 313.

Silkesmask 832.

Sill 315.

Siska 203.

Siuryggfisk 275.

Siutut 175.

Sial 11.

Siölärcka 194.

Siömusla 1332.

Siöorre 124.

Skata 76.

Skiälryta 280.

Skiärfläcka 137.

Skogsdufwa 174.

Skogsknetter 228.

Skogsnigel 1276.

Skomakare 321.

Skrabba 280.

Skraka 113.

Skrobbra 594.

Skälla 301.

Slaggimpa 279.

Slagħōk 66.

Slom 311.

Slättskiädda 300.

Småmyror 1023.

Småsijk 313.

Snigel 1272.

Snok 259.

Snorgiers 286.

Snäppa 147.

Snöloppa 1176.

Snöripa 169.

Snösparf 194.

Sola 299.

- Solsensodg 331.
 Spanisk kråka 73.
 Sparfhök 68.
 Spigg 276.
 Spillkråka 79.
 Spinck 212.
 Spyfluga 1102.
 Stare 183.
 Stenbit 309.
 Stenhumbla 1015.
 Stensimpa 279.
 Stensquåtta 217.
 Sterlett 272.
 Stiglitz 195.
 Stingfluga 1042.
 Stint 313.
 Stork 136.
 Stormvådersfogel 249.
 Storsijk 312.
 Strandpipare 159.
 Strandskiura 161.
 Strandswala 247.
 Strautle 125.
 Strömming 315.
 Stugofluga 1106.
 Styng 1024.
 Stäm 325.
 Stör 271.
 Surk 17.
 Sutare 321.
 Swan 88.
 Swartlasse 129.
 Swartmyror 1021.
 Swenska 202.
 Svensk Papegoja 176.
 Swerdfisk 288.
 Swidknott 1117.
 Swin 36.
- Swärta 106.
 Syrmask 1255.
 Syrsa 620.
 Sägfisk 270.
 Sådesårla 214. 215.
 Säffsparf 211.
 Sömntorn 938.
- T**Algoxe 238.
 Tallbit 176.
 Tillkråka 79.
 Timberman 480.
 Tobis 303.
 Tofshöns 165.
 Tofsmysffa 239.
 Tofstita 239.
 Tolk 154.
 Tomlinge 242.
 Tomtorm 259.
 Torbagge 349.
 Tord 120.
 Tordmule 120.
 Torndyfwel 349.
 Torraka 617.
 Torsk 293.
 Trana 131.
 Traft 184.
 Trompe 1026.
 Trågårdssnåcka 1293.
 Tumlare 266.
 Tunga 299.
 Tupp 165.
 Turkisk gåas 89.
 Twestiert 599. 1263.
 Tånglake 333.
 Tåffla 253.
 Tårna 127.
 Tåting, 212.

UF 45.
Ulf 13.
Ulka 280.
Utter 10.

WAchtel 173.
Waldsnäppa 143.
Wargel 181.
Warg 13.
Warglo 4.
Watnbagge. 572.
Watnstare 216.
Wedknarr 80.
Wespa 989.
Widding 294.
Wigge 99.
Willswin 36.
Wimba 326.
Winterand 95.
Winthund 12.
Wipa 148.
Woodcock 141.
Wrakfogel 113.

Wriand 105.
Wårtbit 621.
Wåggluus 646.
Wålträckia 214.


ÅDa 94.
Åhl 290.
Åhlkusfa 292.
Åkerhöna 157. 171.
Åkerhöns 156. 391.
Ållenborre 346.
Åfna 35.


ÄLg 37.
Allerkråka 73.
Ånger 360.
Ångsnärpa 162.
Årla 214.
Årta 109.

ÖRlax 308.
Örnmask 599.
Örn 56.









Thimbles
125/2 90

£ 50/-

Ks. 25/- -

